



## Parameter Fisiologis

Parameter	Domba	Kambing	Sapi
Temperatur Rektal	39°C	39-40°C	38,9-39,3°C
Tekanan Darah	70-80x/menit	70-90x/menit	55-80x/menit
Respirasi	12-20 x/menit	15-30 x/menit	28-29x/menit
Pubertas	5-12 bulan	4-12 bulan	16 bulan
Estrus	36 jam	12-24 jam	13-18 jam
Siklus Estrus	16-17 hari	18-23 hari	18-21 hari
Kebuntingan	147 hari	150 hari	283 hari



### **OBSERVASI** (Gejala Hewan Sakit)

- Program pencegahan penyakit
- Perubahan nafsu makan
- Pakan bersisa
- Cek kotoran ternak (Diare?) perubahan pakan mendadak, konsumsi pakan tinggi karbohidrat berlebih, parasit internal







## Penyakit-Penyakit yang sering Pada kambing & Domba

- PENYAKIT INFEKSI
- Bakteri (Anthrax, Clostridium, Pasteurella)
- Virus (Orf , BEF)
- Parasit (Scabies, cacingan, )
- Jamur
- PENYAKIT NON INFEKSIUS
- Gangguan Metabolisme (kembung, milk fever)
- Keracunan pakan



#### Usaha Pencegahan Penyakit


- Kebersihan kandang
- Pemberian pakan yang baik
- Vaksinasi
- Segera mengobati ternak sakit
- Faktor penyebab terjadi Penyakit:
- Manajemen pemeliharaan
- Kualitas lingkungan
- Wabah / outbreak





#### CARA - CARA PENULARAN / KEJADIAN PENYAKIT PADA TERNAK


Kontak dengan bahan tercemar, bibit penyakit/ racun




- a. hewan memakan rumput yang tercemar bibit penyakit
- b. hewan meminum air yang tercemar biblt penyakit
- hewan sehat tinggal pada kandang bekas hewan sakit yang tidak dibersihkan

kandang bekas hewan sakit







#### B. CARA PENCEGAHAN PENYAKIT

- -hindari terjadinya cara-cara penularan penyakit - lakukan vaksinasi hewan





**BEF (Bovine Ephemeral Fever)** 

- Demam 3 hari
- Vektor : Nyamuk Culicoides
- Penyebab : Virus Ephemerovirus
- Gejala: demam 1-3 hari, tremor, anorexia, diare, exudat pada hidung dan mata
- Terapi : asimptomatis (vitamin)
- Pencegahan: higiene dan sanitasi kandang, hindari genangan air pada kandang





## Septicaemia Epizootika

- Penyakit ngorok
- Penyebab : Pasteurella multocida
- Gejala: Bentuk busung bengkak pada daerah gelambir, submandibula, demam tinggi, (mortalitas 90%),akut 1-3 hari
- pektoral (kronis 1-3 minggu, batuk dan ingus, badan menjadi kurus), diare
- Terapi : Antibiotika
- Pencegahan : Vaksinasi SE



## Scabies/ Kudis / Buduk

- Penyebab: Sarcoptes sp
- Gejala: Lesi & keropeng di kulit, gatal, kulit menebal, bulu rontok & hewan gelisah

#### Terapi:

- Ivomex / Ivermectin (Injeksi sub kutan
  ) & salep
- Belerang+oli bekas atau Basudin 60
- Sanitasi & desinfeksi kandang
- Dimandikan dg sabun colek









#### KUDIS/BUDUK

1. Tanda tanda klinis




hewan menggesekgesekkan badannya kegatalan




#### 2. PENGOBATAN

a. obat suntik ivomec



suntikan: IVOMEC ke bawah kulit (Sub-Kutan)





#### **ENTEROTOXEMIA**

- Enterotoxemia (overeating disease)
- Gejala jarang muncul
- Disebabkan oleh bakteri Clostridia (normal pada usus halus domba)
- Perubahan pakan mendadak, atau karbohidrat dalam jumlah besar
- Clostridia melepaskan toxin dalam beberapa jam
- Pencegahan : Vaksinasi, booster 2-3 minggu kemudian

#### **Parasit Internal**

- Pemberian obat cacing pada anak kambing / sapi lepas sapih
- Booster obat cacing 3 bulan kemudian
- Lungworm, stomach worm, liver fluke, coccidia
- Gejala: BB turun, diare, bulu kasar & kusam, depresi, lemah, anemia, batuk(lung worm), bottle jaw (liver flukes)








#### CACINGAN

#### 1. Tanada-tanda Kinis



sehat gemuk dan lincah



Sakit cacingan : - kurusbulu agak berdiri, tidak mengkilap

- sembelit atau mencret
- lesu dan pucat
- daerah rahang dapat terlihat membengkak
- · mati mendadak.


2. Pengobatan.



 pengobatan rutin dengan obat cacing atau cekok kampung




#### 3. Pencegahan



- kandang harus panggung
- kandang harus tetap bersih dan kering
- hewan tetap di kandang.





- gembalakan hewan siang hari, jam 12,00-15.00
- gembalakan hewan harus berpindahpindah, dan kembali 30 hari kemudian.

arit rumput siang hari jam 12.00 - 15.00

fppt.com



## ORF (Scabbymouth)

- Penyakit zoonosis disebabkan oleh virus parapox
- Gejala : lesi dan keropeng pada mulut
- Terapi : Gosok lesi dengan Iodine setelah keropeng dibersihkan, antibiotik
- Pencegahan : Vaksinasi





## (Stiff lamb Disease)

- Anak domba umur 3 minggu sampai 5 bulan
- Gejala: inaktif, sulit bergerak atau bangun, BB turun/ pertumbuhan lambat
- Terapi : preparat Selenium dan Vit B12




#### Coccidiosis

- Penyebab : Eimeria sp
- Gejala: Diare berdarah (melena), BB turun, lemah dan dehidrasi
- Terapi : pisahkan yang sakit, beri coccidiostat









## Prolapsus rektum

- Berhubungan dengan genetik
- Pakan konsentrat tinggi, batuk kronis, diare
- Terapi : tenaga kesehatan hewan







#### Ringworm

- Penyakit zoonosis disebabkan
  Tricophyton dan Microsporum
- Gejala: alopecia berbentuk lingkaran, gatal, pustula, keropeng, penebalan kulit yang terinfeksi
- Terapi : antifungal, spray bleach 10% pada peralatan kandang dan domba





## Abortus

Penyakit	Agen	Usia kebuntingan	
Bluetongue	Virus Reoviridae	Semua umur	
Brucellosis	B. melitensis/B. ovis	tri semester terakhir	
Q-Fever	Coxiella burnetti	Minggu terakhir	
Vibriosis	Campylobacter fetus, C. jejuni	6 minggu terakhir	
Leptospirosis	L. interrogans	Tengah kebuntingan	
Listeriosis	L. monocytogenes	Semua umur	
Toxoplasmosis	T. gondii	Semua umur	



## Pink Eye (Keratoconjungtivitis)

- Mycoplasma conjungtivae & Chlamydia
- Gejala: mata berair, merah, bengkak, bagian putih mata tampak berawan, ulser pada kasus parah
- Terapi : flush mata dengan normal saline
- antibiotik topikal
- injeksi tylosin, oxytetracycline
- kontrol lalat








#### Bloat

#### PERUT KEMBUNG/TIMPANI


1. Tanda-tandanya



- hewan gelisah, sulit bernapas
- perut sebelah kiri kembung ke atas dan kesamping
- kalau dipukul bunyi seperti gendang



#### 2. Pengobatan



- paksakan hewan berdirl
- Ikatkan kayu pada mulut
- cekok dengan minyak kelapa/
  minyak goreng 1/2-1 gelas
- tekan bagian perut yang menggembung
- bila tidak sembuh, tusuk dengan bambu kecil yang tajam bagian perut sebelah kiri belakang (oleskan yodium/obat merah sebelum ditusuk)

3. Pencegahan



- jangan memberikan rumput muda terlalu banyak
- jangan memberikan terlalu banyak rumput basah dan buah polongan/biji-bijian

#### Milk Fever


- Nama lain : parturient paresis, hypocalcaemia, calving paralysis
- disebabkan kondisi hypocalcemia dimana kadar Ca di dalam darah rendah.
- Faktor-faktor predisposisi meliputi umur, produksi susu, ransum hewan
- Gejala: lemah, nafsu makan menurun, suhu tubuh dingin, tidak dapat berdiri
- Terapi : larutan calcium borogluconas 20% IV





# Distokia

- Kesulitan melahirkan sehingga membutuhkan bantuan
- Faktor Penyebab: monster fetus, kelainan posisi fetus (sungsang), rongga pelvis kecil
- Terapi : reposisi fetus, penarikan, bedah caesar





## Terima Kasih