

011094, 中国科学技术大学, 2020年春季学期

数理逻辑讲义

陈小平

计算机科学与技术学院

记2020科大樱花
——致敬为家国大义挺身而出的勇士
和默默奉献的英雄!

雨骤云积万物暗, 绿澎红湃势无垠;
花开岂待三千客, 直教春风一片新。

杨金龙摄

2.6 K 的可靠性和完全性

回顾：2.5 一阶逻辑的语义

- ❖ 定义(M有效) 设 p 是 $K(Y)$ 公式, M 是 $K(Y)$ 的一个一阶结构。若对一切 V , p 在 $I=(M, V, v)$ 下有 $I(p)=t$, 则称 p 是**M有效的**, 称 M 为 p 的一个**模型**, 记为 $M \models p$ 。
- ❖ 例(续) 设 $K_0(Y)$ 不含函数符号, 只含个体常元 c 和谓词符号 P 。
 1. 取一阶结构 $M_N=(N, \emptyset, \{>\})$, 其中 N 是自然数集, $>$ 是大于关系, c^M 为0, P^M 为 $>$ 。则 $P(x, c)$ 和 $\forall x P(x, c)$ **都不是** M_N 有效的。
 2. 取一阶结构 **$M'_N=(N, \emptyset, \{\geq\})$** , 其中 N 是自然数集, \geq 是自然数集上的**大于等于**关系, c^M 为0, P^M 为 \geq 。则 $P(x, c)$ 和 $\forall x P(x, c)$ **都是** M'_N 有效的。

回顾：2.5 一阶逻辑的语义

❖ 定理(语义性质)

1. $M \models p$ 当且仅当 $M \models \forall x p$ 当且仅当 $M \models \forall p$ 。

❖ 观察 假如以“**M有效**”作为一种“真”，则开公式如 $P(x, c)$ 与其全称闭式如 $\forall x P(x, c)$ 有相同的“真假”。


❖ 推论 任给闭式 p 和一阶结构 M ， $M \models p$ 和 $M \models \neg p$ 有且仅有一个成立。

❖ 观察 假如以“**M有效**”作为一种“真”，则开公式如 $P(x, c)$ 与其全称闭式如 $\forall x P(x, c)$ 都有真假。

回顾：2.5 一阶逻辑的语义

- ❖ 定义(语义后承) 设 $\Gamma \subseteq K(Y)$, $p \in K(Y)$ 。 p 称为 Γ 的**语义后承**, 记为 $\Gamma \models p$, 如果对**任何**一阶结构 M , 只要 $M \models \Gamma$, 则有 $M \models p$ 。
- ◆ 注释 语义后承 $\Gamma \models p$ 的直观含义是: 如果 Γ 真, 则 p 真; 其中, “真”定义为“ M 有效”。
- ◆ 注释 以“ M 有效”作为一种“真”, 意味着对任意公式 p , 为了判断 p 的“真假”, 要给出一个一阶结构 M , 并且**针对这个 M 和 M 上的所有 V** , $I(p)=t$, $I=(M, V, v)$ 。
- ❖ 注释 一个 $M=(D, F, P)$ 代表一个具体的应用领域; 因此, $\Gamma \models p$ 反映了 Γ 与 p 之间跨领域有效的逻辑推导关系。

2.6 讨论：一阶逻辑的语法部分和语义部分



$\Gamma \vdash p$ 当且仅当 $\Gamma \models p$?

2.6 K的可靠性定理

❖ K的可靠性 如果 $\Gamma \vdash p$, 则 $\Gamma \models p$ 。

❖ 引理 K的公理都是逻辑有效的。

◆ 证明 由K-L关系定理, 易证引理对K1-K3成立。

考虑K4。要证当项 u 对 $p(x)$ 中 x 自由时, 有 $\models \forall x p(x) \rightarrow p(u)$, 即对任何一阶结构 $M=(\mathbf{D}, \mathbf{F}, \mathbf{P})$, 有 $M \models \forall x p(x) \rightarrow p(u)$, 又等价于对一切解释 $I=(M, V, v)$, 如果 $I(\forall x p(x))=t$, 则 $I(p(u))=t$ 。对任意解释 I , 假设 $I(\forall x p(x))=t$, 则依定义, 对一切 $d \in \mathbf{D}$ 有 $I_{x/d}(p(x))=t$ 。设 $I(u)=d' \in \mathbf{D}$, 于是 $I(p(u))=I_{x/d'}(p(x))=t$, 故 $I(\forall x p(x) \rightarrow p(u))=t$ 。由 I 之任意性, 引理成立。K5类似可证。引理得证。

2.6 K的可靠性定理

❖ 定理(可靠性) 如果 $\Gamma \vdash p$, 则 $\Gamma \models p$ 。

◆ 证明 设 $\Gamma \vdash p$, 则存在推理 $p_1, \dots, p_n = p$ 。施归纳于 n 。

1. $n=1$ 时。有两种情况。第一, $p \in \Gamma$, 依语义后承定义, 结论成立; 第二, p 是公理, 由引理结论成立。

2. $n>1$ 时。有四种情况。第一、二种同1。第三种, p_n 由 p_i 和 p_j ($i, j < n$)用MP得到, 即 $p_j = p_i \rightarrow p_n$ 。由归纳假设有 $\Gamma \models p_i$ 和 $\Gamma \models p_j$ 。由MP有效性, 得 $\Gamma \models p_n$ 。第四种, $p_n = \forall x p_i$, $i < n$ 。由归纳假设有 $\Gamma \models p_i$ 。由UG有效性, 得 $\Gamma \models \forall x p_i$, 即 $\Gamma \models p_n$ 。

依归纳法原理, 结论对一切 n 成立。

2.6 K的可靠性定理

- ❖ 推论 (K相容性) 对任何 $p \in K(Y)$, $\vdash p$ 和 $\vdash \neg p$ 不同时成立。
- ◆ 证明 反证。假设 $\vdash p$ 和 $\vdash \neg p$ 同时成立。于是, 根据可靠性定理, $\models p$ 和 $\models \neg p$ 同时成立, 即 p 和 $\neg p$ 都是逻辑有效式。这是不可能的。
- ◆ 注释 在一阶谓词演算K自身中不可能推出矛盾。

2.6 K的可靠性定理

- ❖ 推论 对任何 $\Gamma \subseteq K(Y)$, 如果 Γ 有模型, 则 Γ 是相容的。
- ◆ 证明 反证。假设 Γ 不相容并且有模型 M 。于是, 存在一个公式 $p \in K(Y)$ 使得 $\Gamma \vdash p$ 和 $\Gamma \vdash \neg p$ 同时成立。根据可靠性定理, 有 $M \models p$ 和 $M \models \neg p$ 同时成立。根据 M 有效的定义, 这是不可能的。
- ◆ 注释 对任何 $\Gamma \subseteq K(Y)$, 只要 Γ 有一个模型, 则在 K 中, 从 Γ 不可能推出矛盾。