Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
1.315	A	Welche Fischart hat eine nach vorne zugespitzte Pupille?	Äsche	Hasel	Karpfen
1.316	A	Wie oft laicht der Aal?	einmal im Leben	jedes Jahr einmal	dreimal pro Jahr
1.317	C	Welche Fische haben Hechel- oder Bürstenzähne?	Aitel (Döbel) und Schied (Rapfen)	Bachforelle und Regenbogenforelle	Aal und Rutte (Quappe, Trüsche)
1.318	C	Welcher männliche Salmonide (Milchner) bildet in der Laichzeit keinen Laichhaken aus?	Bachsaibling	Bachforelle	Huchen
1.319	C	Welche Fischart hat Rückenstacheln ohne Flossenhäute?	Koppe	Zander	Stichling
2.001	B	Was ist das Säurebindungsvermögen (SBV) des Wassers?	es bezeichnet seinen Reaktionszustand	es ist ein Maß für seinen Kalkgehalt	es ist ein Maß für seinen Ammoniakgehalt
2.002	B	Was bewirkt ein hohes Säurebindungsvermögen (SBV) im Wasser?	Das Wasser reichert sich rasch mit Sauerstoff an.	Das Wasser ist gegenüber großen Schwankungen des pH-Werts gut gepuffert.	Das pH-abhängige Bindungsvermögen der Wassermoleküle ist groß.
2.003	A	Liegt das Säurebindungsvermögen extrem niedrig (unter 0,5), so ist das Fischwasser von	geringer Ertragsfähigkeit	hoher Ertragsfähigkeit	mittlerer Ertragsfähigkeit
2.004	A	Was ist zu befürchten, wenn in unmittelbarer Nähe eines kleinen stehenden Gewässers intensiv mit Gülle gedüngt wird?	Die Gülle kann leicht in das Gewässer eingeschwemmt werden und zu einem Fischsterben führen.	Durch die vom Wind verwehten Faulgase werden die Schwimmblattpflanzen geschädigt.	Eingeschwemmte Gülle kann die Angelschnüre beim Fischen angreifen.

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.005	B	Ein fischereilich ertragreiches Gewässer hat meist	einen hohen Silikatgehalt	einen hohen Kalkgehalt	einen hohen Gehalt an Huminsäuren
2.006	C	Bei welcher Wassertemperatur hat das Wasser die größte Dichte (höchstes spezifisches Gewicht)?	bei 0 °C	bei – 1 °C	bei +4 °C
2.007	A	Warum schwimmt Eis auf dem Wasser?	Eis hat ein geringeres spezifisches Gewicht als Wasser	die Wasserströmung hält das Eis an der Oberfläche	im Eis ist stets Luft eingeschlossen, die es schwimmfähig macht
2.008	C	Was bezeichnet man mit dem pH-Wert?	den Sauerstoffgehalt des Wassers	den Eisengehalt des Wassers	den Reaktionszustand des Wassers (sauer / neutral / alkalisch)
2.009	B	Welcher Reaktionszustand des Wassers liegt bei einem pH-Wert von 7 vor?	sauer	neutral	alkalisch
2.010	A	Welcher Reaktionszustand des Wassers liegt bei einem pH-Wert von 9 vor?	alkalisch (basisch)	sauer	neutral
2.011	B	Welche pH-Werte sind für die meisten heimischen Fischarten am besten geeignet?	pH-Werte über 9	pH-Werte um 7	pH-Werte unter 5
2.012	A	Welcher Reaktionszustand des Wassers liegt bei einem pH-Wert von 7,5 vor?	schwach alkalisch (basisch)	schwach sauer	neutral
2.013	B	Welcher Reaktionszustand des Wassers liegt bei einem pH-Wert von 6 vor?	neutral	sauer	alkalisch (basisch)

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.014	C	Was versteht man unter der Selbstreinigungskraft eines Gewässers?	Im Wasser befindliche Schwebstoffe setzen sich in den ruhigen Zonen ab.	Die Lebensgemeinschaften des Gewässers haben die Fähigkeit sich von Schädlingen zu befreien.	Biologische Prozesse bewirken den Abbau von organischen Stoffen (z. B. von Abwässern).
2.015	B	Was wird für die Selbstreinigung des Gewässers benötigt?	Stickstoff	Sauerstoff	Kohlendioxid
2.016	C	Welchen Einfluss hat die Wassertemperatur auf den Sauerstoffgehalt des Wassers?	Im warmen Wasser löst sich mehr Sauerstoff.	keinen	Im kalten Wasser löst sich mehr Sauerstoff.
2.017	B	Woher stammt der im Wasser gelöste Sauerstoff?	vom tierischen Plankton	aus der Luft und von Unterwasserpflanzen	aus dem Boden
2.018	A	In welchen Gewässern ist der Sauerstoffgehalt des Wassers meistens gleichbleibend hoch?	in schnell fließenden Bächen	in Karpfenteichen	in Baggerseen
2.019	A	Bei welcher der angegebenen Temperaturen kann das Wasser den meisten Sauerstoff binden?	bei +1 °C	bei +8 °C	bei +4 °C
2.020	C	Der Sättigungswert von Sauerstoff im Wasser ist abhängig	vom pH-Wert.	vom Härtegrad des Wassers.	von der Wassertemperatur.
2.021	A	Was versteht man unter dem Sättigungswert von Sauerstoff im Wasser?	die temperatur- und druckabhängige obere Grenze für die Löslichkeit von Sauerstoff im Wasser	die Veränderung des pH-Werts in Abhängigkeit des Sauerstoffgehalts	das vom Härtegrad des Wassers abhängige Sauerstoffbindungsvermögen

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.022	A	Welches Wasser ist meist sauerstoffarm?	Quellwasser	Teichwasser	Flusswasser
2.023	A	Welche Organismen reichern das Wasser mit Sauerstoff an?	das pflanzliche Plankton (Phytoplankton)	Muscheln und Schnecken	das tierische Plankton (Zooplankton)
2.024	A	Wie gelangt Sauerstoff in das Wasser?	durch Sauerstoffabgabe der grünen Unterwasserpflanzen und durch Sauerstoffaufnahme aus der Luft	durch Fäulnis abgestorbener Organismen	durch Verwitterung der Bodenteilchen
2.025	A	Welcher Faktor ist für die Sauerstofferzeugung der grünen Unterwasserpflanzen entscheidend?	das Sonnenlicht	eine Wassertemperatur von über 18 °C	ein pH-Wert von unter 3
2.026	A	Bis zu welcher Tiefe können grüne Pflanzen in Seen dauerhaft leben?	soweit ausreichend Licht eindringt	soweit der Wasserdruck nicht zu stark ist	bis zur Sprungschicht
2.027	C	Wodurch wird die Entwicklung von pflanzlichem Plankton (Phytoplankton) besonders gefördert?	durch starke Strömung	durch große Wassertiefe	durch Phosphorverbindungen
2.028	A	Wodurch kann in einem nährstoffreichen See eine für Fische gefährliche Sauerstoffzehrung auftreten?	durch starke Algenentwicklung und anschließendes Absterben der Algen	durch Absinken des pH-Wertes unter 5	durch rasch ansteigenden Luftdruck
2.029	A	Was bezeichnet man in einem See als „Wasserblüte “?	eine übermäßige Entwicklung von pflanzlichem Plankton (Phytoplankton)	die Blütezeit von Schwimmblattpflanzen, z. B. Teichrosen	den starken Anflug von Blütenpollen auf dem Gewässer

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.030	A	Was bezeichnet man als tierisches Plankton (Zooplankton)?	teils sehr kleine tierische Organismen, die im Freiwasser schweben	Kleintiere des Gewässerbodens	ins Wasser gefallene Insekten
2.031	C	Was bezeichnet man als pflanzliches Plankton (Phytoplankton)?	teils sehr kleine pflanzliche Organismen (Algen), die sich an der Oberfläche von Steinen oder Pflanzen anheften	den starken Anflug von Blütenpollen auf dem Gewässer	teils sehr kleine pflanzliche Organismen (Algen), die im Freiwasser schweben
2.032	B	Welche Pflanzen tragen bei Tageslicht wesentlich zur Erhöhung des Sauerstoffgehalts im Wasser bei?	Überwasserpflanzen	Unterwasserpflanzen	Schwimmblattpflanzen
2.033	A	Welches Kriterium wird für die Bestimmung der biologischen Gewässergüte in einem Fließgewässer herangezogen?	die Artenzusammensetzung der Kleintiere	die Fließgeschwindigkeit	der pH-Wert
2.034	B	Wie kann eine lang anhaltende Gewässerbelastung mit organischen Stoffen festgestellt werden?	durch regelmäßige Elektrobefischungen	durch regelmäßige Analyse von Kleintieren (biologische Gewässeruntersuchung)	durch regelmäßige Temperaturmessungen
2.035	C	Welche Fischart kommt mit einem vergleichsweise geringen Sauerstoffgehalt im Wasser aus?	Bachsaibling	Huchen	Schlammpeitzger

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.036	C	Welche der drei Fischarten hat den höchsten Sauerstoffbedarf?	Schleie	Aal	Bachforelle
2.037	A	Welche Organismen kommen häufig in verschmutzten Fließgewässern (Güteklasse III) vor?	Wasserasseln	Hüpferlinge	Steinfliegenlarven
2.038	C	Wo kommen Wasserasseln vermehrt vor?	in fischleeren versauerten Gewässern	in sauberen Gebirgsbächen	in organisch belasteten Gewässern
2.039	C	Welche Tiere sind Bioindikatoren für stark mit fäulnisfähigen Stoffen belastete Gewässer der Güteklasse IV?	Steinfliegenlarven	Bachflohkrebse	Schlammröhrenwürmer
2.040	A	Welche Tiere sind Bioindikatoren für unbelastete Fließgewässer der Güteklasse I?	Steinfliegenlarven	Rote Zuckmückenlarven	Wasserassel
2.041	A	Wodurch kann in einem Bach der Sauerstoffgehalt rasch abnehmen?	durch Einleitung von Abwasser	durch schnelles Absinken der Wassertemperatur um mehr als 5 °C	durch Photosynthese der Wasserpflanzen bei starker Sonneneinstrahlung
2.042	B	Welche Region eines Fließgewässers ist am besten mit Sauerstoff versorgt?	Barbenregion	Forellenregion	Brachsenregion
2.043	B	Welche Fischart ist für die Forellenregion typisch?	Schleie	Mühlkoppe	Frauennerfling

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.044	A	Welche Fischart ist in der Forellenregion nicht vertreten?	Waller (Wels)	Elritze	Rutte (Quappe, Trüsche)
2.045	C	Welche durchschnittliche Wassertemperatur ist für die Forellenregion typisch?	17 °C	24 °C	10 °C
2.046	C	In welcher Region eines Fließgewässers ist in der Regel die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers am größten?	Barbenregion	Brachsenregion	Forellenregion
2.047	B	Welche Fischarten leben hauptsächlich in der Äschen- und Barbenregion?	Schleie und Rotfeder	Nase und Huchen	Mühlkoppe und Elritze
2.048	C	Welche Fischarten sind für die Äschen- und Barbenregion typisch?	Waller (Wels) und Güster	Bachforelle und Mühlkoppe	Nase und Schneider
2.049	A	Welche Eigenschaften kennzeichnen u.a. die Barbenregion der Fließgewässer?	sandiger und kiesiger Untergrund sowie schnell fließendes Wasser	felsiger Untergrund und reißende Strömung	schlammiger Untergrund und langsam fließendes Wasser
2.050	B	Welche Fischart ist für die Barbenregion zusammen mit dem Leitfisch kennzeichnend?	Bachforelle	Nase	Schleie
2.051	C	Die Brachsenregion ist gekennzeichnet durch	reißende Strömung	keine Strömung	geringe Strömung

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.052	A	Welche Aussage ist richtig?	Die Strömungsgeschwindigkeit nimmt von der Forellen- bis zur Brachsenregion ab.	Die Gewässertrübung nimmt von der Äschen- bis zur Brachsenregion ab.	Der Sauerstoffgehalt ist in der Regel in der Forellenregion geringer als in der Barbenregion.
2.053	A	Welche Eigenschaften kennzeichnen u.a. die Brachsenregion der Fließgewässer?	schlammiger Untergrund und langsam fließendes Wasser	felsiger Untergrund und reißende Strömung	sandiger und kiesiger Untergrund sowie schnell fließendes Wasser
2.054	A	In welcher Fischregion der Fließgewässer leben in der Regel die meisten Fischarten?	Brachsenregion	Barbenregion	Äschenregion
2.055	B	Welche Fischarten leben hauptsächlich in der Brachsenregion?	Huchen und Äschen	Waller (Wels) und Flussbarsch	Mühlkoppe und Nase
2.056	C	Welche Fischarten leben hauptsächlich in der Brachsenregion?	Mühlkoppe und Elritze	Barbe und Nase	Rotauge und Schleie
2.057	A	Wo laicht der Europäische Aal?	in der Sargasso-See	im Mündungsbereich der Flüsse	im Golf von Biskaya
2.058	C	Welcher Lebensraum ist für den Edelkrebs typisch?	schnell fließende und strukturarme Fließgewässer mit Sommertemperaturen zwischen 8-10°C	flachgründige Altarme von Fließgewässern mit schlammigem Grund und dichtem Schwimmblattpflanzenbestand	langsam fließende und strukturreiche Fließgewässer mit Sommertemperaturen zwischen 15-20°C
2.059	B	Auf welche Gewässer ist das Vorkommen der Flussperlmuschel beschränkt?	sauerstoffarme Gewässer	kalkarme Gewässer	kalkreiche Gewässer

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.060	B	Welche Fischart lebt vorzugsweise in der Freiwasserzone eines Sees?	Rutte (Quappe, Trüsche)	Renke (Felchen)	Güster
2.061	C	Was ist ein Altwasser?	ein Gewässer mit überaltertem Fischbestand.	ein Gewässer, dessen Wasser gealtert ist.	eine natürlich oder künstlich abgetrennte ehemalige Flussstrecke.
2.062	B	Was ist charakteristisch für einen neu angelegten Baggersee?	eine hohe Wassertemperatur im Sommer	ein geringes Nahrungsangebot für Fische	ein geringer Sauerstoffgehalt an der Oberfläche
2.063	A	Welcher Seentyp wird vorwiegend durch Grundwasser gespeist?	ein Baggersee	ein natürlicher See	ein Stausee
2.064	C	Was ist unter der Vollzirkulation eines Sees zu verstehen?	der vollständige Sauerstoffabbau im Winter unter der Eisdecke	die vollständige Umsetzung der verfügbaren Nährstoffe in pflanzliche Biomasse	die vollständige Umwälzung des Wasserkörpers
2.065	B	Was versteht man unter dem Begriff Sprungschicht in einem See?	die sauerstofffreie Tiefenschicht	den Übergangsbereich zwischen dem warmen Oberflächen- und dem kalten Tiefenbereich	die vorgeschriebene Tiefe unter einem Sprungbrett an ausgewiesenen Badestellen
2.066	C	Was versteht man unter dem Begriff der Sommerstagnation in einem See?	eine gleichmäßige Sauerstoffverteilung während des Sommers	ein während des Sommers stagnierendes Wachstum des Fischbestands	eine stabile Temperaturschichtung im Sommer
2.067	A	Welche Fischart kommt in Hochgebirgsseen vor?	Elritze	Zander	Barbe
2.068	A	Welche Eigenschaften sind für einen Zandersee charakteristisch?	krautarm, unterschiedlich tief, hartgründig, trüb	krautarm, tief, mit großer Sichttiefe	krautreich, flach, mit großer Sichttiefe

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.069	B	Wann wird der Sauerstoffgehalt in einem stehenden Gewässer gering sein?	bei Sonnenschein und Massenvorkommen von Algen oder Unterwasserpflanzen	bei Dunkelheit und Massenvorkommen von Algen oder Unterwasserpflanzen	der Sauerstoffgehalt in stehenden Gewässern ist immer gering
2.070	B	Was ist charakteristisch für nährstoffreiche Seen?	Am Grund befinden sich nur geringe Ablagerungen von fäulnisfähigen Stoffen.	Pflanzliches Plankton (Phytoplankton) entwickelt sich im Frühjahr und Sommer in großen Mengen.	Das Tiefenwasser hat das ganze Jahr einen hohen Sauerstoffgehalt.
2.071	C	Was ist charakteristisch für nährstoffarme Seen?	Am Grund befinden sich regelmäßig große Ablagerungen an fäulnisfähigen, organischen Stoffen.	Das Tiefenwasser ist sehr sauerstoffarm.	Das Tiefenwasser hat einen hohen Sauerstoffgehalt.
2.072	B	Was versteht man unter Aufwuchs?	Massenentwicklung von Schilf und Rohr	Ansiedelung von Algen auf lebendem (z. B. Wasserpflanzen) und totem (z. B. Steinen) Material	Massenentwicklung von pflanzlichem Plankton
2.073	A	Welche Pflanze gehört zu den Überwasserpflanzen?	Pfeilkraut	Wasserlinse	Fadenalge
2.074	A	Welche Pflanzen gehören zu den Überwasserpflanzen?	Seggen und Simsen	Laichkraut und Wasserpest	Tausendblatt und Quellmoos
2.075	A	Welche Pflanzen gehören zu den Schwimmblattpflanzen?	Wasserlinsen, Seerose, Froschbiss	Binsen, Rohr, Schilf	Wasserpest, Tausendblatt, Armleuchtergewächse
2.076	B	Welche Pflanze gehört zu den Schwimmblattpflanzen?	Rohrkolben	Gelbe Teichrose	Armleuchtergewächs
2.077	A	Die Wasserpest ist	eine sich stark vermehrende Wasserpflanze	eine Wasservergiftung	eine Fischkrankheit

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.078	C	Welche Pflanze gehört zu den Unterwasserpflanzen?	Binse	Wasserknöterich	Wasserpest
2.079	B	Welche Pflanze gehört zu den Unterwasserpflanzen?	Froschbiss	Tausendblatt	Wasserschwertlilie
2.080	C	Welche Pflanze findet man überwiegend in der Forellenregion?	Wasserlinse	Schwimmendes Laichkraut	Quellmoos
2.081	A	Welche Pflanzen gehören zu den Unterwasserpflanzen?	durchwachsenes, kammförmiges und krauses Laichkraut	Wasserlinsen	Seggen
2.082	C	Welche Pflanze gehört zu den Überwasserpflanzen?	Tausendblatt	Wasserlinse	Flatterbinse
2.083	B	Welche Fischart laicht auf Unterwasserpflanzen ab?	Seeforelle	Hecht	Blaufelchen
2.084	B	Welche Organismen stehen am Anfang der Nahrungskette in den Gewässern?	die Fischbrut	einzellige Algen	das Zooplankton
2.085	B	Welche Nahrungskette ist typisch für den Lebensraum Fließgewässer?	Phytoplankton - Bachforelle - Äsche	Algenaufwuchs - Nase – Huchen	Zuckmückenlarven - Rotauge – Karpfen
2.086	C	Haben Pflanzennährstoffe in Gewässern fischbiologische Bedeutung?	Nein, sie haben keine Bedeutung, da sie für die Fische wertlos sind.	Nein, sie haben keine Bedeutung, da sie in der Regel in Lösung gehen.	Ja, sie sind Voraussetzung für eine Entwicklung der Wasserpflanzen, die wiederum Grundlage für die Tierernährung darstellt.

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.087	B	Welches Beispiel einer Nahrungskette ist typisch für die Brachsenregion?	Algen – Nase – Huchen	Insektenlarven – Rotauge – Hecht	Insektenlarven – Mühlkoppe – Bachforelle
2.088	B	Welche Tiere sind eine wertvolle Fischnahrung?	Wasserläufer	Zuckmückenlarven	Rückenschwimmer
2.089	A	Zum pflanzlichen Plankton (Phytoplankton) gehören	im Freiwasser eines Sees schwebende mikroskopisch kleine Pflanzen (Schwebalgen)	die auf Steinen und Pflanzen im Gewässer wachsenden Algen (Aufwuchs)	auf der Wasseroberfläche schwimmende höhere Wasserpflanzen, z. B. Wasserlinsen
2.090	B	Zum tierischen Plankton (Zooplankton) zählen	rote Zuckmückenlarven und Schlammröhrenwürmer	Hüpferlinge und Wasserflöhe	Eintagsfliegen- und Steinfliegenlarven
2.091	A	Welcher Bereich eines stehenden Gewässers ist für Fische am nahrungsreichsten?	die Uferzone	die Freiwasserzone	die Tiefenzone
2.092	C	Welche Tierart ist ein für den Forellenbach typisches Fischnährtier?	Schlammröhrenwurm	Hüpferling	Bachflohkrebs
2.093	A	Welche Fischnährtiere leben in Forellenbächen am Gewässergrund?	Stein- und Eintagsfliegenlarven	Gelbrandkäferlarven	Wasserflöhe
2.094	C	In welchen Gewässern kann sich Plankton entwickeln?	in Gewässern der Äschenregion	in kühlen Quellaustritten der Forellenregion	in gestauten Fließgewässern
2.095	B	Welche Tierart hat auch als Fischnahrung große Bedeutung?	Libellenlarve	Schlammröhrenwurm	Rückenschwimmer
2.096	B	Welche Fischnährtiere leben vorwiegend am Gewässergrund?	Wasserflöhe	Rote Zuckmückenlarven	Hüpferlinge

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.097	B	Wo leben die Schlammröhrenwürmer?	in der Uferzone auf Überwasserpflanzen	im Gewässerboden	im Freiwasser schwebend
2.098	B	Welche Fischnährtiere leben in der Freiwasserzone?	Steinfliegenlarven	Wasserflöhe	Schlammröhrenwürmer
2.099	C	Kriebelmückenlarven sind	ein Anzeiger für sehr gute Wasserqualität	Außenschmarotzer auf Fischen	eine gute Fischnahrung
2.100	C	Wie kann man Eintagsfliegen- und Steinfliegenlarven sicher unterscheiden?	Eintagsfliegen- und Steinfliegenlarven kann man nicht sicher unterscheiden.	Steinfliegenlarven haben die Kiemenanhänge am Hinterleib und in der Regel drei Schwanzborsten.	Eintagsfliegenlarven haben die Kiemenanhänge am Hinterleib und in der Regel drei Schwanzborsten.
2.101	C	Welche Tiere sind in der Äschenregion als Fischnahrung wichtig?	Schlammröhrenwürmer	Wasserflöhe	Köcherfliegen und ihre Larven
2.102	A	Wodurch wird der Bisam besonders problematisch?	Er zerstört Dämme und Uferanlagen und frisst Muscheln	er vertreibt die Fische aus ihrem Lebensraum	er ist ein bedeutender Nahrungskonkurrent der Fische
2.103	C	Der Bisam ernährt sich von	tierischem und pflanzlichem Plankton	Fischen, Amphibien und Mäusen	Wasser- und Uferpflanzen und deren Wurzeln, gelegentlich auch von Kleintieren und Muscheln
2.104	C	Wodurch wird der Biber besonders problematisch?	Durch den Bau von Nestern im Uferbereich verhindert er die Entwicklung einer Artenvielfalt.	Er ist ein bedeutender Nahrungskonkurrent für Fische.	Durch den Bau von Dämmen trägt er zur Veränderung der Gewässerstruktur bei, so dass wirtschaftliche und sicherheitsrelevante Schäden entstehen können.
2.105	A	Der Biber ernährt sich von	Pflanzen und Baumrinde	Kleintieren	Fischen
2.106	A	Welche Insektenlarve ernährt sich auch von kleinen Fischen?	Gelbrandkäferlarve	Zuckmückenlarve	Kriebelmückenlarve

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.107	C	Welche Vogelarten ernähren sich vorwiegend von Fischen?	Stockente, Höckerschwan	Bläßhuhn, Graugans	Haubentaucher, Gänsesäger, Kormoran
2.108	B	Welche Vogelart kann aufgrund ihres Ernährungsverhaltens den Fischbestand in Fließgewässern der Äschen- und Forellenregion nachhaltig reduzieren?	Wasseramsel	Kormoran	Haubentaucher
2.109	B	Welche Vogelarten ernähren sich auch von Kleinfischen?	Stockente, Graugans, Höckerschwan	Haubentaucher, Eisvogel, Gänsesäger	Blässhuhn, Schilfrohrsänger, Wasseramsel
2.110	C	Große fischereiliche Schäden entstehen durch lokal dichte Bestände von	Lachmöwe, Kiebitz, Großer Brachvogel.	Weißstorch, Blässhuhn, Bachstelze.	Kormoran, Gänsesäger, Graureiher.
2.111	B	Der Kormoran ernährt sich ausschließlich von	Amphibien und Wasserspitzmäusen.	Fischen aller Art.	Fischnährtieren.
2.112	A	Wie jagt der Graureiher hauptsächlich nach Fischen?	stehend im Uferbereich	im Sturzflug	schwimmtauchend
2.113	B	Wie jagt der Gänsesäger nach seiner Beute?	stehend im Uferbereich	schwimmtauchend	im Sturzflug
2.114	A	Wie jagt der Kormoran hauptsächlich nach seiner Beute?	schwimmtauchend	watend im Uferbereich	stehend im Uferbereich
2.115	C	Wie jagt der Fischadler hauptsächlich nach seiner Beute?	stehend im Uferbereich	schwimmtauchend	im Sturzflug

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.116	B	In welchen Gewässern können Kormoran und Gänsesäger einen Bestand an Bachforellen durch Fraß besonders stark gefährden?	in tiefen Seen	in strukturarmen Fließgewässern mit wenig Unterständen	in strukturreichen Fließgewässern mit einer großen Anzahl an Unterständen
2.117	A	Der Fischotter ernährt sich vorwiegend von	Fischen, Flusskrebsen, Amphibien und kleinen Wasservögeln	Wasserpflanzen	tierischem und pflanzlichem Plankton
2.118	B	Der Graureiher ernährt sich hauptsächlich von	Wasserpflanzen	Fischen, Fröschen und Mäusen	tierischem und pflanzlichem Plankton
2.119	A	Welches im und am Wasser lebende Säugetier fällt Bäume und verbaut diese zu Dämmen?	Biber	Bisam	Fischotter
2.120	B	Ist der Biber aus Sicht der Fischerei grundsätzlich negativ zu bewerten?	Ja, er frisst täglich bis zu 2 kg Fisch.	Nein, in Gewässern kann er zur Strukturvielfalt beitragen.	Nein, der Biber verursacht keinerlei Schäden.
2.121	C	Welchen fischökologisch negativen Einfluss können Maisfelder im Bereich von Fließgewässern haben?	Insekten können vom Wind ins Gewässer getragen werden.	Düngestoffe fördern das Wachstum von Ufergehölzen.	Bei Starkregen kann Bodensubstrat in das Gewässer eingetragen werden.
2.122	A	Für welche Tierarten ist die Feinsedimentbelastung der Gewässer besonders problematisch?	Flussperlmuschel, Äsche, Nase	Signalkrebs, Waller (Wels), Karpfen	Kamberkrebs, Rotauge, Schleie
2.123	B	Was sind Fischpässe?	Strecken in Gewässern, die für die Wanderung der Fische bevorzugt werden	Einrichtungen, die den Fischen das Überwinden von Staustufen im Gewässer ermöglichen	Zugangswege der Fischer zu guten Fangplätzen

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
2.124	A	Welche Maßnahme ist aus Sicht der Fischerei geeignet, um die Gewässerbelastung mit Feinsedimenten zu verringern?	Ausweisung von Uferschutzstreifen	Biogasanlagen nur noch mindestens 500 m entfernt vom Gewässer errichten	Ausbau der Wasserkraft
2.125	A	Sie fangen im Mai eine Brachse mit weißen „Körnchen“ auf dem Kopf. Worum handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit?	Laichausschlag	Tarnfärbung	Erkrankung
2.126	A	Unterwasserpflanzen sind in ausgewogener Dichte aus fischökologischer Sicht wünschenswert, weil sie	Sauerstoff für das Gewässer produzieren.	den Schwarzanglern das Fischen erschweren.	eine Beschattung des Gewässers bewirken.
2.127	A	Welche Organismen können in der lichtlosen Tiefenzone von Seen leben?	Bakterien	pflanzliches Plankton	Unterwasserpflanzen
2.128	A	Kann ein Hochwasser auch positive Folgen für ein Fließgewässer haben?	Ja, der Untergrund (z.B. Kiesbänke) wird vom Schlamm befreit.	Nein, bei Hochwasser fängt man nichts.	Nein, die Fische werden abgetrieben.
2.129	A	Was versteht man unter dem Kreislauf des Wassers?	Verdunstung, Niederschlag und Abfluss des Wassers	Strömung in großen Seen	Strudelbewegungen im Wasser