

## 第 3 章

# 位相的場の理論

この章は [?, Chapter7] および [?] に相当する．この節で登場する多様体は特に断らない限り常に  $C^\infty$  多様体である．また，体  $\mathbb{K}$  と言ったら  $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$  のいずれかを指すことにしよう．

### 3.1 モノイダル圏

まず手始めに，モノイダル圏とストリング図式の準備をする．特に，コボルディズム圏と有限次元 Hilbert 空間の圏がコンパクト対称モノイダル圏であることの直感的な説明をする．

#### 3.1.1 モノイダル圏の定義

##### 定義 3.1: モノイダル圏

モノイダル圏 (monoidal category) は，以下の 5 つのデータからなる：

- 圏  $\mathcal{C}$
- テンソル積 (tensor product) と呼ばれる関手  $\otimes: \mathcal{C} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$
- 単位対象 (unit object)  $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$
- associator と呼ばれる自然同値

$$\{a_{X,Y,Z}: (X \otimes Y) \otimes Z \xrightarrow{\cong} X \otimes (Y \otimes Z)\}_{X,Y,Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

- left/right unitors と呼ばれる自然同値

$$\{l_X: I \otimes X \xrightarrow{\cong} X\}_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})},$$

$$\{r_X: X \otimes I \xrightarrow{\cong} X\}_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

これらは  $\forall X, Y, Z, W \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  について以下の 2 つの図式を可換にする：

(triangle diagram)



定義 3.1 は，ストリング図式 (string diagram) で理解するのが良い．モノイダル圏の射  $f: X \rightarrow Y$ ,  $f': X' \rightarrow Y'$  があったら，そのテンソル積  $f \otimes f': X \otimes X' \rightarrow Y \otimes Y'$  は，ストリング図式上では次のようになる．

また，単位対象  $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  は空白として表す．従って例えば射  $f: I \rightarrow X$  は次のようになる：

### 【例 3.1.1】コボルディズム圏

厳密な構成<sup>a</sup>は後回しにして，コボルディズム圏 (cobordism category) を直感的に導入しよう．圏  $\text{Cob}_{D+1}$  は，

- $D$  次元多様体を対象
- $D+1$  次元のコボルディズム (cobordism) を射

とするような圏のことを言う． $D+1$  次元のコボルディズム  $\mathcal{M}: X \rightarrow Y$  と言うのは， $D+1$  次元多様体  $\mathcal{M}$  であって， $\partial\mathcal{M} = X \amalg Y$  となっているようなもの（の微分同相類）のことである：

射  $\mathcal{M}: X \rightarrow Y$ ,  $\mathcal{N}: Y \rightarrow Z$  の合成  $\mathcal{N} \circ \mathcal{M}: X \rightarrow Y \rightarrow Z$  は次の図式が物語る：

圏  $\text{Cob}_{D+1}$  は，disjoint union に関してモノイダル圏になる：

<sup>a</sup> 例えば， $(B, f)$ -structure の定義から始めるコボルディズムの統一的な扱いは [?, CHAPTER 1]などを参照．

### 【例 3.1.2】有限次元 Hilbert 空間の圏

有限次元  $\mathbb{K}$ -Hilbert 空間の圏 **Hilb** とは,

- 有限次元  $\mathbb{K}$ -Hilbert 空間を対象
- 線型写像を射
- 写像の合成を射の合成

に持つような圏のことを言う. **Hilb** はベクトル空間のテンソル積  $V_1 \otimes V_2$  の上に内積を

$$\langle v_1 \otimes v_2, w_1 \otimes w_2 \rangle := \langle v_1, w_1 \rangle_1 \langle v_2, w_2 \rangle_2$$

と定義することで**モノイダル圏**になる.

### 3.1.2 組紐付きモノイダル圏

#### 定義 3.2: 組紐付きモノイダル圏

組紐付きモノイダル圏 (braided monoidal category) とは, 以下の 2 つからなる:

- **モノイダル圏**  $\mathcal{C}$
- **組紐** (braiding) と呼ばれる自然同型

$$\{b_{X,Y}: X \otimes Y \xrightarrow{\cong} Y \otimes X\}_{X,Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

これらは  $\forall X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  について以下の図式を可換にする:

(hexagon diagrams)

$$\begin{array}{ccccc} X \otimes (Y \otimes Z) & \xrightarrow{a_{X,Y,Z}^{-1}} & (X \otimes Y) \otimes Z & \xrightarrow{b_{X,Y} \otimes 1_Z} & (Y \otimes X) \otimes Z \\ \downarrow b_{X,Y \otimes Z} & & & & \downarrow a_{Y,X,Z} \\ (Y \otimes Z) \otimes X & \xleftarrow{a_{Y,Z,X}^{-1}} & Y \otimes (Z \otimes X) & \xleftarrow{1_X \otimes b_{X,Z}} & Y \otimes (X \otimes Z) \\ (X \otimes Y) \otimes Z & \xrightarrow{a_{X,Y,Z}} & X \otimes (Y \otimes Z) & \xrightarrow{1_X \otimes b_{Y,Z}} & X \otimes (Z \otimes Y) \\ \downarrow b_{X \otimes Y, Z} & & & & \downarrow a_{X,Z,Y}^{-1} \\ Z \otimes (X \otimes Y) & \xleftarrow{a_{Z,X,Y}} & (Z \otimes X) \otimes Y & \xleftarrow{b_{X,Z} \otimes 1_Y} & (X \otimes Z) \otimes Y \end{array}$$

組紐付きモノイダル圏  $\mathcal{C}$  であって,  $\mathcal{C}$  の組紐が  $b_{X,Y} = b_{Y,X}^{-1}$  を満たすもののことを**対称モノイダル圏** (symmetric monoidal category) と呼ぶ.

ストリング図式で組紐を書く場合は次のようにする:

このとき **hexagon diagrams** はとてもわかりやすくなる:

対称モノイダル圏の条件も一目瞭然である：

### 【例 3.1.3】 $\mathbf{Cob}_{D+1}$ の組紐

$\mathbf{Cob}_{D+1}$  の組紐  $b_{X,Y}: X \otimes Y \longrightarrow Y \otimes X$  は、多様体  $(X \times [0, 1]) \amalg (Y \times [0, 1])$  と微分同相であるような  $D+1$  次元多様体のことを言う：図から、 $\mathbf{Cob}_{D+1}$  は対称モノイダル圏である。

### 【例 3.1.4】 $\mathbf{Hilb}$ の組紐

$\mathbf{Hilb}$  の組紐は

$$\begin{aligned} b_{X,Y}: X \otimes Y &\longrightarrow Y \otimes X, \\ x \otimes y &\longmapsto y \otimes x \end{aligned}$$

である。これがベクトル空間の同型写像であることが示される。明らかに  $b_{X,Y} = b_{Y,X}^{-1}$  なので  $\mathbf{Hilb}$  は対称モノイダル圏である。

### 3.1.3 閉圏・コンパクト圏・ダガー圏

圏  $\mathcal{C}$  を与える。Hom 関手 (Hom functor) とは、関手

$$\mathrm{Hom}: \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Sets}$$

であって

$$\begin{aligned} (X, Y) &\longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \\ \left( (f, g): (X', Y) \longrightarrow (X, Y') \right) &\longmapsto \left( \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X', Y'), h \longmapsto g \circ h \circ f \right) \end{aligned}$$

なる対応を与えるもののこと。

#### 定義 3.3: 閉圏

モノイダル圏  $\mathcal{C}$  を与える。

- $\mathcal{C}$  が左に閉じている (left closed) とは、internal hom functor と呼ばれる関手

$$\multimap: \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Sets}$$

と、currying と呼ばれる自然同型

$$\{c_{X,Y,Z}: \mathrm{Hom}(X \otimes Y, Z) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}(X, Y \multimap Z)\}_{X,Y,Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})}$$

の 2 つが存在することを言う。

- $\mathcal{C}$  が右に閉じている (right closed) とは、internal hom functor と呼ばれる関手と、currying と呼ばれる自然同型

$$\{c_{X,Y,Z}: \mathrm{Hom}(X \otimes Y, Z) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}(Y, X \multimap Z)\}_{X,Y,Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})}$$

の 2 つが存在することを言う。

対称モノイダル圏しか考えないので、以降では右に閉じているかどうかは気にしないことにする。

### 定義 3.4: 双対

モノイダル圏  $\mathcal{C}$  およびその任意の対象  $X, X^* \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を与える。  $X^*$  が  $X$  の右双対 (right dual) であり、かつ  $X$  が  $X^*$  の左双対 (left dual) であるとは、

- **unit** と呼ばれる射

$$i_X: I \longrightarrow X^* \otimes X$$

- **counit** と呼ばれる射

$$e_X: X \otimes X^* \longrightarrow I$$

が存在して以下の図式を可換にすることを言う：

(zig-zag equations)

$$\begin{array}{ccc} X \otimes I & \xrightarrow{1_X \otimes i_X} & X \otimes (X^* \otimes X) \\ \downarrow r_X & & \downarrow a_{X, X^*, X}^{-1} \\ & & (X \otimes X^*) \otimes X \\ & & \downarrow e_X \otimes 1_X \\ X & \xleftarrow{l_X} & I \otimes X \end{array}$$
  

$$\begin{array}{ccc} I \otimes X^* & \xrightarrow{i_X \otimes 1_{X^*}} & (X^* \otimes X) \otimes X^* \\ \downarrow l_{X^*} & & \downarrow a_{X^*, X, X^*} \\ & & X^* \otimes (X \otimes X^*) \\ & & \downarrow 1_{X^*} \otimes e_X \\ X^* & \xleftarrow{r_{X^*}} & X^* \otimes I \end{array}$$

双対のストリング図式は、単に矢印を逆にすれば良い：

このとき zig-zag equations が本当にジグザグしていることがわかる：

### 定義 3.5: コンパクト圏

モノイダル圏  $\mathcal{C}$  は、  $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が左・右双対を持つときコンパクト (compact) であると言われる。

【例 3.1.5】Cob の unit と counit

$\mathbf{Cob}_{D+1}$  における  $X \in \text{Ob}(\mathbf{Cob}_{D+1})$  の双対とは、向き付けを逆にした  $D$  次元多様体  $X$  のことである。特に  $\mathbf{Cob}_3$  における unit, counit はそれぞれ U 字管とそれを逆にしたもののような見た目をしている：

internal hom functor を  $X \multimap Y := X^* \otimes Y$  とすれば、図から  $\mathbf{Cob}_3$  が閉圏であることを直接確認できる。

【例 3.1.6】Hilb の unit と counit

Hilb において  $I = \mathbb{C}$  である。従って、 $X \in \text{Ob}(\mathbf{Hilb})$  の双対とは双対ベクトル空間  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(X, \mathbb{C})$  のことである。ブラ空間のことだと言っても良い。特に、自然な同型  $X^* \otimes Y \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(X, Y)$  を使うと  $X$  の unit は

$$\begin{aligned} i_X: I &\longrightarrow X^* \otimes X, \\ c &\longmapsto c \text{id}_X \end{aligned}$$

で、counit は

$$\begin{aligned} e_X: X \otimes X^* &\longrightarrow I, \\ x \otimes f &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

であることがわかる。internal hom functor を  $X \multimap Y := X^* \otimes Y \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(X, Y)$  とすれば Hilb が閉圏であることを直接確認できる。

実は、コンパクト圏は自動的に閉圏になる。これは

$$X \multimap Y := X^* \otimes Y$$

として internal hom functor を定義することで確認できる。

定義 3.6: ダガー圏

圏  $\mathcal{C}$  がダガー圏 (dagger category) であるとは、関手

$$\dagger: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$$

が存在して以下を充たすことを言う：

- (1)  $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $X^\dagger = X$  を充たす。
- (2)  $\mathcal{C}$  の任意の射  $f: X \longrightarrow Y$  に対して  $(f^\dagger)^\dagger = f$  を充たす。

【例 3.1.7】Cob の dagger

$\mathbf{Cob}_{D+1}$  における  $M: X \longrightarrow Y$  のダガーは、上下を逆にしてから  $M$  の連結成分毎に向きを逆にすることで得られる。

### 【例 3.1.8】 Hilb の dagger

Hilb における  $f: X \longrightarrow Y$  のダガーは、 $\forall \phi \in X, \forall \psi \in Y$  に対して

$$\langle f^\dagger(\psi), \phi \rangle := \langle \psi, f(\phi) \rangle$$

とすることで定義される。

### 3.1.4 モノイダル関手

モノイダル関手とは、ざっくり言うとモノイダル圏の構造を保存するような関手のことである：

#### 定義 3.7: モノイダル関手

2つのモノイダル圏  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  の間の関手

$$F: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}$$

が lax monoidal functor であるとは、

- 射

$$\varepsilon: I_{\mathcal{D}} \longrightarrow F(I_{\mathcal{C}})$$

- 自然変換

$$\{\mu_{X,Y}: F(X) \otimes_{\mathcal{D}} F(Y) \longrightarrow F(X \otimes_{\mathcal{C}} Y)\}_{X,Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

があって、 $\forall X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して以下の図式が可換になること：

(associativity)

$$\begin{array}{ccc} (F(X) \otimes_{\mathcal{D}} F(Y)) \otimes_{\mathcal{D}} F(Z) & \xrightarrow{a_{F(X), F(Y), F(Z)}} & F(X) \otimes_{\mathcal{D}} (F(Y) \otimes_{\mathcal{D}} F(Z)) \\ \mu_{X,Y} \otimes 1_{F(Z)} \downarrow & & \downarrow 1_{F(X)} \otimes \mu_{Y,Z} \\ F(X \otimes_{\mathcal{C}} Y) \otimes_{\mathcal{D}} F(Z) & & F(X) \otimes_{\mathcal{D}} F(Y \otimes_{\mathcal{C}} Z) \\ \mu_{X \otimes_{\mathcal{C}} Y, Z} \downarrow & & \downarrow \mu_{X, Y \otimes_{\mathcal{C}} Z} \\ F((X \otimes_{\mathcal{C}} Y) \otimes_{\mathcal{C}} Z) & \xrightarrow{F(a_{X,Y,Z}^{\mathcal{C}})} & F(X \otimes_{\mathcal{C}} (Y \otimes_{\mathcal{C}} Z)) \end{array}$$

(unitality)

$$\begin{array}{ccc} I_{\mathcal{D}} \otimes_{\mathcal{D}} F(X) & \xrightarrow{\varepsilon \otimes 1_{F(X)}} & F(I_{\mathcal{C}}) \otimes_{\mathcal{D}} F(X) \\ l_{F(X)}^{\mathcal{D}} \downarrow & & \downarrow \mu_{I_{\mathcal{C}}, X} \\ F(X) & \xleftarrow{F(l_X^{\mathcal{C}})} & F(I_{\mathcal{C}} \otimes_{\mathcal{C}} X) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
F(X) \otimes_{\mathcal{D}} I_{\mathcal{D}} & \xrightarrow{1_{F(X)} \otimes \varepsilon} & F(X) \otimes_{\mathcal{D}} F(I_{\mathcal{C}}) \\
\downarrow r_{F(X)}^{\mathcal{D}} & & \downarrow \mu_{X, I_{\mathcal{C}}} \\
F(X) & \xleftarrow{F(r_X^{\mathcal{C}})} & F(X \otimes_{\mathcal{C}} I_{\mathcal{C}})
\end{array}$$

- lax monoidal functor  $F$  の  $\varepsilon$  と  $\mu_{X,Y}$  が全て同型射ならば,  $F$  は **strong monoidal functor** と呼ばれる.
- lax monoidal functor  $F$  の  $\varepsilon$  と  $\mu_{X,Y}$  が全て恒等射ならば,  $F$  は **strict monoidal functor** と呼ばれる.

## 3.2 TQFT の定義

位相的場の理論 (Topological Quantum Field Theory; TQFT) の枠組みをトップダウンに導入する.

### 3.2.1 Atiyah の公理系

まず, 全ての出発点として Atiyah の公理系 [?] というものがある:

#### 公理 3.1: Atiyah の公理系 (若干簡略版)

体  $\mathbb{K}$  上の<sup>a</sup>,  $D$  次元の位相的場の理論 (Topological Quantum Field Theory; TQFT) とは, 以下の 2 つのデータからなる:

- (1) 向き付けられた (oriented)  $D$  次元の閉多様体 (closed manifold)  $\Sigma$  に対応づけられた有限次元  $\mathbb{K}$ -ベクトル空間  $V(\Sigma)$
- (2) 向き付けられた  $D+1$  次元の境界付き多様体  $M$  に対応づけられたベクトル  $Z(M) \in V(\partial M)$

これらのデータは以下の条件を充たす:

#### (TQFT-1)

$Z$  は向きを保つ微分同相写像について関手的 (functorial) に振る舞う.

#### (TQFT-2)

$Z$  は対合的 (involutory) である.

#### (TQFT-3)

$Z$  はモノイダル的 (multiplicative<sup>b</sup>) である.

<sup>a</sup> 原論文 [?] では環としていて, ベクトル空間の代わりに環上の有限生成加群を扱っている. 今回は Hilbert 空間しか考えないので体  $\mathbb{K}$  としておいた.

<sup>b</sup> 「乗法的」というと語弊がありそうなのでモノイダル的と言った.

[?] に倣って公理の意味を精査していく.



### (TQFT-1)

この公理は2つの要請を持つ：

- (1)  $D$  次元閉多様体  $\Sigma, \Sigma', \Sigma''$  の間の向きを保つ微分同相写像  $f: \Sigma \rightarrow \Sigma', g: \Sigma' \rightarrow \Sigma''$  に対して、 $V(f): V(\Sigma) \rightarrow V(\Sigma')$  はベクトル空間の同型写像で、 $V(g \circ f) = V(g) \circ V(f)$  が成り立つ。
- (2) 向きを保つ微分同相写像  $f: \Sigma \rightarrow \Sigma'$  が、 $D+1$  次元多様体  $M, M'$  であって  $\Sigma = \partial M, \Sigma' = \partial M'$  を満たすものの上に  $f: M \rightarrow M'$  と拡張される場合に  $V(f)(Z(M)) = Z(M')$  を満たす。

### (TQFT-2)

$\Sigma$  の向きを逆にして得られる  $D$  次元閉多様体を  $\Sigma^*$  と書く<sup>\*1</sup>とき、 $V(\Sigma^*) = V(\Sigma)^*$  を満たす<sup>\*2</sup>。

### (TQFT-3)

この公理は5つの要請を持つ：

- (1)  $D$  次元閉多様体  $\Sigma_1, \Sigma_2$  に対して

$$V(\Sigma_1 \amalg \Sigma_2) = V(\Sigma_1) \otimes V(\Sigma_2)$$

が成り立つこと。

- (2)  $D+1$  次元多様体  $M, M_1, M_2$  に対して  $\partial M_1 = \Sigma_1 \amalg \Sigma_3, \partial M_2 = \Sigma_2 \amalg \Sigma_3^*, M = M_1 \cup_{\Sigma_3} M_2$  が成り立つならば、

$$Z(M) = \langle Z(M_1) | Z(M_2) \rangle$$

ただし、

$$\langle | \rangle : V(\partial M_1) \otimes V(\partial M_2) = V(\Sigma_1) \otimes V(\Sigma_3) \otimes V(\Sigma_3)^* \otimes V(\Sigma_2) \rightarrow V(\partial M) = V(\Sigma_1) \otimes V(\Sigma_2),$$

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_3\rangle \otimes \langle \varphi_3| \otimes |\psi_2\rangle \mapsto \langle \varphi_3 | \psi_3 \rangle |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

である。

- (3) (2) において  $\Sigma_3 = \emptyset$  ならば、

$$Z(M) = Z(M_1) \otimes Z(M_2)$$

- (4) (1) から<sup>\*3</sup>、

$$V(\emptyset) = \mathbb{K}$$

- (5) (3) から<sup>\*4</sup>、

$$Z(\emptyset) = 1$$

今や別の同値な定義ができる。 $D+1$  次元多様体  $M$  の境界  $\partial M$  を

$$\partial M = \Sigma_1^* \amalg \Sigma_2$$

<sup>\*1</sup> 【例 3.1.5】の意味で、圏  $\mathbf{Cob}_{D+1}$  における  $\Sigma \in \text{Ob}(\mathbf{Cob}_{D+1})$  の双対となっている。

<sup>\*2</sup>  $V(\Sigma)$  が有限次元なので、 $V(\Sigma)^*$  はブラ空間と見做せる。

<sup>\*3</sup>  $\mathbf{Cob}_{D+1}$  の単位対象は  $\emptyset$  なので  $\emptyset = \emptyset \amalg \emptyset$ 。よって (1) から  $V(\emptyset) = V(\emptyset) \otimes V(\emptyset)$ 。これを満たすのは  $V(\emptyset) = 0, \mathbb{K}$  (**モノイダル圏**  $\mathbf{Vec}_{\mathbb{K}}$  の単位対象は  $\mathbb{K}$  である) のどちらかしかないので、非自明な方を採用する。

<sup>\*4</sup>  $\emptyset = \emptyset \amalg \emptyset$  なので (3) から  $Z(\emptyset) = Z(\emptyset) \otimes Z(\emptyset)$ 。これを満たす  $V(\emptyset) = \mathbb{K}$  の元は  $0, 1$  しかないので、非自明な方を採用する。

と分解すると\*5, (TQFT-3)-(1) より  $Z(M) \in V(\partial M) = Z(\Sigma_1)^* \otimes Z(\Sigma_2) \cong \text{Hom}_{\mathbb{K}}(Z(\Sigma_1), Z(\Sigma_2))$  が言えるので,  $Z(M)$  を線型写像  $Z(M): V(\Sigma_1) \rightarrow V(\Sigma_2)$  と同一視できるのである. (TQFT-1) もあわせると, 結局これまで  $V, Z$  と書いていたものは **strong monoidal functor**

$$Z: \mathbf{Cob}_{D+1} \rightarrow \mathbf{Vec}_{\mathbb{K}}$$

の1つに集約することができる.

### 定義 3.8: TQFT の定義

$D$  次元の位相的場の理論 (Topological Quantum Field Theory; TQFT) とは, コボルディズム圏からある対称モノイダル圏  $\mathcal{D}$  への **strict monoidal functor**<sup>a</sup>

$$Z: \mathbf{Cob}_{D+1} \rightarrow \mathcal{D}$$

のこと.

<sup>a</sup> strong monoidal functor とする場合もある (例えば <https://ncatlab.org/nlab/show/cobordism>) ようだが, 原論文 [?] では strict monoidal functor になっていた.

興味があるのは  $\mathcal{D} = \mathbf{Vec}_{\mathbb{K}}, \mathbf{Hilb}$  の場合なので, 以下では **TQFT** と言ったら **strict monoidal functor**

$$Z: \mathbf{Cob}_{D+1} \rightarrow \mathbf{Vec}_{\mathbb{K}}, \mathbf{Hilb}$$

を指すことにしよう.

## 3.3 連続な高次対称性

エニオンのフュージョン則を議論する前に少し寄り道をして, [?], [?] に倣って一般化対称性 (generalized symmetry)<sup>\*6</sup> の話をする. この節では自然単位系を使う. 時空を表す  $D+1$  次元多様体を  $\mathcal{M}$  と書き,  $\mathcal{M}$  のチャートの座標関数を  $(x^0, x^1, \dots, x^D) =: (t, \mathbf{x})$  と書く. 特に  $D$  次元多様体  $\Sigma$  を使って  $\mathcal{M} = \Sigma \times \mathbb{R}$  または  $\Sigma \times S^1$  と書ける場合は  $x^0 =: t$  で  $\mathbb{R}$  または  $S^1$  成分のチャート (時間) を表すことにし,  $\Sigma$  のことを時間一定面と呼ぶ.  $\mathcal{M}$  として Minkowski 時空を考える場合, Minkowski 計量としては  $[\eta_{\mu\nu}] := (-1, +1, \dots, +1)$  を用いる. Minkowski 計量でない一般の計量テンソルは  $g := g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu \in \Gamma(T^*\mathcal{M} \otimes T^*\mathcal{M})$  と表記し, 共役計量テンソルを  $g^{\mu\nu} \partial_\mu \otimes \partial_\nu \in \Gamma(T\mathcal{M} \otimes T\mathcal{M})$  と表記する.

$\mathcal{M}$  に計量  $g_{\mu\nu}$  が与えられたとき, 音楽同型 (musical isomorphism) を

$$\begin{aligned} \flat: \mathfrak{X}(\mathcal{M}) &\rightarrow \Omega^1(\mathcal{M}), X^\mu \partial_\mu \mapsto g_{\mu\nu} X^\nu dx^\mu, \\ \sharp: \Omega^1(\mathcal{M}) &\rightarrow \mathfrak{X}(\mathcal{M}), \omega_\mu dx^\mu \mapsto g^{\mu\nu} \omega_\nu \partial_\mu \end{aligned}$$

で定義する. Hodge star は

$$\begin{aligned} \star: \Omega^p(\mathcal{M}) &\rightarrow \Omega^{D+1-p}, \\ dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p} &\mapsto \frac{1}{(D+1-p)!} g^{\mu_1 \nu_1} \dots g^{\mu_p \nu_p} \epsilon_{\nu_1 \dots \nu_p \mu_{p+1} \dots \mu_{D+1}} dx^{\mu_{p+1}} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_{D+1}} \end{aligned}$$

\*5 どちらか一方が  $\emptyset$  になっても良い

\*6 高次対称性 (higher form symmetry) と呼ばれることもある.

を線型に拡張することで定義される．特に不変体積要素を

$$d^{D+1}x := \star 1 = \sqrt{|g|} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{D+1}$$

と定義する．

$\mathcal{M}$  の  $p$  次元部分多様体<sup>\*7</sup>  $\mathcal{N}^{(p)} \subset \mathcal{M}$  上で  $p$ -形式  $\omega \in \Omega^p(\mathcal{M})$  を積分する場合, 包含写像  $\iota: \mathcal{N}^{(p)} \hookrightarrow \mathcal{M}$  による引き戻し  $\iota^*: \Omega^p(\mathcal{M}) \longrightarrow \Omega^p(\mathcal{N}^{(p)})$  を用いて

$$\int_{\mathcal{N}} \omega := \int_{\mathcal{N}^{(p)}} \iota^* \omega$$

と定義する．このとき, Poincaré 双対を考えることで

$$\int_{\mathcal{N}} \omega = \int_{\mathcal{M}} \omega \wedge \delta(\mathcal{N}^{(p)})$$

を満たす  $\delta(\mathcal{N}^{(p)}) \in \Omega^{D+1-p}(\mathcal{M})$  (**デルタ関数  $p$ -形式**と呼ぶ) の存在がわかる<sup>\*8</sup>．さて,  $\mathcal{N}^{(p)} = \partial\mathcal{M}^{(p+1)}$  の場合を考える． $\forall \omega \in \Omega^p(\mathcal{M})$  に対して Stokes の定理から

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{M}} \omega \wedge \delta(\partial\mathcal{M}^{(p+1)}) &= \int_{\partial\mathcal{M}^{(p+1)}} \omega = \int_{\mathcal{M}^{(p+1)}} d\omega = \int_{\mathcal{M}} d\omega \wedge \delta(\mathcal{M}^{(p+1)}) \\ &= \int_{\mathcal{M}} d(\omega \wedge \delta(\mathcal{M}^{(p+1)})) + (-1)^{p+1} \int_{\mathcal{M}} \omega \wedge d(\delta(\mathcal{M}^{(p+1)})) \\ &= (-1)^{p+1} \int_{\mathcal{M}} \omega \wedge d(\delta(\mathcal{M}^{(p+1)})) \end{aligned}$$

がわかるので,

$$d\delta(\mathcal{M}^{(p+1)}) = (-1)^{p+1} \delta(\partial\mathcal{M}^{(p+1)})$$

が成り立つ． $p$  次元部分多様体  $\mathcal{M}^{(p)}$  と  $D+1-p$  次元部分多様体  $\mathcal{M}^{(D+1-p)}$  に対して, これらの向きを考慮した**交点数**を

$$I(\mathcal{M}^{(p)}, \mathcal{M}^{(D+1-p)}) := \int_{\mathcal{M}} \delta(\mathcal{M}^{(p)}) \wedge \delta(\mathcal{M}^{(D+1-p)})$$

で定義する． $\mathcal{C}^{(p-1)} = \partial\mathcal{M}^{(p)}$  を満たす  $\mathcal{C}^{(p-1)}$  と  $\mathcal{M}^{(D+1-p)}$  の**絡み数**は

$$\text{Link}(\mathcal{C}^{(p-1)}, \mathcal{M}^{(p)}) := I(\mathcal{M}^{(p)}, \mathcal{M}^{(D+1-p)})$$

と定義される．

### 3.3.1 通常の対称性

$N$  成分の場<sup>\*9</sup>  $\varphi: \mathcal{M} \longrightarrow \mathbb{K}^N$ ,  $x \longmapsto (\varphi_i(x))_{1 \leq i \leq N}$  は, あるベクトル束  $\mathbb{K}^N \hookrightarrow E \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$  の切断と理解する．場の変換性はベクトル束の変換関数に由来する．

<sup>\*7</sup> コンパクトな埋め込まれた  $C^\infty$  多様体と仮定する．

<sup>\*8</sup> 厳密な扱いは [?, p.270] を参照．ここでは雑に扱う．

<sup>\*9</sup> 場  $\varphi$  の成分を表す添字として  $a, b, c, \dots$  を使う．

局所的な場のラグランジアン密度  $\mathcal{L}(\varphi_a(x), \partial_\mu \varphi_a(x))$  を持つ古典系を考える．この系の作用は

$$S[\varphi] := \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \mathcal{L}(\varphi_a(x), \partial_\mu \varphi_a(x))$$

と書かれる．場に関する作用の変分とは，勝手な「微小」切断  $\delta\psi \in \Gamma(E)$  による場の微小変換

$$\mathcal{T}_{\delta\psi}: \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E), \varphi \longmapsto \varphi + \delta\psi$$

を用いて

$$\delta_{\delta\psi} S[\varphi] := S[\mathcal{T}_{\delta\psi}(\varphi)] - S[\varphi]$$

と定義される．頭には Stokes の定理を使って

$$\begin{aligned} \delta_{\delta\psi} S[\varphi] &= \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a(x)} \delta\psi_a(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \partial_\mu (\delta\psi_a(x)) \right) \\ &= \int_{\partial \mathcal{M}} \star b \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \delta\psi_a(x) \right) + \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a(x)} - \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \right) \right) \delta\psi_a(x) \end{aligned} \quad (3.3.1)$$

と書けるが，境界条件  $\partial \mathcal{M} = \emptyset$  または  $\delta\psi|_{\partial \mathcal{M}} = 0$  を要請して第 1 項を落とすのが普通である．

**最小作用の原理**とは，古典論で実現される場の配位（このような場の配位は **on shell** であると呼ばれる） $\varphi_{\text{on shell}} \in \Gamma(E)$  に対して，

$$\forall \delta\psi, \delta_{\delta\psi} S[\varphi_{\text{on shell}}] = 0 \quad (3.3.2)$$

を要請するものである．(3.3.1) から，on shell な場  $\varphi_{\text{on shell}} \in \Gamma(E)$  が満たすべき方程式として Euler-Lagrange 方程式

$$1 \leq \forall i \leq N, \forall x \in \mathcal{M}, \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a(x)} - \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \right) \right] \Big|_{\varphi_{\text{on shell}}(x), \partial_\mu \varphi_{\text{on shell}}(x)} = 0 \quad (3.3.3)$$

が得られるのだった．煩雑なので以後  $\mathcal{L}$  の引数は適宜省略する．

**対称性変換**とは，場の間の変換

$$\mathcal{T}: \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E)$$

であって作用を不変にするもののことである．つまり，最小作用の原理 (3.3.2) とは異なり  $\varphi$  ではなく  $\mathcal{T}$  が

$$\forall \varphi \in \Gamma(E), \delta_{\mathcal{T}} S[\varphi] = 0 \quad (3.3.4)$$

によって定義される．ここに  $\delta_{\mathcal{T}} S[\varphi] := S[\mathcal{T}(\varphi)] - S[\varphi]$  とおいた．定義 (3.3.4) は off shell な場も考慮していることに注意すべきである．特に対称性変換  $\mathcal{T}$  が大域的な微小パラメータ  $\varepsilon$  および  $\partial_0 \varphi$  に陽に依存しない<sup>\*10</sup>

<sup>\*10</sup> この仮定は (3.3.7) の導出で使うだけ（実はもっと条件を弱めることもできる）なので，Noether の定理の導出には必要ない．

$h \in \Gamma(E)$  を用いて  $\mathcal{T}(\varphi) = \mathcal{T}_{\varepsilon h}(\varphi)$  と書かれる場合を考えよう.

$$\begin{aligned}
0 &= \delta_{\mathcal{T}} S[\varphi] = \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a(x)} \varepsilon h_a(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \partial_\mu (\varepsilon h_a(x)) \right) \\
&= \varepsilon \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a(x)} - \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \right) \right) h_a(x) \\
&\quad + \varepsilon \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \left( \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \right) h_a(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \partial_\mu (h_a(x)) \right) \\
&= \varepsilon \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a(x)} - \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \right) \right) h_a(x) \\
&\quad + \varepsilon \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} h_a(x) \right)
\end{aligned}$$

が成り立つ. i.e. **Noether カレント**を  $D+1$  個の  $X^\mu|_{\partial\mathcal{M}} = 0$  を充たす  $C^\infty$  関数  $X^\mu$  を用いて

$$j^\mu(x) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} h_a(x) - X^\mu(x) \quad (3.3.5)$$

で定義すると, これが on shell とは限らない任意の  $\varphi \in \Gamma(E)$  に対して

$$\partial_\mu j^\mu(x) = - \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a(x)} - \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a(x))} \right) \right] \Big|_{\varphi(x), \partial_\mu \varphi(x)} h_a(x)$$

を充たすことが分かった. 特にon shellな任意の  $\varphi_{\text{on shell}} \in \Gamma(E)$  に対しては (3.3.3) からカレント (3.3.5) の保存則

$$\partial_\mu j^\mu(x) = 0 \quad (3.3.6)$$

が成り立つ. このように, 対称性変換が存在するとそれに対応してon shellな保存則 (3.3.6) を充たすカレントが存在する (**Noether の定理**).

ここで,  $\mathcal{M} = \Sigma \times \mathbb{R}$  と書ける場合を考える. このとき **Noether チャージ**を

$$Q(t) := \int_{\Sigma} d^D x j^0(t, \mathbf{x})$$

と定義すると, 保存則 (3.3.6) から  $\partial\Sigma = \emptyset$  または  $j^\mu|_{\partial\Sigma} = 0$  を要請すれば

$$\frac{dQ(t)}{dt} = - \int_{\Sigma} d^D x \partial_i j^i(t, \mathbf{x}) = 0$$

となって時間に依存しないことがわかる. さらに,  $\pi^b(x) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 \varphi_b(x))}$  とおくと

$$Q = \int_{\Sigma} d^D x (\pi^a(x) h_a(x) - X^\mu(x))$$

であるから, Poisson 括弧が

$$\begin{aligned}
\{\varphi_a(x), Q\}_{\text{P}} &= \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}y \left( \frac{\partial \varphi_a(x)}{\partial \varphi_b(y)} \frac{\partial Q}{\partial \pi^b(y)} - \frac{\partial \varphi_a(x)}{\partial \pi^b(y)} \frac{\partial Q}{\partial \varphi_b(y)} \right) \\
&= \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}y \left( \delta_a^b \delta^{D+1}(x-y) \int_{\Sigma} d^D z \delta_b^c \delta^D(z-y) h_c(z) - 0 \right) \\
&= h_a(x)
\end{aligned}$$

と求まる．つまり， $Q$  は対称性変換  $\mathcal{T}_{\varepsilon h}$  の無限小生成子<sup>\*11</sup>である．従って，正準量子化を行うと

$$[-i\hat{Q}, \hat{\varphi}_a(x)] = h_a(x) \quad (3.3.7)$$

となる．

### 【例 3.3.1】 $D+1$ 次元自由フェルミオン系

時空  $\mathcal{M}$  を Minkowski 時空，場をスピン束  $\mathbb{C}^4 \hookrightarrow S \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}$  の切断  $\psi \in \Gamma(S)$  とする (Dirac 場)．作用はガンマ行列  $\gamma^\mu$ ，Dirac 共役  $\bar{\psi} := i\psi^\dagger \gamma^0$  を用いて

$$S[\psi] = - \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \bar{\psi}(x) (\gamma^\mu \partial_\mu + m) \psi(x)$$

と書かれる．Euler-Lagrange 方程式 (3.3.3) は， $\bar{\psi}$ ,  $\psi$  に関する変分によってそれぞれ

$$\begin{aligned} (\gamma^\mu \partial_\mu + m) \psi &= 0, \\ \partial_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu - m \bar{\psi} &= 0 \end{aligned}$$

となる．この系の対称性変換は，例えば  $e^{i\theta} \in U(1)$  による

$$\mathcal{T}: \Gamma(S) \longrightarrow \Gamma(S), \psi \longmapsto e^{i\theta} \psi$$

がある． $\mathcal{T}$  を生成する無限小変換は  $e^{i\theta}$  の Taylor 展開より  $\mathcal{T}_{i\theta\psi}: \psi \longmapsto \psi + i\theta\psi$  である．つまり，先ほどの議論で登場した  $h \in \Gamma(S)$  は今回の場合  $i\psi$  に相当する．よって対称性変換  $\mathcal{T}$  に対応する Noether カレント (3.3.5) は

$$j^\mu(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \psi} i\psi = -i\bar{\psi} \gamma^\mu \psi \quad (3.3.8)$$

と求まる． $\mathcal{M} = \mathbb{R}^D \times \mathbb{R}$  であるから，Noether チャージは

$$Q = -i \int_{\mathbb{R}^D} d^D x \bar{\psi}(x) \gamma^0 \psi(x)$$

であり，正準量子化すると (3.3.7) より

$$[i\hat{Q}, \hat{\psi}(x)] = -i\hat{\psi}(x)$$

が成り立つ．ここから有限変換  $\mathcal{T}$  に戻すには，指数写像を用いれば良い．こうして

$$\exp(i\theta\hat{Q}) \hat{\psi}(x) \exp(-i\theta\hat{Q}) = e^{-i\theta} \hat{\psi}(x) \quad (3.3.9)$$

だと分かった．ここで [?, p.6] に倣って  $g := e^{i\theta}$ ,  $R_g := e^{-i\theta}$ ,  $\hat{U}_g(\mathbb{R}^D) := \exp(i\theta\hat{Q})$  とおく．

- $U_g(\mathbb{R}^D)$  を  $\mathcal{M}$  の  $D$  次元部分多様体  $\mathbb{R}^D$  に付随する**対称性演算子**
- $\hat{\psi}$  を**荷電物体** (charged object)

と呼ぼう． $\forall g, g' \in U(1)$  に対して，対称性演算子は群のように振る舞う：

$$\hat{U}_g(\mathbb{R}^D) \hat{U}_{g'}(\mathbb{R}^D) = \hat{U}_{gg'}(\mathbb{R}^D)$$

---

<sup>\*11</sup> Hamilton フローの意味である

時間一定面を  $\mathbb{R}^D \subset \mathcal{M}$  にとったのは、正準量子化により (3.3.7) を導くためであった。しかるに、時間一定面を任意の  $D$  次元部分多様体  $\mathcal{M}^{(D)} \subset \mathcal{M}$  にとれるのではないかと期待される。積分領域が複雑になるので微分形式を使うと見通しが良い。

$$\star j := \star b(j^\mu \partial_\mu)$$

とおこう。このとき

$$d \star j = \partial_\mu j^\mu d^{D+1}x \quad (3.3.10)$$

が成り立つので、Noether カレントの保存則 (3.3.6) は単に  $d \star j = 0$  と書ける。Noether チャージは

$$Q = \int_{\mathcal{M}^{(D)}} \star j = \int_{\mathcal{M}} \star j \wedge \delta(\mathcal{M}^{(D)})$$

である。 $\mathcal{M}^{(D)} \rightarrow \mathcal{M}^{(D)} + \delta \mathcal{M}^{(D)}$  w/  $\delta \mathcal{M}^{(D)} = \partial X^{(D+1)}$  なる時間一定面の変形を考えると、 $Q$  の変化は保存則から

$$\delta Q = \int_{\delta \mathcal{M}^{(D)}} \star j = \int_{X^{(D)}} d \star j = 0$$

だと分かった。i.e.

$$\hat{U}_{e^{i\theta}}(\mathcal{M}^{(D)}) = \hat{U}_{e^{i\theta}}(\mathcal{M}^{(D)} + \delta \mathcal{M}^{(D)})$$

である。この意味で対称性演算子は**トポロジカル演算子**とも呼ばれる。しかし、 $\mathcal{M}$  上に荷電物体が存在しているときは (3.3.9) に注意しなくてはならない。

時間一定面の変形をするので、量子化を経路積分で行う方が見通しが良い。経路積分では、任意の観測可能量  $\hat{\mathcal{O}}$  の期待値が

$$\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle = \int [d\psi] e^{iS[\psi]} \mathcal{O}$$

と計算される。今、勝手な場の演算子  $\mathcal{O}(z)$  に対して

$$\langle \hat{\psi}(y) \hat{\mathcal{O}}(z) \rangle = \int [d\psi] e^{iS[\psi]} \psi(y) \mathcal{O}(z)$$

を計算しよう。荷電物体  $\hat{\psi}(y)$  を囲むような時間一定面  $\mathcal{M}^{(D)} \subset \mathcal{M}$  w/  $y \in \mathcal{M}^{(D)}, z \notin \mathcal{M}^{(D)}$  をとり、 $D+1$  次元部分多様体  $\mathcal{M}^{(D+1)} \subset \mathbb{M}$  であって  $\mathcal{M}^{(D)} = \partial \mathcal{M}^{(D+1)}$  を充たすようなものをとる。そして局所的な場の  $U(1)$  変換

$$\begin{aligned} \mathcal{T}: \Gamma(S) &\rightarrow \Gamma(S), \psi \mapsto (x \mapsto e^{i\theta(x)} \psi) \\ \text{w/ } \theta(x) &= \begin{cases} \theta, & x \in \mathcal{M}^{(D)}, \\ 0, & x \notin \mathcal{M}^{(D)} \end{cases} \end{aligned}$$

を行う。すると、Noether カレントの表式 (3.3.8) を用いて

$$\begin{aligned}
S[\mathcal{T}(\psi)] - S[\psi] &= - \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \, i \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) \partial_\mu \theta(x) \\
&= \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \, i \partial_\mu (\bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x)) \theta(x) \\
&= - \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x \, \partial_\mu j^\mu(x) \theta(x) \\
&= -\theta \int_{\mathcal{M}^{D+1}} d \star j \\
&= -\theta \int_{\mathcal{M}^D} \star j
\end{aligned}$$

であることがわかる。つまり、変換  $\mathcal{T}$  の下で

$$\langle \hat{\psi}(y) \hat{\mathcal{O}}(z) \rangle = \int [d\psi] e^{iS[\psi]} \exp \left( -i\theta \int_{\mathcal{M}^D} \star j \right) e^{i\theta} \psi(y) \mathcal{O}(z)$$

と計算される。

$$\langle \hat{R}_g \hat{\psi}(y) \hat{\mathcal{O}}(z) \rangle = \int [d\psi] e^{iS[\psi]} U_g(\mathcal{M}^{(D)}) \psi(y) \mathcal{O}(z) \quad (3.3.11)$$

とすることである。

### 3.3.2 連続的高次対称性

【例 3.3.1】は、荷電物体が 0 次元に分布していた。これを  $p$  次元部分多様体上に分布した物体に置き換えることで  $p$ -form symmetry の概念が得られる [?, p.10] :

！ 以下で部分多様体といったときは、技術的な理由からコンパクトな埋め込まれた  $C^\infty$  多様体を指すものとする。

#### 定義 3.9: $p$ -form symmetry

$D+1$  次元の場の量子論が群  $G$  による  **$p$ -form symmetry** を持つとは、時空  $\mathcal{M}$  の任意の  $D-p$  次元部分多様体  $\mathcal{M}^{(D-p)} \subset \mathcal{M}$  および  $\forall g \in G$  に対して**対称性演算子** (トポロジカル演算子) (topological operator)  $U_g(\mathcal{M}^{(D-p)})$  が存在して以下を充たすことを言う :

- $U_g(\mathcal{M}^{(D-p)})$  は任意の  $p$  次元部分多様体  $\mathcal{C}^{(p)} \subset \mathcal{M}$  の台を持つ**荷電物体 (演算子)** (charged object, operator)  $V(\mathcal{C}^{(p)})$  に作用する。
- $\forall g, g' \in G$  に対して**群の規則** (group law)

$$U_g(\mathcal{M}^{(D-p)}) U_{g'}(\mathcal{M}^{(D-p)}) = U_{gg'}(\mathcal{M}^{(D-p)})$$

が成り立つ。

- 任意の  $p$  次元部分多様体  $\mathcal{C}^{(p)} \subset \mathcal{M}$  と、それに「絡む」十分小さな  $D-p$  球  $S^{D-p} \subset \mathcal{M}$  に対して、(3.3.11) と同じく経路積分の期待値の意味で

$$U_g(S^{D-p}) V(\mathcal{C}^{(p)}) = R_g(V(\mathcal{C}^{(p)}))$$



が成り立つ。ただし  $R: G \longrightarrow \text{GL}(\{\text{荷電物体}\})$  は群  $G$  の表現である。

### 【例 3.3.2】 3 + 1 次元 U(1) ゲージ理論

物質場のない U(1) ゲージ理論を考える。ゲージ場を局所接続形式<sup>a</sup>  $a = a_\mu dx^\mu \in \Omega^1(\mathcal{M}; \mathfrak{u}(1))$  として与え、場の強さを  $f := da$  とおく。  $f = f_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$  と成分表示すると  $f_{\mu\nu} = \partial_\mu a_\nu - \partial_\nu a_\mu$  となる。

作用は

$$S[a] = -\frac{1}{2e^2} \int_{\mathcal{M}} d^4x f \wedge \star f = -\frac{1}{4e^2} \int_{\mathcal{M}} d^4x f_{\mu\nu} f^{\mu\nu}$$

と書かれる。  $\delta a \in \Omega^1(\mathcal{M}; \mathfrak{u}(1))$  を用いた作用の変分は

$$\begin{aligned} \delta_{\delta a} S[a] &= -\frac{1}{e^2} \int_{\mathcal{M}} d(\delta a) \wedge \star f \\ &= -\frac{1}{e^2} \int_{\mathcal{M}} d(\delta a \wedge \star f) - \frac{1}{e^2} \int_{\mathcal{M}} \delta a \wedge d \star f \end{aligned}$$

なので、Euler-Lagrange 方程式と Bianchi 恒等式から

$$\begin{aligned} d \star f &= 0, \\ df &= 0 \end{aligned}$$

が言える (Maxwell 方程式)。これをカレントの保存則と見做して、任意の  $3 - 1 = 2$  次元閉部分多様体  $\mathcal{M}^{(2)} \subset \mathcal{M}$  上のトポロジカル演算子を

$$\begin{aligned} U^{\text{E}}_{e^{i\theta}}(\mathcal{M}^{(2)}) &:= \exp \left( i\theta \int_{\mathcal{M}^{(2)}} \frac{\star f}{e^2} \right) \\ U^{\text{M}}_{e^{i\theta}}(\mathcal{M}^{(2)}) &:= \exp \left( i\theta \int_{\mathcal{M}^{(2)}} \frac{f}{2\pi} \right) \end{aligned}$$

と定義しよう。  $U^{\text{E}}_{e^{i\theta}}(\mathcal{M}^{(2)})$  が作用する荷電物体は **Wilson loop**

$$W(\mathcal{C}^{(1)}) := \exp \left( i \int_{\mathcal{C}^{(1)}} a \right)$$

である。このことを示そう。

簡単のため  $S := \mathcal{M}^{(2)}$ ,  $C := \mathcal{C}^{(1)}$  と略記する。今、**絡み数**<sup>a</sup>が

$$\text{Link}(S, C) = \int_{\mathcal{M}} \delta(C) \wedge \delta(V) = 1$$

となるように  $C, V, S = \partial V$  をとる。ゲージ場の変換

$$\mathcal{T}: a \longmapsto a + \theta \delta(V)$$

の下で場の強さは  $f \mapsto f + \theta d(\delta(V)) = f - \theta \delta(S)$  となり, 作用は<sup>b</sup>

$$\begin{aligned}
S[\mathcal{T}(a)] - S[a] &= -\frac{1}{2e^2} \int_{\mathcal{M}} (f - \theta \delta(S)) \wedge \star(f - \theta \delta(S)) - S[a] \\
&= \frac{\theta}{2e^2} \int_{\mathcal{M}} (\delta(S) \wedge \star f + f \wedge \star \delta(S) - \theta \delta(S) \wedge \star \delta(S)) \\
&= \frac{\theta}{e^2} \int_{\mathcal{M}} (\delta(S) \wedge \star f - \theta \delta(S) \wedge \star \delta(S)) \\
&= \theta \int_S \frac{\star f}{e^2} - \frac{\theta^2}{2e^2} \int_S \delta(S)
\end{aligned}$$

と変換する. 一方, Wilson ループは

$$\begin{aligned}
W(C) &\mapsto \exp \left( i \int_C (a + \theta \delta(V)) \right) \\
&= \exp \left( i \int_C a + i\theta \int_{\mathcal{M}} \delta(V) \wedge \delta(C) \right) \\
&= \exp \left( i \int_C a - i\theta \text{Link}(S, C) \right) \\
&= e^{-i\theta} \exp \left( i \int_C a \right)
\end{aligned}$$

と変換するので<sup>c</sup>,

$$\langle W(C) \mathcal{O} \rangle = \int [da] e^{iS[a]} U_{e^{i\theta}}^E(S) e^{-i\theta} W(C) \mathcal{O}$$

i.e.

$$\langle e^{i\theta} W(C) \mathcal{O} \rangle = \int [da] e^{iS[a]} U_{e^{i\theta}}^E(S) W(C) \mathcal{O}$$

が分かった.

トポロジカル演算子を 2 次元閉部分多様体上で定義したが, 境界を持つ場合, i.e.  $C := \partial \mathcal{M}_C^{(2)} \neq \emptyset$  の場合はどうなるのか.

$$H_\theta(\mathcal{M}_C^{(2)}) := \exp \left( i\theta \int_{\mathcal{M}_C^{(2)}} \frac{\star f}{e^2} \right)$$

を考える. 境界を共有するもう 1 つの 2 次元部分多様体  $\mathcal{N}_C^{(2)}$  を持ってくると

$$H_\theta(\mathcal{M}_C^{(2)}) H_\theta(\mathcal{N}_C^{(2)})^{-1} = \exp \left( i\theta \oint_{\mathcal{M}_C^{(2)} \cup_C (-\mathcal{N}_C^{(2)})} \frac{\star f}{e^2} \right)$$

これは  $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$  のとき  $C$  にしかよらない. このことから,  $U_{e^{i\theta}}^M(\mathcal{M}_C^{(2)})$  が作用する荷電物体 (**t Hooft ループ**) を Hodge dual なゲージ場  $db := \frac{2\pi}{e^2} \star f$  によって

$$H_n(C) := \exp \left( i n \int_C b \right)$$

と定義できる.

<sup>a</sup> 厳密には  $\mathcal{M}$  の開集合上の  $\mathfrak{u}(1)$ -値 1 形式

<sup>b</sup>  $\omega \wedge \star \eta = \eta \wedge \star \omega$  に注意.

<sup>c</sup> トポロジカル演算子を  $\exp \left[ i\theta \left( \int_S \frac{\star f}{e^2} - \frac{\theta^2}{2e^2} \int_S \delta(S) \right) \right]$  と再定義した.

### 3.3.3 対称性の自発的破れ

まずは通常の対称性 (0-form symmetry) の場合を考える. 系が Lie 群  $G$  で特徴付けられる 0-form symmetry を持つ場合を考えよう. ただし群は場へ表現  $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(N, \mathbb{K})$  として作用しているとする. このとき, 無限小な対称性変換は Lie 代数  $\mathfrak{g}$  の基底  $T^A \in \mathfrak{g}$  および微分表現  $\rho_*: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(N, \mathbb{K})$  を用いて<sup>\*12</sup>  $\mathcal{T}_{i \in A \rho_*(T^A)(\varphi)}$  と書けるので, Noether の定理より on shell な保存則 (3.3.10) を充たす  $\dim G$  個の Noether カレント (3.3.5)  $j_A$  ( $A = 1, \dots, \dim G$ ) が存在し, それに付随して  $\dim G$  個の保存電荷  $Q_A(\mathcal{M}^{(D)}) = \int_{\mathcal{M}^{(D)}} \star j_A$  が存在して対称性変換の無限小生成子 (3.3.7) となるのだった.

さて, Noether の定理によって特徴付けられる対称性は必ずしも系の基底状態  $|0\rangle$  の対称性にならない. i.e. 形式的には

$$(1) \quad 1 \leq \forall A \leq \dim G, \quad \hat{Q}_A |0\rangle = 0$$

$$(2) \quad 1 \leq \exists A \leq \dim G, \quad \hat{Q}_A |0\rangle \neq 0$$

の 2 つの場合<sup>\*13</sup> があり得る. (1) の場合, 系は対称性を実現している, または系は **Wigner 相** (Wigner phase) にあると言い, (2) の場合, 系の対称性が**自発的に破れた**, または系は **Nambu-Goldstone 相** (Nambu-Goldstone phase) にあると言う [?, p.1]. 0-form symmetry の言葉に翻訳すると, **対称性の自発的破れ** (spontaneous symmetry breaking; SSB) とは, 0-form symmetry を特徴付ける Lie 群  $G$  がその部分群  $H \subset G$  に縮小していることを指す<sup>\*14</sup>. SSB を特徴付けるには, 上述のように素朴には  $\hat{Q}_A |0\rangle \neq 0$  を充たす  $1 \leq A \leq \dim G$  が存在するかどうかを確認すれば良いように見えるが,  $\langle 0 | \hat{Q}_A \hat{Q}_A | 0 \rangle \propto \mathrm{vol}(\mathcal{M}^{(D)})$  なので<sup>\*15</sup> 熱力学極限において  $\hat{Q}_A |0\rangle$  は定義できない. そこで, 代わりにある局所演算子 (i.e. compactly supported な演算子)  $\hat{O}(x)$  が存在して

$$\langle 0 | [i\hat{Q}_A, \hat{O}(x)] | 0 \rangle \neq 0 \quad (3.3.12)$$

を充たすことと特徴付ける. (3.3.12) の左辺を系の**秩序変数** (order parameter) と呼ぶ.

では, 相対論的な系における Nambu-Goldstone の定理から出発しよう.

<sup>\*12</sup> 苦肉の策だが, Lie 代数の添字を  $A, B, C, \dots$  とする.

<sup>\*13</sup> もしくは,  $U_g(\mathcal{M}^{(D)}) |0\rangle = |0\rangle$  としても良い.

<sup>\*14</sup> 考えている場が構造群  $G$  を持つファイバー束として定式化されている場合, SSB は数学的には**構造群の収縮** (reduction of structure group) として定式化できる.

<sup>\*15</sup> **Fabri - Picasso の定理** [?]

### 定理 3.1: Nambu-Goldstone (相対論的)

考えている系が Lie 群  $G$  で特徴付けられる 0-form symmetry を持ち、さらに

- (1) 並進対称性と Lorentz 共変性を持ち、
- (2) 部分群  $H \subset G$  に対称性が自発的に破れている

とする。このとき、系は線形分散を持つ零質量の独立な励起 (**NG モード**) をちょうど  $\dim G - \dim H$  個持つ。

定理 3.1 の条件 (1) は NG モードが互いに独立であり、かつ必ず線形分散を持つことの証明に使うのだが、かなりややこしい<sup>\*16</sup>ので、ここでは NG モードが存在することだけの証明の概略を述べるに留める。

**証明** 系は場  $\varphi \in \Gamma(E)$  からなるとし、この系の作用を  $S[\varphi]$  と書く。Green 関数の生成汎関数を

$$\begin{aligned} Z[J] &= e^{iW[J]} := \langle 0 | \mathcal{T} \exp \left( i \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x J(x) \varphi(x) \right) | 0 \rangle \\ &= \frac{\int [d\varphi] \exp \left( S[\varphi] + \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x J(x) \varphi(x) \right)}{\int [d\varphi] \exp S[\varphi]} \end{aligned}$$

と定義し、有効作用を

$$\Gamma[\psi] := W[J] - \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x J(x) \psi(x)$$

と定義する。ただし

$$\psi(x) := \frac{\delta W[J]}{\delta J(x)} = \frac{\langle 0 | \mathcal{T} \{ \hat{\varphi}(x) \exp \left( i \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x J(x) \varphi(x) \right) \} | 0 \rangle}{\langle 0 | \mathcal{T} \{ \exp \left( i \int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x J(x) \varphi(x) \right) \} | 0 \rangle}$$

とおいた。さらに有効ポテンシャルを

$$V(\varphi) := - \frac{\Gamma[\varphi]|_{\varphi=\text{const.}}}{\int_{\mathcal{M}} d^{D+1}x}$$

と定義する。QFT の一般論から、場の演算子の真空期待値  $\varphi_0 := \langle 0 | \hat{\varphi}(x) | 0 \rangle$  に対して  $\varphi_0 = \text{argmin } V(\varphi)$  であることが知られている。

簡単のため  $G$  が線型 Lie 群で、系の対称性変換が  $\mathcal{T}_{i\varepsilon_A \rho_*(T^A)(\varphi)}$  ( $A = 1, \dots, \dim G$ ) と書ける場合を考える。(3.3.7) を思い出すと、このとき

$$[i\hat{Q}^A, \hat{\varphi}(x)] = i\rho_*(T^A)(\hat{\varphi}(x))$$

<sup>\*16</sup> 例えば [?, p.7] に漸近場を使った議論が載っている

が成り立つ。  $\Gamma[\varphi]$ ,  $V[\varphi]$  もこの変換の下で不変なので

$$\begin{aligned} V(\varphi + i\epsilon^A \rho_*(T^A)\varphi) &= V(\varphi) \\ \Rightarrow \frac{\partial V(\varphi)}{\partial \varphi_a} [\rho_*(T^A)]_a{}^b \varphi_b &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 V(\varphi)}{\partial \varphi_a \partial \varphi_b} [\rho_*(T^A)]_b{}^c \varphi_c + \frac{\partial V(\varphi)}{\partial \varphi_b} [\rho_*(T^A)]_a{}^b \varphi_b &= 0 \quad (1 \leq \forall a \leq N) \end{aligned} \quad (3.3.13)$$

ここで条件 (2) から

$$\langle 0 | [i\hat{Q}_A, \hat{\varphi}(x)] | 0 \rangle = i\rho_*(T^A) (\langle 0 | \hat{\varphi}(x) | 0 \rangle) \begin{cases} = 0, & T^A \in \mathfrak{h}, \\ \neq 0, & T^A \notin \mathfrak{h} \end{cases}$$

が成り立つので,  $v := \langle 0 | \hat{\varphi}(x) | 0 \rangle$  とおくと, (3.3.13) より破れた対称性に対応する任意の  $1 \leq A \leq \dim G$  に対して

$$v \neq 0 \text{ かつ } \left. \frac{\partial^2 V(\varphi)}{\partial \varphi_a \partial \varphi_b} \right|_{\varphi=v} [\rho_*(T^A)(v)]_b = 0 \quad (1 \leq \forall a \leq N) \quad (3.3.14)$$

が成り立たねばならない。ところで, 真空期待値が 0 になる場を  $\tilde{\varphi}(x) := \varphi(x) - v$  で定義すると

$$V(\varphi) = V(v) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 V(\varphi)}{\partial \varphi_a \partial \varphi_b} \right|_{\varphi=v} \tilde{\varphi}_a \tilde{\varphi}_b + \mathcal{O}(\tilde{\varphi}^3)$$

となるから, 行列  $\left[ \left. \frac{\partial^2 V(\varphi)}{\partial \varphi_a \partial \varphi_b} \right|_{\varphi=v} \right]_{1 \leq a, b \leq \dim G}$  を対角化した固有値が粒子の質量の 2 乗を与える。従って (3.3.14) から,  $T^A \notin \mathfrak{h}$  ならば  $\rho_*(T^A)(v)$  がこの行列の固有値 0 に対応する固有ベクトル, i.e. ゼロ質量の NG 粒子であることが分かった。 ■

NG モードの存在がわかったので, 次に NG 粒子を記述する有効ラグランジアン構成法を考える。破れた対称性は Lie 群  $G/H$  で特徴付けられるはずである。まず,  $\text{Lie}(G/H) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$  に注意する<sup>\*17</sup>。このとき  $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$  の基底を  $X^A + \mathfrak{h}$   $^w/$   $A = 1, \dots, \dim G - \dim H$  と書くと,  $X^A \in \mathfrak{g} \setminus \mathfrak{h}$  が  $\mathfrak{g}$  において線型独立であるように選べるから,  $T^A$  のうち  $\mathfrak{h}$  に属さないものとしてすることができる。命題??より可換図式

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{T_{1_G} p} & \text{Lie}(G/H) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{h} \\ \downarrow \exp_G & & \downarrow \exp_{G/H} \\ G & \xrightarrow{p} & G/H \end{array}$$

が成り立つから, 左剰余類  $gH \in G/H$  の代表元として

$$\exp_G(i\pi_A(x)X^A) \in G$$

を選ぶことができる<sup>\*18</sup>。この  $\dim G - \dim H$  成分場  $\pi: M \rightarrow \text{Lie}(G/H)$  のことを **NG ボソン場**と呼ぶ。このとき, 大域的な  $\forall g \in G$  の作用に応じた場  $\pi$  の変換  $\pi \mapsto \pi'$  は

$$\exp_G(i\pi_A(x)X^A) H \mapsto g \exp_G(i\pi_A(x)X^A) H =: \exp_G(i\pi'_A(x)X^A) H$$

<sup>\*17</sup> 標準的射影  $p: G \rightarrow G/H$  について  $T_{1_G} p: \mathfrak{g} \rightarrow \text{Lie}(G/H)$  は全射であるが,  $X \in \mathfrak{h} \iff T_{1_G} p(X) = T_0(p \circ \exp_G) \left( \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \right) = 0$  なので  $\mathfrak{h} \subset \text{Ker } T_{1_G} p$  がわかり, 次元を考えると  $\text{Ker } T_{1_G} p = \mathfrak{h}$  が言える。よって準同型定理から  $\mathfrak{g}/\mathfrak{h} \cong \text{Lie}(G/H)$  である。

<sup>\*18</sup> 厳密には  $\exp_G$  が全射とは限らないので, これは多様体  $G/H$  の単位元  $H$  近傍のチャート  $(U, (\pi_A))$  だと考えるべきである。

となるから、顕にはある  $h(g, \pi) \in H$  を使って

$$\exp_G(\mathrm{i}\pi'_A(x)X^A) = g \exp_G(\mathrm{i}\pi_A(x)X^A) h(g, \pi) \quad (3.3.15)$$

と書くことができる。  $g \in H$  のときは任意の  $\pi$  について

$$\exp_G(\mathrm{i}\pi'_A(x)X^A) H = \exp_G(\mathrm{i}\pi_A(x)X^A) H$$

でなくてはならないから  $h(g, \pi) = g^{-1}$  であり、(3.3.15) を  $0 \in \mathfrak{h}$  において微分することで  $\pi(x)$  が

$$\pi'(x) = \mathrm{Ad}(g)(\pi(x))$$

なる線形変換を受けることがわかる。一方で  $g \in G \setminus H$  のときは変換則 (3.3.15) は  $\pi(x)$  について非線形である。

NG ボゾン場の項を含むラグランジアンは、 $G$ -不変でなくてはならない。そのためには Maurer-Cartan 形式  $\theta \in \Omega^1(G; \mathfrak{g})$  を使う。これを  $C^\infty$  写像  $\xi := \exp_G(\mathrm{i}\pi(-)): \mathcal{M} \rightarrow G$  で引き戻すことで左不変な  $\xi^*\theta \in \Omega^1(\mathcal{M}; \mathfrak{g})$  を得る。  $\mathfrak{h}$  成分と  $\mathfrak{g} \setminus \mathfrak{h}$  成分に分離して

$$\xi^*\theta = \underbrace{\xi^*\theta_\parallel}_{\in \mathfrak{h}} + \underbrace{\xi^*\theta_\perp}_{\in \mathfrak{g} \setminus \mathfrak{h}}$$

と書く。行列 Lie 群の場合に成分表示を求めると

$$\xi^*\theta|_x(\partial_\mu) = \theta_{\xi(x)}(T_x \xi(\partial_\mu)) = \xi(x)^{-1} \partial_\mu \xi(x)$$

である。変換則 (3.3.15) から、  $\forall g \in G$  に関する大域的な変換について

$$\xi(x)^{-1} \partial_\mu \xi(x) \mapsto h^{-1}(g, \pi) \xi(x)^{-1} \partial_\mu \xi(x) h(g, \pi) + \underbrace{h(g, \pi)^{-1} \partial_\mu h(g, \pi)}_{\in \mathfrak{h}}$$

となる。 i.e.  $\mathrm{Tr}(\xi^*\theta_\perp) \in \Omega^1(M)$  が NG ボゾン場の変換 (3.3.15) について整合的である。よって微分の次数が 2 次の Lagrangian が

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NGB}} := -\frac{1}{2} \mathrm{Tr}(\xi^*\theta_\perp \wedge \star \xi^*\theta_\perp)$$

で与えられる<sup>\*19</sup>。低エネルギーの時は  $\pi$  の最低次までとる。

$$\begin{aligned} \xi(x)^{-1} \partial_\mu \xi(x) &= \frac{1 - e^{-\mathrm{i} \mathrm{ad}(\pi(x))}}{\mathrm{i} \mathrm{ad}(\pi(x))} (\partial_\mu \pi(x)) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\mathrm{i})^n}{(n+1)!} \mathrm{ad}(\pi(x))^n (\partial_\mu \pi(x)) \\ &= \partial_\mu \pi(x) - \frac{\mathrm{i}}{2!} [\pi(x), \partial_\mu \pi(x)] + \mathcal{O}(\pi^2 \partial_\mu \pi) \end{aligned}$$

なので

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NGB}} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \pi_A \partial^\mu \pi_B \mathrm{Tr}(X^A X^B)$$

---

<sup>\*19</sup> このウェッジ積は普通のものではなく、  $\omega = \omega_A T^A$ ,  $\eta = \eta_A T^A$  と展開して  $\omega \wedge \eta := \frac{1}{2} \omega_A \wedge \eta_B [T^A, T^B] \in \Omega^{p+q}(M; \mathfrak{g})$  と定義した。

である。  $g^{AB} := \text{Tr}(X^A X^B)$  は  $\mathfrak{g}$  の規格化条件にもよるが、多様体  $G/H$  の計量テンソルになっている。

次に物質場との結合を記述する方法を考える。物質場  $\psi$  の値域は破れていない対称性  $H$  の既約表現  $\rho_H: H \rightarrow \text{GL}(\mathcal{H})$  の表現空間  $\mathcal{H}$  だと考えて良い。  $\forall g \in G$  による変換則は (3.3.15) の  $h(g, \pi) \in H$  を使って

$$\psi(x) \mapsto \rho_0(h(g, \pi)^{-1})(\psi(x))$$

と定義すると、前述の議論から  $g = h \in H$  のときは  $\psi \mapsto \rho_0(h)(\psi)$  と変換するので整合的である。  $G$  の既約表現  $\rho: G \rightarrow \text{GL}(\mathcal{H}_{\text{ext}})$  であって、  $H$  の表現と見做して既約表現の直和に分解した際に  $\rho_0$  を直和因子の 1 つに持つようなものを与えたとき、標準的包含  $\mathcal{H} \hookrightarrow \mathcal{H}_{\text{ext}}$  によって  $\psi$  を送った先を  $\hat{\psi}$  とおくと、新しい場

$$\chi(x) := \rho(\xi(\pi))(\hat{\psi}(x))$$

は、  $\forall g \in G$  による大域的変換の下で

$$\begin{aligned} \chi(x) &\mapsto \rho(g\xi(\pi)h(g, \pi))(\widehat{\rho_0(h(g, \pi)^{-1})(\psi)(x)}) \\ &= \rho(g) \circ \rho(\xi(\pi)) \circ \rho(h(g, \pi)) \circ \rho(h(g, \pi))^{-1}(\hat{\psi}(x)) \\ &= \rho(g)(\chi(x)) \end{aligned}$$

の変換を受ける。  $\psi$  をそのまま扱うよりも  $\chi: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{ext}}$  について  $G$ -不変な Lagrangian を書き下す方が簡単であり、  $\chi$  は NGB と物質場の相互作用も記述してくれる。最後に、これまで大域的対称性だと思っていた群  $G$  の作用を局所的対称性にするために背景ゲージ場を導入する (**ゲージ化**)。そのためには Maurer-Cartan 形式の  $\partial_\mu$  を共変微分に置き換えれば良く、NGB と背景ゲージ場との結合はそれで決まる。あからさまには

$$\xi(x)^{-1}(\partial_\mu + A_\mu(x))\xi(x)$$

にすると言うことである。  $A_{\mu A} T^A$  と展開すると

$$\begin{aligned} \xi(x)^{-1} A_\mu(x) \xi(x) &= A_{\mu A}(x) \text{Ad}(\exp_G(-i\pi(x)))(T^A) \\ &= A_{\mu A}(x) \exp_{\text{GL}(\mathfrak{g})}(-i\pi_B(x) \text{ad}(T^B))(T^A) \\ &= A_{\mu A}(x) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \pi_{B_1}(x) \cdots \pi_{B_n}(x) \text{ad}(T^{B_1}) \circ \cdots \circ \text{ad}(T^{B_n})(T^A) \\ &= A_{\mu A}(x) + \mathcal{O}(\pi) \end{aligned}$$

となるので、  $\pi$  の最低次では Maurer-Cartan 形式の成分

$$\partial_\mu \pi + A_\mu$$

と書かれる。よってゲージ変換  $A \mapsto A + d\lambda_0$  は NG ボゾンに  $\pi + \lambda_0$  のシフトを引き起こす。

余談だが、定理 3.1 の Lorentz 共変性の条件 (1) を外すと話はややこしくなる。まず、波数の小さいところにおいて分散関係が奇数幂であるような NG モードを **Type-I**、偶数幂で書けるような NG モードを **Type-II** と呼ぶ [?]。そして

- 破れた対称性の個数を  $N_{\text{BG}} := \dim G - \dim H$
- NG モードの総数を  $N_{\text{NGB}}$
- Type-I, Type-II の個数をそれぞれ  $N_{\text{I}}, N_{\text{II}}$

とおこう．[?] による結果は以下の通りである：

**定理 3.2: Nielsen-Chadha**

$$N_{\text{I}} + 2N_{\text{II}} \geq N_{\text{BG}}$$

証明 ■

さらに，[?] によって以下が示された：

**定理 3.3: Watanabe-Murayama**

$\Omega := \int_{\Sigma} d^D x$  とおき， $\rho_{AB} := \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{-i}{\Omega} \langle 0 | [Q_A, Q_B] | 0 \rangle$  と定義する．このとき以下が成り立つ：

$$N_{\text{BG}} - N_{\text{NGB}} = \frac{1}{2} \text{rank } \rho$$

証明 ■

### 3.3.4 高次対称性の自発的破れ

この小節と次の小節では時空  $\mathcal{M}$  は境界を持たないと仮定する<sup>\*20</sup>．0 次対称性の場合と同様に， $p$  次対称性の自発的破れを議論することができる． $p$ -form symmetry の場合，トロポジカル演算子は  $p+1$ -form 背景ゲージ場と等価であった．0-form の場合からの類推で，NG ボゾン場は背景  $p+1$ -form ゲージ場のゲージ変換によってシフトするはずだが， $p+1$ -form ゲージ場  $B_{p+1}$  のゲージ変換は  $p$ -form  $\Lambda_p$  により  $B_{p+1} \mapsto B_{p+1} + d\Lambda_p$  の形をしているので，NG ボゾン場は  $p$ -form である．

$p$ -form symmetry の秩序変数は荷電物体の真空期待値であり，一般に  $\mathcal{C}^{(p)} \subset \mathcal{M}$  に依存する何らかの関数  $F(\mathcal{C}^{(p)})$  を使って

$$\langle V(\mathcal{C}^{(p)}) \rangle \sim e^{-F(\mathcal{C}^{(p)})}$$

の振る舞いをする．SSB を特徴づける典型的な振る舞いは

$$\lim_{\text{vol}(\mathcal{C}^{(p)}) \rightarrow \infty} \text{Re} \left[ \frac{F(\mathcal{C}^{(p)})}{\text{vol}(\mathcal{C}^{(p)})} \right] \begin{cases} < \infty, & \text{SSB} \\ = \infty, & \text{unbroken} \end{cases}$$

というものである．SSB が起こったと言うのは，荷電演算子を

$$\hat{V}(\mathcal{C}^{(p)}) := e^{-c \int_{\mathcal{C}^{(p)}} \star_{\mathcal{C}^{(p)}} 1} V(\mathcal{C}^{(p)})$$

と正則化することで

$$\lim_{\text{vol}(\mathcal{C}^{(p)}) \rightarrow \infty} \langle V(\mathcal{C}^{(p)}) \rangle \neq 0$$

<sup>\*20</sup> 境界がある場合の取り扱い [?] に書いてある．



を充たすようにできると言う意味である。

演算子形式ではどうなるのだろうか？ (3.3.12) の素朴な一般化は

$$\left\langle \left[ i\hat{Q}(\mathcal{M}^{(D-p)}), V(\mathcal{C}^{(p)}) \right] \right\rangle$$

であるが、これは  $\mathcal{M}^{(D-p)}, \mathcal{C}^{(p)}$  が共に閉多様体だと微妙なところがある [?].

[?, p.5-6] に倣って、系が並進対称性を持つ場合にギャップレスな励起が存在することをざっと確認しよう。演算子形式で議論するので、時間一定面  $\mathcal{M}^{(D)} \subset \mathcal{M}$  を 1 つ固定し、微妙なことが起こらないように  $\mathcal{M}^{(D-p)} \subset \mathcal{M}^{(D)}$  が境界を持つとする。保存則  $d \star j = 0$  を充たすカレント  $\star j$  および  $\mathcal{M}^{(D)}$  に関するデルタ関数形式  $\delta^D(\mathcal{M}^{(D-p)})(x)|n\rangle$  を使って  $Q(\mathcal{M}^{(D-p)}) = \int_{\mathcal{M}^{(D)}} \star j \wedge \delta^D(\mathcal{M}^{(D-p)})$  と書ける。並進対称性から  $\langle 0 | \star \hat{j} \wedge \delta^D(\mathcal{M}^{(D-p)})(x) | n \rangle = e^{ip_n \cdot x} \langle 0 | \star \hat{j} \wedge \delta^D(\mathcal{M}^{(D-p)})(0) | n \rangle$  が成り立つので

$$\begin{aligned} & \left\langle \left[ i\hat{Q}(\mathcal{M}^{(D-p)}), V(\mathcal{C}^{(p)}) \right] \right\rangle \\ &= i \sum_n (2\pi)^D \delta^D(\mathbf{p}) \left( \langle 0 | \star \hat{j} \wedge \delta^D(\mathcal{M}^{(D-p)})(0) | n \rangle \langle n | V(\mathcal{C}^{(p)}) | 0 \rangle e^{-iE_n x^0} \right. \\ & \quad \left. - \langle 0 | V(\mathcal{C}^{(p)}) | n \rangle \langle n | \star \hat{j} \wedge \delta^D(\mathcal{M}^{(D-p)})(0) | 0 \rangle e^{iE_n x^0} \right) \end{aligned}$$

が言える。一方で左辺を  $x^0 = t$  方向に微分すると、保存則および Stokes の定理から

$$\begin{aligned} \partial_0 \left\langle \left[ i\hat{Q}(\mathcal{M}^{(D-p)}), V(\mathcal{C}^{(p)}) \right] \right\rangle &= \int_{\mathcal{M}^{(D-p)}} \left\langle \left[ \partial_0 \star j, V(\mathcal{C}^{(p)}) \right] \right\rangle \\ &= - \int_{\partial \mathcal{M}^{(D-p)} \subset \partial \mathcal{M}^{(D)}} \left\langle \left[ \star_{\mathcal{M}^{(D)}} j, V(\mathcal{C}^{(p)}) \right] \right\rangle \end{aligned}$$

となる。次元を数えることでいつでも  $\mathcal{C}^{(p)} \cap \partial \mathcal{M}^{(D-p)} = \emptyset$  にできることがわかるので結局右辺は 0 だとわかる。よってもし  $\left\langle \left[ i\hat{Q}(\mathcal{M}^{(D-p)}), V(\mathcal{C}^{(p)}) \right] \right\rangle \neq 0$  ならば  $\mathbf{p} = 0$  のときに  $E_n = 0$  となるような  $n$  が存在する。

### 【例 3.3.3】 3 + 1 次元の Yang-Mills 理論

### 【例 3.3.4】 U(1) ゲージ理論

## 3.3.5 高次対称性の Coleman-Mermin-Wagner の定理

通常の Coleman-Mermin-Wagner の定理は、連続的 0 次対称性が 1 + 1 次元以下では自発的に破れないことを主張する。これは  $p$  次対称性に拡張することができる：

### 定理 3.4: 高次対称性についての Coleman-Mermin-Wagner の定理

$D + 1$  次元時空において、Lie 群  $G$  で特徴付けられる  $p \geq D - 1$  次対称性は自発的に破れない。

**証明** より詳細な扱いは [?, p.23] を参照。ここではとても雑に示す。

$D+1$  次元 Euclid 時空  $\mathcal{M}$  の自由かつ massless な  $p$ -form 場（これは  $p$ -form NG ボゾン場のつもりである） $B_p \in \Omega^p(\mathcal{M})$  の理論

$$S = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{M}} dB_p \wedge \star dB_p$$

を考える． $B_p$  の 2 点関数の長距離における振る舞いを見る．そのためには参照点を 1 つ固定し，その点を原点に持つ  $D+1$  次元極座標  $(r, \theta^1, \dots, \theta^D)$  を  $r$  が十分大きいところととる．このときの Green 関数の  $r$  依存性を見ればよい：

$$d \star dG_p(r, \theta^\mu) = 0$$

外微分したときに  $\partial_r dr \wedge$  が生き残るのは  $d\theta^{\mu_1} \wedge \dots \wedge d\theta^{\mu_p}$  の項のみである．また，自然基底の規格化のために  $r d\theta^\mu$  を考えないといけないので，結局  $p$ -form の

$$G_p^{\text{ang}}{}_{\mu_1, \dots, \mu_p} r^p d\theta^{\mu_1} \wedge \dots \wedge d\theta^{\mu_p}$$

の部分を見ないと意味がない．よって

$$\frac{1}{r^{D+1-p}} \partial_r \left( r^{D+1-(p+1)} \frac{1}{r^p} \partial_r (r^p G(r)) \right) = 0$$

ということであり， $G(r) \sim r^{-(d-p-1)}$  である．このことから， $d-p-1 > 0$  でないと 2 点関数が  $r \rightarrow \infty$  で発散することになり， $p$ -form NG ボゾン場が ill-defined である．i.e.  $p \geq D-1$ -form symmetry は自発的に破れない．

■

### 3.3.6 対称性のアノマリー

アノマリー<sup>\*21</sup>には，大別して 3 種類ある [?]：

#### ゲージアノマリー

元の理論  $S[\psi]$  にゲージ化  $\partial_\mu \mapsto \partial_\mu + a_\mu$  の操作を施して得られた理論  $S_{\text{gauged}}[\psi, a]$  の<sup>\*22</sup>分配関数

$$Z_{\text{gauged}} = \int [da] \int [d\psi] e^{-S_{\text{gauged}}[\psi, a] - S_{\text{kin}}[a]} =: \int [da] Z[A] e^{-S_{\text{kin}}[a]}$$

について，ある  $g: \mathcal{M}^{(D+1)} \rightarrow G$  が存在してゲージ変換  $a \mapsto a^g := g^{-1} a g + g^{-1} dg$  の下で  $Z[a] \neq Z[a^g]$  となること．このとき理論は矛盾している．と言うのも，汎関数積分  $\int [dA]$  が ill-defined になるからである．

#### 't Hooft アノマリー

元の理論  $S[\psi]$  にゲージ化  $\partial_\mu \mapsto \partial_\mu + A_\mu$  の操作を施して得られた理論  $S_{\text{gauged}}[\psi, A]$  について

$$Z[A] := \int [d\psi] e^{-S_{\text{gauged}}[\psi, A]}$$

<sup>\*21</sup> 訳語だと対称性の量子的破れと呼ぶこともある [?].

<sup>\*22</sup> ゲージ場がダイナミカルなときは  $a, b, \dots$  で，単に外場であるときは  $A, B, \dots$  で書くことにする．

と定義したとき、ある  $g \in G$  が存在してゲージ変換  $A \mapsto A^g := g^{-1}Ag + g^{-1}dg$  の下で  $Z[A] \neq Z[A^g]$  となること。  $A$  は単なる外場なので、理論が矛盾したわけではない。 また、  $Z[0] = Z$  となる。

今、  $Z_{UV}[A]$  が繰り込み群変換の下で  $Z_{IR}[A]$  に流れるとする。 このとき、 のちに見るようにアノマリーは 1 つ次元が上の TQFT で記述されるが、 TQFT は繰り込み群変換の下で不変なので、 両者のアノマリーは一致していなくてははいけない。 つまり、 理論  $Z_{UV}$  が繰り込み群変換で  $Z_{IR}$  へ流れるための必要条件は、 両者で 't Hooft アノマリーが一致することなのである。

### ABJ アノマリー (Adler Bell Jackiw anomaly)

ゲージ群  $G$  についてゲージアノマリーを持たない理論

$$Z = \int [da] \int [d\psi] e^{-S[\psi, a]} =: \int [da] Z[a]$$

が別の Lie 群  $H$  についても大域的対称性を持っているとき、 外場  $A$  を導入して  $H$  対称性をゲージ化して

$$Z[a, A] = \int [d\psi] e^{-S[\psi, a, A]}$$

を得るが、 この新しく加えた  $A$  についてゲージ変換  $A \mapsto A^h$  を施したときに  $Z[a, A^h] \neq Z[a, A]$  となることである。 摂動論的には、  $2n$  次元の理論が持つ摂動アノマリーであって、 対応する  $n+1$  角形の Feynman ダイアグラムの外線のうち 1 本が外場で、 残りの  $n$  本がダイナミカルなゲージ場であるようなものである。 ABJ アノマリーの場合もまた、 理論が矛盾しているわけではない。

ABJ アノマリーは Noether カレントの非保存と等価である。

$$S[\psi, a] := \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} d^{D+1}x \bar{\psi} \gamma^\mu (\partial_\mu + a_\mu) \psi$$

を考える。 これが  $G$  によるゲージ変換以外に、  $H$  による大域的対称性  $S[\psi, a] = S[\psi^h, a]$  を持っているとする。 このとき  $h: \mathcal{M}^{(D+1)} \rightarrow H$  による変換  $\rho(h)(\psi)$  を摂動的に扱い  $h \sim 1 + \epsilon$  と思うと、

$$S[\psi^h, a] = S[\psi, a] - \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} d^{D+1}x \epsilon \partial_\mu (\bar{\psi} \gamma^\mu \psi)$$

になる。 ここで、 経路積分において測度が  $[d\bar{\psi}^h d\psi^h] = J[d\bar{\psi} d\psi]$  と変換するならば

$$Z[a] = \int [d\bar{\psi}^h d\psi^h] e^{-S[\psi^h, a]} = \int [d\bar{\psi} d\psi] e^{-S[\psi, a]} J e^{\int d^{D+1}x \epsilon \partial_\mu j^\mu}$$

であり、  $J = e^{\int d^{D+1}x \epsilon \mathbf{A}}$  と書くと

$$\partial_\mu j^\mu = \mathbf{A}$$

が導かれるのだった (Fujikawa の方法)。 一方、 大域的対称性  $H$  をゲージ化して

$$S[\psi, a, A] := \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} d^{D+1}x \bar{\psi} \gamma^\mu (\partial_\mu + a_\mu + A_\mu) \psi$$

にする。 ゲージ不変性から  $S[\psi^h, a, A^h] = S[\psi, a, A]$  なので、

$$S[\psi^h, a, A] = S[\psi^h, a, A^h] - \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} d^{D+1}x \epsilon \partial_\mu (\bar{\psi} \gamma^\mu \psi)$$

である。ABJ アノマリーは

$$\begin{aligned} Z[a, A^h] &= e^{i \int d^{D+1} \epsilon B} Z[a, A] \\ \iff \int [d\bar{\psi}^h d\psi^h] e^{-S[\psi^h, a, A^h]} &= e^{i \int d^{D+1} \epsilon B} \int [d\bar{\psi} d\psi] e^{-S[\psi, a, A]} \end{aligned}$$

を意味するから,

$$\partial_\mu j^\mu = -iB$$

となる。

Lie 群  $G$  で特徴づけられる 0-form symmetry の場合を考える。on shell な保存カレントを 't Hooft アノマリーの意味で 1-form 背景ゲージ場  $A_1$  に結合させることができる。このとき、ゲージ場はダイナミカルでないので、分配関数は

$$Z[A_1] = \int [d\psi] e^{-S[\psi, A_1]}$$

の形になっている。この 0-form symmetry がアノマリーを持つとは、ゲージ変換  $A_1 \mapsto A_1 + d\lambda_0$  の下で分配関数が不変にならないことである、と定義しよう。記号的には

$$Z[A_1 + d\lambda_0] = e^{i \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} \mathcal{A}[A_1, \lambda_0]} Z[A_1]$$

ということである。ここで、この位相  $\mathcal{A}[A_1, \lambda_0]$  は  $D+2$  次元時空の TQFT の境界からの寄与だと考えてみよう<sup>\*23</sup>：

$$e^{i \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} \mathcal{A}[A_1, \lambda_0]} = e^{i \int_{\partial \mathcal{N}^{(D+2)}} \mathcal{A}[A_1, \lambda_0]} = e^{i \int_{\mathcal{N}^{(D+2)}} d\mathcal{A}[A_1, \lambda_0]}$$

つまり、 $d\mathcal{A}[A_1, \lambda_0]$  を  $\hat{\mathcal{A}}[A_1 + d\lambda_0] \in \Omega^{D+2}(\mathcal{N}^{(D+2)})$  と見做すのである。すると、元の理論の分配関数を

$$\hat{Z}[A_1] := Z[A_1] e^{-i \int_{\mathcal{N}^{(D+2)}} \hat{\mathcal{A}}[A_1]}$$

と正則化すれば、直上で定義した意味でのアノマリーを相殺できるのである。

### 【例 3.3.5】カイラルアノマリー

カイラルアノマリーを Fujikawa 法で計算した結果は

$$\mathcal{A}[A_1, \lambda_0] = \kappa \lambda_0 \frac{F_2 \wedge F_2}{8\pi^2}$$

であるが,

$$\hat{\mathcal{A}}[A_1] = \kappa A_1 \wedge \frac{F_2 \wedge F_2}{8\pi^2}$$

---

<sup>\*23</sup> この仮説は、フェルミオン系においては数学的に証明されている [?]

とすれば

$$\begin{aligned}\widehat{Z}[A_1 + d\lambda_0] &= Z[A_1] e^{i\kappa \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} \lambda_0 \frac{F_2 \wedge F_2}{8\pi^2}} e^{-i\kappa \int_{\mathcal{N}^{(D+2)}} (A_1 + d\lambda_0) \wedge \frac{F_2 \wedge F_2}{8\pi^2}} \\ &= \widehat{Z}[A_1] e^{\kappa \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} \lambda_0 \frac{F_2 \wedge F_2}{8\pi^2} - i\kappa \int_{\partial \mathcal{N}^{(D+2)} = \mathcal{M}^{(D+1)}} \lambda_0 \frac{F_2 \wedge F_2}{8\pi^2}} \\ &= \widehat{Z}[A_1]\end{aligned}$$

となり、アノマリーが相殺されている。

しかるに、全てのゲージ変換について分配関数の不変性を調べるのは一般には難しい。そこで、アノマリーの定義を数学的により扱いやすい形に書き直そう [?, p.41]。まず、アノマリー流入の仮説から出発する：

### 仮説 3.1: anomaly inflow

$d = D+1$  次元時空  $\mathcal{M}^{(d)}$  の上の任意のゲージ場の理論  $Z[A; \mathcal{M}^{(d)}]$  を与える。このとき、ある  $\mathcal{N}^{(d+1)}$  の上の **TQFT**  $S^{\text{top}}[A; \mathcal{N}^{(d+1)}]$  が存在して、任意の  $d+1$  次元時空  $\mathcal{N}^{(d+1)}$  であって  $\partial \mathcal{N}^{(d+1)} = \mathcal{M}^{(d)}$  を充たすものについて

$$\widehat{Z}[A; \mathcal{M}^{(d)}, \mathcal{N}^{(d+1)}] := Z_{\mathcal{M}^{(d)}}[A] e^{-i S^{\text{top}}[A; \mathcal{N}^{(d+1)}]}$$

で定義される理論がゲージ不変であるようにできる。

ここから、 $d$  次元のゲージ場の理論の分配関数をむしろ初めから  $\widehat{Z}[A; \mathcal{M}^{(d)}, \mathcal{N}^{(d+1)}]$  として定義する。

### 定義 3.10: アノマリー

理論  $\widehat{Z}[A; \mathcal{M}^{(d)}, \mathcal{N}^{(d+1)}]$  がアノマリーを持つとは、ある 2 つの異なる  $d+1$  次元時空  $\mathcal{N}_1^{(d+1)}, \mathcal{N}_2^{(d+1)}$  であって  $\partial \mathcal{N}_1^{(d+1)} = \partial \mathcal{N}_2^{(d+1)} = \mathcal{M}^{(d)}$  を充たすものが存在して

$$J[A; \mathcal{N}_1^{(d+1)}, \mathcal{N}_2^{(d+1)}] := \frac{\widehat{Z}[A; \mathcal{M}^{(d)}, \mathcal{N}_2^{(d+1)}]}{\widehat{Z}[A; \mathcal{M}^{(d)}, \mathcal{N}_1^{(d+1)}]} \neq 1$$

が成り立つことを言う。

### 定義 3.11: IFT

**TQFT**  $\mathcal{Z}: \mathbf{Cob}_{d+1} \rightarrow \mathbf{Hilb}$  が **IFT** (invertible field theory) であるとは、 $\forall \Sigma^{(d)} \in \text{Ob}(\mathbf{Cob}_{d+1})$  について

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{Z}(\Sigma^{(d)}) = 1$$

が成り立つことを言う。

仮説 3.1 において,  $S^{\text{top}}[A; \mathcal{N}^{(d+1)}]$  は TQFT であった. 特に IFT であることを仮定すると, アノマリーは

$$\begin{aligned} J[A; \mathcal{N}_1^{(d+1)}, \mathcal{N}_2^{(d+1)}] &= \frac{\widehat{Z}[A; \mathcal{M}^{(d)}, \mathcal{N}_2^{(d+1)}]}{\widehat{Z}[A; \mathcal{M}^{(d)}, \mathcal{N}_1^{(d+1)}]} \\ &= (e^{iS^{\text{top}}[A; \mathcal{N}_1^{(d+1)}]})^\dagger e^{iS^{\text{top}}[A; \mathcal{N}_2^{(d+1)}]} \\ &= \langle \mathcal{Z}(\mathcal{N}_1^{(d+1)}) | \mathcal{Z}(\mathcal{N}_2^{(d+1)}) \rangle \\ &= \mathcal{Z}((-\mathcal{N}_1^{(d+1)}) \cup_{\partial \mathcal{N}^{(d+1)}} \mathcal{N}_2^{(d+1)}) \end{aligned}$$

となる. i.e.  $\mathcal{M}^{(d)}$  のアノマリーはある IFT  $\mathcal{Z}: \mathbf{Cob}_{d+1} \rightarrow \mathbf{Hilb}$  の分配関数<sup>\*24</sup>である. この事実をバルク-エッジ対応と言う. 結局, アノマリーを列挙する問題は IFT を列挙する問題に帰着された, ということである.

さらに, 次の有名な予想がある [?]:

#### 予想 3.1: Freed-Hopkins の予想

IFT  $\mathbf{Cob}_{d+1} \rightarrow \mathbf{Hilb}$  の群構造は,  $d+2$  次元の bordism 群の Anderson 双対

$$(I_{\mathbb{Z}}\Omega)^{d+2}$$

により与えられる.

### 3.3.7 高次対称性のアノマリー

高次対称性に関しても全く同様にアノマリーを判定できる. つまり,  $p$ -form カレントを背景ゲージ場と結合させてゲージ変換を施した際の分配関数の変化が

$$Z[A_{p_i} + d\Lambda_{p_i-1}] = Z[A_{p_i}] e^{i \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} \mathcal{A}[A_{p_i}, \Lambda_{p_i-1}]}$$

となり,  $\mathcal{A}[A_{p_i}, \Lambda_{p_i-1}] \neq 0$  ならば理論はアノマリーを持つと言う. 特に  $\mathcal{A}[A_{p_i}, \Lambda_{p_i-1} = 0 \forall i] = 0$  ならば **Hooft アノマリー**, そうでないならば **ABJ 型のアノマリー**を持つと言う.

#### 【例 3.3.6】 $p$ -form $U(1)$ ゲージ理論のアノマリー

作用が

$$S[A_p] = \frac{1}{2g^2} \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} F_{p+1} \wedge \star F_{p+1}$$

<sup>\*24</sup>  $d+1$  次元閉多様体  $\mathcal{N}^{(d+1)}$  を  $\mathcal{N}^{(d+1)} \in \text{Hom}_{\mathbf{Cob}_{d+1}}(\emptyset, \emptyset)$  と見做した際に, TQFT  $\mathcal{Z}: \mathbf{Cob}_{d+1} \rightarrow \mathbf{Hilb}$  によって線型写像  $\mathcal{Z}(\mathcal{N}^{(d+1)}): \mathcal{Z}(\emptyset) \rightarrow \mathcal{Z}(\emptyset)$  が定まるが,  $\mathcal{Z}(\emptyset) = \mathbb{C}$  と定義していたのでこの線型写像はある複素数  $\lambda_{\mathcal{Z}, \mathcal{N}^{(d+1)}} \in \mathbb{C}$  と  $\mathcal{Z}(\mathcal{N}^{(d+1)})(|\psi\rangle) = \lambda_{\mathcal{Z}, \mathcal{N}^{(d+1)}} |\psi\rangle$  の関係で一対一対応する. この複素数  $\lambda_{\mathcal{Z}, \mathcal{N}^{(d+1)}}$  のことを  $\mathcal{Z}(\mathcal{N}^{(d+1)})$  と書いて, 分配関数と呼ぶ.

で書かれる  $p$ -form U(1) ゲージ場  $A_p$  の理論を考えよう<sup>a</sup> U(1)-ゲージ変換は  $A_p \mapsto A_p + d\Lambda_{p-1}$  と書け、運動方程式と Bianchi 恒等式はそれぞれ

$$\begin{aligned} d \star F_{p+1} &= 0, \\ dF_{p+1} &= 0 \end{aligned}$$

となり、これらに対応して2つの保存カレント

$$\begin{aligned} \star J^{(e)} &:= \frac{1}{g^2} \star F_{p+1} \\ \star J^{(m)} &:= \frac{1}{2\pi} F_{p+1} \end{aligned}$$

がある。背景ゲージ場  $B_{p+1}^{(e)}$ ,  $B_{D-p}^{(m)}$  と結合させよう：

$$S[A_p, B_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}] = \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} \frac{1}{2g^2} (F_{p+1} - B_{p+1}^{(e)}) \wedge \star (F_{p+1} - B_{p+1}^{(e)}) + \frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} F_{p+1} \wedge B_{D-p}^{(m)}$$

ここで背景ゲージ場のゲージ変換  $\delta B_{p+1}^{(e)} = \Lambda_{p+1}^{(e)} \in B^{p+1}(\mathcal{M}^{(D+1)}; \mathbb{Z})$  を施す<sup>b</sup>：

$$\begin{aligned} S[A_p, B_{p+1}^{(e)} + \Lambda_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}] \\ = S[A_p, B_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}] + \frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(D+1)}} \Lambda_{p+1}^{(e)} \wedge B_{D-p}^{(m)} \end{aligned}$$

この 't Hooft アノマリーは、アノマリー流入

$$\hat{A}[B_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}] := \frac{i}{2\pi} B_{p+1}^{(e)} \wedge dB_{D-p}^{(m)}$$

により相殺される。と言うのも、

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{N}^{(D+2)}} \hat{A}[B_{p+1}^{(e)} + \Lambda_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}] &= \int_{\mathcal{N}^{(D+2)}} \hat{A}[B_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}] + \frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{N}^{(D+2)}} \Lambda_{p+1}^{(e)} \wedge dB_{D-p}^{(m)} \\ &= \int_{\mathcal{N}^{(D+2)}} \hat{A}[B_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}] + (-1)^{p+1} \frac{i}{2\pi} \int_{\partial\mathcal{N}^{(D+2)} = \mathcal{M}^{(D+1)}} \Lambda_{p+1}^{(e)} \wedge B_{D-p}^{(m)} \end{aligned}$$

となるので、分配関数を

$$\hat{Z}[B_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}] := Z[B_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}] e^{(-1)^p \int_{\mathcal{N}^{(D+2)}} \hat{A}[B_{p+1}^{(e)}, B_{D-p}^{(m)}]}$$

と正則化すれば良い。

<sup>a</sup> この理論は  **$p$ -form electrodynamics** と呼ばれる。

<sup>b</sup>  $B^\bullet(\mathcal{M}^{(D+1)}) := \text{Im}(d : \Omega^{\bullet-1}(\mathcal{M}^{(D+1)}) \rightarrow \Omega^\bullet(\mathcal{M}^{(D+1)}))$  はバウンダリー。

## 3.4 Dijkgraaf-Witten 理論

離散的ゲージ理論<sup>\*25</sup>として知られる Dijkgraaf-Witten 理論 [?] を導入する.

### 3.4.1 普遍束

$G$  を Lie 群とする.

**定義 3.12:** ファイバー束の引き戻し

- 構造群  $G$  を持つファイバー束  $F \hookrightarrow E \xrightarrow{\pi} B$
- 連続写像  $f: B_1 \rightarrow B$

を与える. このとき

$$f^*(E) := \{ (b_1, u) \in B_1 \times E \mid f(b_1) = \pi(u) \}$$

と定めることで得られるファイバー束  $F \hookrightarrow f^*(E) \xrightarrow{\text{proj}_1} B_1$  のことを**引き戻し束** (pullback bundle) と呼ぶ (図式 3.1).

$$\begin{array}{ccc} f^*(E) & \xrightarrow{\text{proj}_2} & E \\ \text{proj}_1 \downarrow & & \downarrow \pi \\ B_1 & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

図 3.1: 引き戻し束

ファイバー束  $F \hookrightarrow E \xrightarrow{\pi} B$  が

- $B$  の開被覆  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$
- 局所自明化  $\{\varphi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \xrightarrow{\sim} U_\alpha \times F\}_{\alpha \in \Lambda}$
- 変換関数  $\{t_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G\}_{\alpha \in \Lambda}$

を持つとき, 引き戻し束  $F \hookrightarrow f^*(E) \xrightarrow{\text{proj}_1} B_1$  の構造は

- $B_1$  の開被覆  $\{f^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$
- 局所自明化  $\{\tilde{\varphi}_\alpha: f^{-1}(U_\alpha) \times \pi^{-1}(U_\alpha) \xrightarrow{\sim} f^{-1}(U_\alpha) \times F, (b_1, u) \mapsto (b_1, \text{proj}_2 \circ \varphi_\alpha(u))\}_{\alpha \in \Lambda}$
- 変換関数  $\{\tilde{t}_{\alpha\beta}: f^{-1}(U_\alpha) \cap f^{-1}(U_\beta) \rightarrow G, x \mapsto t_{\alpha\beta}(f(x))\}_{\alpha \in \Lambda}$

によって定まる.

<sup>\*25</sup> ゲージ場は 1 形式である.



### 命題 3.1: 引き戻し束の同型

- 2つのファイバー束  $F \hookrightarrow E \xrightarrow{\pi} B$ ,  $F \hookrightarrow E_1 \xrightarrow{\pi_1} B_1$
- 束写像  $(f: B_1 \rightarrow B, \tilde{f}: E_1 \xrightarrow{\pi_1} E)$

を与える. このとき以下の図式を可換にする  $w: E_1 \rightarrow f^*(E)$  が一意的存在し,  $E_1$  と引き戻し束  $f^*(E)$  が束同型になる.



### 証明

$$w: E_1 \rightarrow f^*(E), u \mapsto (\pi_1(u), \tilde{f}(u))$$

と定義すると図式の緑色の部分が全て可換になり, 束同型を与える. 一意性は  $w$  の定義から明らか. ■

圏  $\mathbf{hoMfd}$  を,

- 多様体を対象とする
- 2つの多様体  $X, Y$  の間のホモトピー集合  $[X, Y]$  を  $\mathbf{Hom}$  集合とする

ものとして定義する.

- $\forall X \in \mathbf{Ob}(\mathbf{hoMfd})$  に対して集合

$$k_G(X) := \{ X \text{ 上の主束の束同型類} \}$$

を,

- $\forall X, Y \in \mathbf{Ob}(\mathbf{hoMfd})$  の  $\forall [f] \in \mathbf{Hom}_{\mathbf{hoMfd}}(X, Y)$  に対して写像

$$k_G([f]): k_G(Y) \rightarrow k_G(X), [\xi] \mapsto [f^*(\xi)]$$

を

対応づける対応

$$k_G: \mathbf{hoMfd} \rightarrow \mathbf{Sets}$$

は反変関手である [?, p.53, 10.1 Theorem].

### 定義 3.13: 普遍束

主束  $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} B$  が  $G$  の **普遍束** (universal bundle) であるとは,  $\forall X \in \text{Ob}(\mathbf{hoMfd})$  について定まる写像

$$\phi_P(X): [X, B] \longrightarrow k_G(X), [f] \longmapsto [f^*P]$$

が全単射になること.

普遍束  $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} B$  において,  $B$  のことを  $G$  の **分類空間** (classifying space) と呼ぶ.

$G$  の普遍束の全空間を  $EG$ , 分類空間を  $BG$  と書く慣習がある.

### 命題 3.2: 普遍束の特徴付け

主束  $G \hookrightarrow EG \xrightarrow{\pi_G} BG$  が  $G$  の **普遍束** であることは, 以下の2つが満たされることと同値である:

(univ-1)  $\forall X \in \text{Ob}(\mathbf{hoMfd})$  および  $X$  を底空間にもつ任意の主束  $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} X$  に対して, ある連続写像  $f: X \longrightarrow BG$  が存在して  $P$  と **引き戻し束**  $f^*(EG)$  が束同型になる.

(univ-2)  $\forall X \in \text{Ob}(\mathbf{hoMfd})$  および任意の連続写像  $f, g: X \longrightarrow BG$  に対して,  $f^*(EG)$  と  $g^*(EG)$  が束同型ならば  $f, g$  はホモトピックである.

**証明** (univ-1) は写像  $\phi_{EG}(X)$  の全射性, univ-2 は写像  $\phi_{EG}(X)$  の単射性を意味する. ■

### 命題 3.3: 普遍束の全空間の特徴付け

主束  $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} B$  が **普遍束** であるための必要十分条件は,  $\forall n \geq 0$  に対して  $\pi_n(EG) = 0$  を満たすことである.

**証明** [?, p.102, 19.4] ■

### 命題 3.4:

$G$  が離散群ならば  $BG = K(G, 1)$

**証明** 命題 3.3 より, ホモトピー長完全列から  $\pi_n(BG) \cong \pi_{n-1}(G)$  が言える. 離散群の場合は  $\pi_0(G) = G$  かつ  $\pi_{n>0}(G) = 0$  なので示された. ■

定義したは良いが, 与えられた  $G$  に対してその普遍束が存在しなければ意味がないので, 具体的に  $EG$  を構成しよう.

集合

$$EG_M := \{ (t_0g_0, t_1g_1, \dots) \mid t_i \in [0, 1], g_i \in G, \begin{array}{l} \text{高々有限個の } i \text{ のみ } t_i \neq 0 \\ \text{かつ } \sum_{i \geq 0} t_i = 1 \end{array} \}$$

を考える.  $\langle g, t \rangle := (t_0g_0, t_1g_1, \dots)$  と書き,  $EG_M$  上の等号を

$$\langle g, t \rangle = \langle g', t' \rangle \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall i \geq 0, t_i = t'_i \text{ かつ } \forall i \geq 0, t_i = t'_i > 0 \implies g_i = g'_i$$

と定義する。  $EG_M$  への  $G$  の自由な右作用を

$$\blacktriangleleft: EG_M \times G \longrightarrow EG_M, ((t_0 g_0, t_1 g_1, \dots), g) \longmapsto (t_0 g_0 g, t_1 g_1 g, \dots)$$

で定義する。  $EG_M$  には,  $\forall i \geq 0$  について定まる写像

$$\begin{aligned} t_i: EG_M &\longrightarrow [0, 1], (t_0 g_0, t_1 g_1, \dots) \longmapsto t_i, \\ x_i: t_i^{-1}((0, 1]) &\longrightarrow G, (t_0 g_0, t_1 g_1, \dots) \longmapsto x_i \end{aligned}$$

が連続になるような最小の位相を入れる。右作用  $\blacktriangleleft$  による  $EG_M$  の商位相空間を  $BG_M := EG_M/G$  とおく。

### 定理 3.5: Milnor 構成

任意の Lie 群  $G$  について  $G \hookrightarrow EG_M \xrightarrow{p} BG_M$  は<sup>a</sup>主束であり, 普遍束でもある。

<sup>a</sup>  $p: EG_M \longrightarrow BG_M$  は商写像。

### 証明 主束であること

$\forall i \geq 0$  に対して  $U_i := p(t_i^{-1}((0, 1]))$  とおくと, 開集合族  $\{U_i\}_{i \geq 0}$  は  $BG_M$  の開被覆になる<sup>\*26</sup>。さらに,  $\forall \langle g, t \rangle \in EG_M, \forall h \in G$  に対して  $t_i(\langle g, t \rangle \blacktriangleleft h) = t_i(\langle g, t \rangle)$  が成り立つので  $p^{-1}(U_i) = t_i^{-1}((0, 1])$  が言える<sup>\*27</sup>。

次に,  $\forall i \geq 0$  を 1 つ固定し,  $U_i$  上の局所自明化を構成する。連続写像

$$\sigma_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow p^{-1}(U_i), \langle g, t \rangle \longmapsto \langle g, t \rangle \blacktriangleleft (g_i(\langle g, t \rangle))^{-1}$$

を考える。  $\forall h \in G$  に対して

$$\begin{aligned} \sigma_i(\langle g, t \rangle \blacktriangleleft h) &= \langle g, t \rangle \blacktriangleleft (h g_i(\langle g, t \rangle \blacktriangleleft h)^{-1}) \\ &= \langle g, t \rangle \blacktriangleleft (h h^{-1} g_i(\langle g, t \rangle))^{-1} \\ &= \langle g, t \rangle \blacktriangleleft (g_i(\langle g, t \rangle))^{-1} \\ &= \sigma_i(\langle g, t \rangle) \end{aligned}$$

が成り立つから,

$$s_i: U_i \longrightarrow p^{-1}(U_i), p(\langle g, t \rangle) \longmapsto \sigma_i(\langle g, t \rangle)$$

は well-defined な連続写像である。さらに  $\forall p(\langle g, t \rangle) \in U_i$  に対して  $p \circ s_i(p(\langle g, t \rangle)) = p \circ \sigma_i(\langle g, t \rangle) = p(\langle g, t \rangle)$  が成り立つので  $s_i$  は局所切断である。ここで

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times G, s_i(x) \blacktriangleleft g \longmapsto (x, g)$$

<sup>\*26</sup>  $U_i$  が  $BG_M$  の開集合であることは  $EG_M$  の位相の定義から明らか。  $\forall \langle g, t \rangle \in EG_M$  に対して,  $EG_M$  の定義から  $\sum_{i \geq 0} t_i = 1$  なので  $\exists i \geq 0, t_i \neq 0$  であり,  $p(\langle g, t \rangle) \in U_i$  も言える。

<sup>\*27</sup>

$$\begin{aligned} \langle g, t \rangle \in p^{-1}(U_i) &\iff p(\langle g, t \rangle) \in U_i = p(t_i^{-1}((0, 1])) \\ &\iff \exists h \in G, \exists \langle g', t' \rangle \in t_i^{-1}((0, 1]), \langle g, t \rangle = \langle g', t' \rangle \blacktriangleleft h \\ &\implies t_i(\langle g, t \rangle) = t_i(\langle g', t' \rangle \blacktriangleleft h) = t_i(\langle g', t' \rangle) \in (0, 1] \\ &\iff \langle g, t \rangle \in t_i^{-1}((0, 1]) \end{aligned}$$

逆の包含は明らか。

と定義すると,  $\varphi_i$  は well-defined な同相写像になっている<sup>\*28</sup> ので  $U_i$  上の局所自明化である. 別の  $j \geq 0$  をとると,  $\forall p(\langle g, t \rangle) \in p^{-1}(U_i \cap U_j)$ ,  $\forall h \in G$  に対して

$$\begin{aligned}\varphi_i \circ \varphi_j^{-1}(p(\langle g, t \rangle), h) &= \varphi_i(\sigma_j(\langle g, t \rangle) \triangleleft h) \\ &= \varphi_i(\sigma_i(\langle g, t \rangle) \triangleleft (g_i(\langle g, t \rangle)g_j(\langle g, t \rangle)^{-1}h)) \\ &= (p(\langle g, t \rangle), g_i(\langle g, t \rangle)g_j(\langle g, t \rangle)^{-1}h)\end{aligned}$$

が成り立つので, 変換関数は

$$t_{ij}: U_i \cap U_j \longrightarrow G, p(\langle g, t \rangle) \longmapsto g_i(\langle g, t \rangle)g_j(\langle g, t \rangle)^{-1}$$

だと分かった<sup>\*29</sup>.

最後に  $EG_M$  が第 2 可算な Hausdorff 空間であることを示さないといけないが, 技術的なのでここでは省略する. 詳細は [?, p.55, 11.2 Theorem] を参照.

### 普遍束であること

主束  $G \hookrightarrow EG_M \xrightarrow{p} BG_M$  が命題 3.2 の条件 **(univ-1)**, **(univ-2)** を充していることを示す.

**(univ-1)** 勝手な多様体  $X$  を 1 つ固定する.

- $X$  を底空間に持つ任意の主束  $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} M$
- $P$  の開被覆  $\mathcal{U} := \{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  と局所自明化  $\{\varphi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \longrightarrow U_\alpha \times G\}_{\alpha \in \Lambda}$
- $\mathcal{U}$  に従属する 1 の分割  $\{v_\alpha: X \longrightarrow [0, 1]\}_{\alpha \in \Lambda}$

を与える. 1 の分割の定義から,  $\forall x \in X$  に対して,  $\mathcal{U}$  の添字集合  $\Lambda$  の部分集合

$$S(x) := \{i \in \Lambda \mid \text{supp } v_i \cap \{x\} \neq \emptyset\}$$

は有限集合である. また,  $\Lambda$  の任意の有限部分集合  $I \subset \Lambda$  に対して  $X$  の部分集合

$$W(I) := \{x \in X \mid \forall i \in I, \forall \alpha \in \Lambda \setminus I, v_i(x) > v_\alpha(x)\}$$

および連続関数

$$u_I: X \longrightarrow [0, 1], x \longmapsto \max \left\{ 0, \min_{i \in I, \alpha \in \Lambda \setminus I} \{v_i(x) - v_\alpha(x)\} \right\}$$

を考える.  $W(I) = u_I^{-1}((0, 1])$  なので  $W(I)$  は  $X$  の開集合である. このとき, 互いに異なる  $\Lambda$  の任意の有限部分集合  $I, J \subset \Lambda$  に対して,  $\#I = \#J$  ならば  $W(I) \cap W(J) = \emptyset$  になる<sup>\*30</sup>. よっ

<sup>\*28</sup>  $\forall \langle g, t \rangle \in p^{-1}(U_i)$  を与える. このとき  $s_i(p(\langle g, t \rangle)) = \langle g, t \rangle \triangleleft (g_i(\langle g, t \rangle)^{-1})$  なので  $\langle g, t \rangle = s_i(p(\langle g, t \rangle)) \triangleleft g_i(\langle g, t \rangle)$  であり,  $G$  の右作用  $\triangleleft$  は自由なのでこのような分解は一意である. よって  $\varphi_i(\langle g, t \rangle) = (p(\langle g, t \rangle), g_i(\langle g, t \rangle))$  であり,  $\varphi_i$  が well-defined な全単射だとわかった. 同相写像であることは, 連続写像の合成として書けているので明らか.

<sup>\*29</sup>  $g_i(\langle g, t \rangle) \triangleleft h = g_i(\langle g, t \rangle)h$  なので,  $t_{ij}$  は well-defined である.

<sup>\*30</sup>  $i \in I \setminus J$ ,  $j \in J \setminus I$  をとる. このとき  $\forall x \in W(I)$  に対して  $v_i(x) > v_j(x)$  が成り立ち, かつ  $\forall y \in W(J)$  に対して  $v_j(y) > v_i(y)$  が成り立つので,  $W(I) \cap W(J) = \emptyset$  でないといけない.

て,  $\forall m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  に対して

$$W_m := \bigcup_{\substack{I \subset \Lambda, \\ \text{finite} \\ \#I=m}} W(I),$$

$$u_m: X \longrightarrow [0, 1], x \longmapsto \frac{\sum_{\substack{I \subset \Lambda, \\ \text{finite} \\ \#I=m}} u_I(x)}{\sum_{n \geq 0} \sum_{\substack{I \subset \Lambda, \\ \text{finite} \\ \#I=n}} u_I(x)}$$

と定義すると,  $u_m$  は連続関数なので  $W_m = u_m^{-1}((0, 1])$  は  $X$  の開集合であり,

- $X$  の開被覆  $\mathcal{W} := \{W_m\}_{m \geq 0}$
- $\mathcal{W}$  に従属する 1 の分割  $\{u_m: X \longrightarrow [0, 1]\}_{m \geq 0}$

が得られた. 特に  $W_m$  は  $W(I)$  の非交和であり,  $P|_{W(I)}$  は定義から自明束と同型なので<sup>\*31</sup>  $P|_{W_m}$  は自明束と同型である. この束同型写像を  $h_m: \pi^{-1}(W_m) \xrightarrow{\sim} W_m \times G$  とおく.

今, 連続写像

$$\tilde{f}: P \longrightarrow EG_M, u \longmapsto \left( (u_0 \circ \pi(u)) (\text{proj}_2 \circ h_0(u)), \dots, (u_m \circ \pi(u)) (\text{proj}_2 \circ h_m(u)), \dots \right)$$

を考える.  $u \notin \pi^{-1}(W_m)$  のときは 1 の分割の定義から  $u_m \circ \pi(u) = 0$  となるのでこの写像は well-defined であり,  $\forall g \in G$  に対して<sup>\*32</sup>

$$\begin{aligned} \tilde{f}(u \blacktriangleleft g) &= \left( (u_0 \circ \pi(u \blacktriangleleft g)) (\text{proj}_2 \circ h_0(u \blacktriangleleft g)), \dots, (u_m \circ \pi(u)) (\text{proj}_2 \circ h_m(u \blacktriangleleft g)), \dots \right) \\ &= \left( (u_0 \circ \pi(u)) (\text{proj}_2 \circ h_0(u))g, \dots, (u_m \circ \pi(u)) (\text{proj}_2 \circ h_m(u))g, \dots \right) \\ &= \tilde{f}(u) \blacktriangleleft g \end{aligned}$$

が成り立つ. このとき連続写像

$$f: X \longrightarrow BG_M, \pi(u) \longmapsto p(\tilde{f}(u))$$

は well-defined であり, 図式

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\tilde{f}} & EG_M \\ \pi \downarrow & & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{f} & BG_M \end{array}$$

を可換にする. i.e. 組  $(f, \tilde{f})$  は束写像である. よって命題 3.1 より  $P$  と  $f^*(EG_M)$  が束同型だと分かった.

(univ-2)

■

<sup>\*31</sup>  $W(I) \subset \bigcap_{i \in I} v_i^{-1}((0, 1]) \subset \bigcap_{i \in I} U_i$  なので.

<sup>\*32</sup>  $u \blacktriangleleft g$  は命題??で与えた  $G$  の  $P$  への右作用である.

### 3.4.2 群コホモロジー

先に進む前に、特異ホモロジー・コホモロジーについて復習する。  $R$  を単項イデアル整域、  $M$  を  $R$ -加群とする。

- $R$ -係数特異ホモロジーとは、 関手

$$H_k(-; R): \mathbf{Top} \xrightarrow{S_\bullet(-; \mathbb{Z})} \mathbf{Chain} \xrightarrow{H_k} R\text{-Mod}$$

のこと。

- $M$ -係数特異ホモロジーとは、 関手

$$H_k(-; M): \mathbf{Top} \xrightarrow{S_\bullet(-; \mathbb{Z})} \mathbf{Chain} \xrightarrow{\otimes_R M} \mathbf{Chain} \xrightarrow{H_k} R\text{-Mod}$$

のこと。

- 任意の位相空間  $X$  に対して、  $H_\bullet(X; R)$  と  $H_\bullet(X; M)$  は普遍係数定理

$$0 \longrightarrow H_k(X; R) \otimes_R M \longrightarrow H_k(X; M) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^R(H_{k-1}(X; R), M) \longrightarrow 0 \quad (\text{exact})$$

によって互いに関係する。

特に、特異ホモロジーの場合は構成から  $\forall k \in \mathbb{Z}$  に対して  $S_k(X; R)$  が自由加群なのでこの短完全列は分裂し

$$H_k(X; M) \cong (H_k(X; R) \otimes_R M) \oplus \mathrm{Tor}_1^R(H_{k-1}(X; R), M)$$

と言える。

- $R$ -係数特異コホモロジーとは、 関手

$$H^k(-; R): \mathbf{Top} \xrightarrow{S_\bullet(-; \mathbb{Z})} \mathbf{Chain} \xrightarrow{\mathrm{Hom}_R(-; R)} \mathbf{Chain}^{\mathrm{op}} \xrightarrow{H^k} R\text{-Mod}$$

のこと。

- $M$ -係数特異コホモロジーとは、 関手

$$H^k(-; M): \mathbf{Top} \xrightarrow{S_\bullet(-; \mathbb{Z})} \mathbf{Chain} \xrightarrow{\mathrm{Hom}_R(-; R)} \mathbf{Chain} \xrightarrow{\otimes_R M} \mathbf{Chain}^{\mathrm{op}} \xrightarrow{H^k} R\text{-Mod}$$

のこと。

- 任意の位相空間  $X$  に対して、  $H^\bullet(X; R)$  と  $H^\bullet(X; M)$  は普遍係数定理

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ext}_R^1(H_{k-1}(X; R), M) \longrightarrow H^k(X; M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(H_k(X; R), M) \longrightarrow 0 \quad (\text{exact})$$

によって互いに関係する。

特に、特異コホモロジーの場合は構成から  $\forall k \in \mathbb{Z}$  に対して  $\mathrm{Hom}_R(S_k(X; R), R)$  が自由加群なのでこの短完全列は分裂し

$$H^k(X; M) \cong \mathrm{Hom}_R(H_k(X; R), M) \oplus \mathrm{Ext}_R^1(H_{k-1}(X; R), M)$$

と言える。

### 公理 3.2: $G$ 加群

可換群  $(M, +)$  と, 群  $G$  の  $M$  への左作用

$$\blacktriangleright: G \times M \longrightarrow M$$

の組み  $(M, +, \blacktriangleright)$  であって,  $\forall g, h \in G, \forall x, y \in M$  に対して以下の条件を充たすものを左  $G$  加群と呼ぶ:

$$\text{(G-mod1)} \quad g \blacktriangleright (x + y) = g \blacktriangleright x + g \blacktriangleright y$$

$$\text{(G-mod2)} \quad (gh) \blacktriangleright x = g \blacktriangleright (h \blacktriangleright x)$$

$$\text{(G-mod3)} \quad 1_G \blacktriangleright x = x$$

右  $G$  加群も同様に定義する.

$\mathbb{Z}$  係数の  $G$  の群環とは, 可換群  $\mathbb{Z}^{\oplus G}$  に積

$$(a_g)_g \cdot (b_g)_g := \left( \sum_{hk=g} a_h b_k \right)_g$$

を定義してできる環  $(\mathbb{Z}^{\oplus G}, +, \cdot)$  のこと. 記号として  $\mathbb{Z}[G]$  と書く. 左  $G$  加群と左  $\mathbb{Z}[G]$  加群は同一視できる.

$$\epsilon: \mathbb{Z}[G] \longrightarrow \mathbb{Z}, (a_g)_g \longmapsto \sum_{g \in G} a_g$$

を **augmentation** と呼ぶ.

### 定義 3.14: 群コホモロジー (代数的)

左  $G$  加群  $M$  を与える.  $\mathbb{Z}$  を自明な作用により左  $G$  加群と見做す.

- 群  $G$  の  $M$ -係数ホモロジーとは,

$$H_{\text{Grp}}^k(G; M) := \text{Tor}_k^{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, M)$$

のこと.

- 群  $G$  の  $M$ -係数コホモロジーとは,

$$H_{\text{Grp}}^k(G; M) := \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^k(\mathbb{Z}, M)$$

のこと.

右導来関手の一般論から, 任意の  $G$  加群の短完全列  $0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$  (exact) に対応する長完全列

$$\begin{aligned} \cdots &\longrightarrow H_{\text{Grp}}^k(G, M_1) \longrightarrow H_{\text{Grp}}^k(G, M_2) \longrightarrow H_{\text{Grp}}^k(G, M_3) \\ &\longrightarrow H_{\text{Grp}}^{k+1}(G, M_1) \longrightarrow H_{\text{Grp}}^{k+1}(G, M_2) \longrightarrow H_{\text{Grp}}^{k+1}(G, M_3) \\ &\longrightarrow \cdots \end{aligned} \tag{3.4.1}$$

が成り立つ.

### 定理 3.6: 群コホモロジー (位相空間論的)

任意の群  $G$  および  $G$  加群  $M$  に対して

$$H^\bullet(BG; M) \cong H_{\text{Grp}}^\bullet(G; M)$$

が成り立つ.

### 証明

いくつかの実用上有用な命題を紹介する:

### 命題 3.5: 色々な群コホモロジー

(1) 任意の有限群に対して

$$H_{\text{Grp}}^{k>0}(G; \mathbb{R}) = 0$$

(2) 任意のコンパクト Lie 群に対して

$$H_{\text{Grp}}^{2k+1}(G; \mathbb{R}) = 0$$

(3) 任意の Lie 群に対して

$$H_{\text{Grp}}^{2k}(G; \mathbb{R}) \cong \text{Inv}(\mathfrak{g})$$

### 証明 (1)

群  $G$  が有限群のとき, 命題 3.5-(1) と群コホモロジーの長完全列 (3.4.1) により短完全列  $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \text{U}(1) \rightarrow 0$  から同型

$$H_{\text{Grp}}^k(G; \mathbb{Z}) \cong H_{\text{Grp}}^{k-1}(G; \text{U}(1))$$

がわかる.

### 3.4.3 関手としての接続

$d = D + 1$  次元時空  $\mathcal{M}^{(d)}$  を考える. 圏  $\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})$  を<sup>\*33</sup>,

- $\mathcal{M}^{(d)}$  の点を対象とする.
- $\text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}(x, y) := \{ \sigma: [0, 1] \rightarrow \mathcal{M}^{(d)} \mid \sigma(0) = x, \sigma(1) = y \}$

によって定義する.

<sup>\*33</sup> これは groupoid を成し, path groupoid と呼ばれる (<https://ncatlab.org/nlab/show/path+groupoid>).



**命題 3.6: 関手としての接続**

- $\mathcal{M}^{(d)}$  上の主束  $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}^{(d)}$
- $P$  の同伴ベクトル束  $V \hookrightarrow E \xrightarrow{q} \mathcal{M}^{(d)}$

を与える. このとき, 任意の  $P$  の接続形式  $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$  に対して

- (1)  $\forall x \in \text{Ob}(\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)}))$  に対して  $\Gamma_\omega(x) := q^{-1}(\{x\})$
- (2)  $\forall x, y \in \text{Ob}(\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})), \forall \sigma \in \text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}(x, y)$  に対して<sup>a</sup>  $\Gamma_\omega(\sigma) := (u =: \tilde{\sigma}(0) \mapsto \tilde{\sigma}(1))$

と定義される対応

$$\Gamma_\omega: \mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)}) \longrightarrow \mathbf{Vect}$$

は関手である.

---

<sup>a</sup>  $\Phi_u(\sigma) \in G$  はループ  $\sigma$  のホロノミー.

逆に, 関手

$$\Gamma: \mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)}) \longrightarrow \mathbf{Vect}$$

であって以下の条件を満たすものは  $P$  の接続形式  $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$  を与える:

- (1) 任意の単調増加関数  $f: [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$  および  $\forall \sigma \in \text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}(x, y)$  に対して

$$\Gamma(\sigma) = \Gamma(\sigma \circ f)$$

- (2) 任意の単調減少関数  $f: [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$  および  $\forall \sigma \in \text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}(x, y)$  に対して

$$\Gamma(\sigma) = \Gamma(\sigma \circ f)$$

- (3)  $\Gamma$  は  $\sigma$  について適切な  $C^\infty$  性を満たす.

**証明** 前半は命題??より明らか. 後半は [?], [?] を参照 ■

大域的切断  $s: \mathcal{M}^{(d)} \longrightarrow P$  を許容する主束  $P$  およびその接続  $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$  を与え, 2点  $x, y \in \mathcal{M}^{(d)}$  を繋ぐ曲線  $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}(x, y)$  であって, その水平持ち上げ  $\tilde{\sigma}$  が  $\tilde{\sigma}(0) = s(x)$  を満たすものをとる. するとこのとき  $\tilde{\sigma}(1) = s(y) \triangleleft g_\sigma$  を満たす  $g_\sigma \in G$  が一意に定まる. さらに2点  $y, z \in \mathcal{M}^{(d)}$  を繋ぐ曲線  $\sigma' \in \text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}(y, z)$  であって, その水平持ち上げ  $\tilde{\sigma}'$  が  $\tilde{\sigma}'(0) = s(y)$  を満たすものをとると, 水平持ち上げの一意性から  $(\sigma' \tilde{*} \sigma)(1) = s(z) \triangleleft g_\sigma g_{\sigma'}$  が成り立つ. 従って,  $P$  が自明束ならば命題 3.6 の関手  $\Gamma_\omega: \mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)}) \longrightarrow \mathbf{Vect}$  は関手

$$\Gamma_\omega: \mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)}) \longrightarrow G$$

と見做せる. ただし  $G$  は

- $G$  のみを対象を持つ

- $G$  の元を射に持つ

ことで構成される圏である。自明束  $P$  におけるゲージ変換とは、大域的切断の取り替えに伴う変換関数によって特徴付けられる。変換関数は、大域的切断  $s_1, s_2: M \rightarrow P$  に対して  $s_1(x) = s_2(x) \triangleleft g_{12}(x)$  と定義することで定まる  $g_{12}: M \rightarrow G$  のことであり、 $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}(x, y)$  に対して

$$\Gamma_\omega(\sigma) \mapsto \Gamma'_\omega(\sigma) = g_{12}(y)^{-1} \Gamma_\omega(\sigma) g_{12}(x) \quad (3.4.2)$$

なる変換を引き起こす<sup>\*34</sup>。i.e. 変換関数  $g_{12}: M \rightarrow P$  は、自然変換

$$\begin{array}{ccc} & \Gamma_\omega & \\ \text{P}_1(\mathcal{M}^{(d)}) & \Downarrow g_{12} & G \\ & \Gamma'_\omega & \end{array}$$

である。

#### 定義 3.15: 平坦接続

$\mathcal{M}^{(d)}$  上の主束  $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}^{(d)}$  を与える。このとき  $P$  の関手としての接続

$$\Gamma: \mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)}) \rightarrow \mathbf{Vect}$$

が平坦接続 (flat connection) であるとは、互いにホモトピックな任意の  $\sigma, \sigma' \in \text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}$  に対して

$$\Gamma(\sigma) = \Gamma(\sigma')$$

が成り立つことを言う。

これまでの議論から、連結な  $\mathcal{M}^{(d)}$  上の平坦接続のモジュライ空間は

$$\text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\pi_1(\mathcal{M}^{(d)}), G)/G \quad (3.4.3)$$

であることが分かった。ただし  $G$  作用  $g \mapsto g^{-1}(-)g$  によって商をとり、ゲージ変換 (3.4.2) の冗長性を排除した。

#### 3.4.4 トポロジカルなゲージ理論：Lie 群の場合

時空が  $2+1$  次元の連結な閉多様体  $\mathcal{M}^{(3)}$  であるとする。Lie 群  $G$  がコンパクトかつ単連結ならば、 $\mathcal{M}^{(3)}$  上の任意の主束は自明束と同型になり、Chern-Simons 作用

$$S[A] := \frac{k}{8\pi^2} \int_{\mathcal{M}^{(3)}} \text{Tr} \left( A \wedge A + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right)$$

は well-defined である。しかし、 $G$  が一般のコンパクト Lie 群である場合にはそう上手くいかない。

<sup>\*34</sup>  $\tilde{\sigma}(0) = s_1(x)$  とする。このとき  $\tilde{\sigma} \triangleleft g_{12}(x)$  は  $s_2(x) = s_1(x) \triangleleft g_{12}(x)$  を始点とする  $\sigma$  の水平持ち上げであるから、  
 $s_2(y) \triangleleft \Gamma'_\omega(\sigma) = \tilde{\sigma}(1) \triangleleft g_{12}(x) = s_1(y) \triangleleft \Gamma_\omega(\sigma) \triangleleft g_{12}(x) = s_2(y) \triangleleft (g_{12}(y)^{-1} \Gamma_\omega(\sigma) g_{12}(x))$

これを解決する方法としては、 $\mathcal{M}^{(3)}$  を境界を持つ 4 次元多様体  $\mathcal{N}^{(4)}$  を持ってきて、

$$S[A] := \int_{\mathcal{N}^{(4)}} \Omega(F) = \frac{k}{8\pi^2} \int_{\mathcal{N}^{(4)}} \text{Tr}[F \wedge F]$$

と定義することが考えられる。この  $S[A]$  は Chern 指標<sup>\*35</sup>の積分なので整数値を取り、トポロジカルなゲージ場の理論になっている。4 次元多様体への拡張は一意ではないので作用は  $\text{mod } 1$  の不定性を持つが、分配関数は well-defined になる。しかし、この構成が可能であるためには任意の  $\mathcal{M}^{(3)}$  上の主束  $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}^{(3)}$  に対して、 $\mathcal{N}^{(4)}$  上の主束  $G \hookrightarrow P' \xrightarrow{\pi'} \mathcal{N}^{(4)}$  であって、 $\partial\mathcal{N}^{(4)} = \mathcal{M}^{(3)}$  への制限  $P'|_{\partial\mathcal{N}^{(4)}} = P$  を満たすようなものが存在しなくてはならない。この拡張の障害となるのが、**分類写像**  $\gamma: \mathcal{M}^{(3)} \rightarrow BG$  の誘導準同型による  $\mathcal{M}^{(3)}$  の基本類  $[\mathcal{M}^{(3)}] \in H_3(\mathcal{M}^{(3)}; \mathbb{Z})$  の像  $\gamma_*[\mathcal{M}^{(3)}] \in H_3(BG; \mathbb{Z})$  である<sup>\*36</sup>。もし  $\gamma_*[\mathcal{M}^{(3)}] = 0$  なら拡張が可能だが、そうでないときは不可能ということになる。しかしながら、命題 3.5-(2) よりコンパクト Lie 群の奇数次のホモロジーは捻れ元 (torsion element) のみから成るので、ある  $n \in \mathbb{Z}_{>0}$  が存在して

$$n \cdot \gamma_*[\mathcal{M}^{(3)}] = 0$$

を満たす。よって素朴には

$$S[A] := \frac{1}{n} \int_{\mathcal{N}^{(4)}} \Omega(F)$$

と修正すれば良いように思えるが、このままだと分配関数に  $e^{2i\pi m/n}$  の不定性残り理論が well-defined でない。この不定性を排除するためには、 $\Omega(F) \in H_{\text{dR}}^4(\mathcal{M}^{(3)}) \cong H_{\text{dR}}^4(BG) \cong H^4(BG; \mathbb{R})$  だが  $\Omega(F)$  は特性類なので、自然な単射  $H^4(BG, \mathbb{Z}) \hookrightarrow H^4(BG; \mathbb{R})$  を使って  $\Omega(F) \cong \rho([\omega])$  と書けるような  $[\omega] \in H^4(BG, \mathbb{Z})$  が存在することを使い

$$S[A] := \frac{1}{n} \left( \int_{\mathcal{N}^{(4)}} \Omega(F) - \langle \gamma^* \omega, \mathcal{N}^{(4)} \rangle \right)$$

とすれば良い。というのも、de Rham の定理からそもそも

$$\int_{\mathcal{N}^{(4)}} \Omega(F) = \langle \gamma^* \omega, \mathcal{N}^{(4)} \rangle$$

であり、 $[\omega]$  の別の代表元  $\eta$  をとってきたとすると、その差分は  $\epsilon \in C^3(BG; \mathbb{Z})$  を使って

$$\frac{1}{n} \langle \gamma^* \delta^4 \epsilon, \mathcal{N}^{(4)} \rangle = \frac{1}{n} \langle \epsilon, \gamma_* \partial \mathcal{N}^{(4)} \rangle = \langle \epsilon, \gamma_*[\mathcal{M}^{(3)}] \rangle \in \mathbb{Z}$$

になるのである。

もしくは、**Cheeger Simons differential character**  $[?] \alpha \in \widehat{H}^3(BG, \text{U}(1))$  を使って

$$S[A] = \langle \gamma^* \alpha_A, [\mathcal{M}^{(3)}] \rangle$$

と書くこともできる。

<sup>\*35</sup> Chern-Weil の定理からこれは大域的に well-defined である。

<sup>\*36</sup> 厳密にはボルディズム群を考えなくてはならない。

### 3.4.5 トポロジカルなゲージ理論：有限群の場合

ここからは  $d$  次元の連結な時空  $\mathcal{M}^{(d)}$  を考える．ゲージ群  $G$  が有限群<sup>\*37</sup>の場合，主束  $G \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}^{(d)}$  の接続は一意的に決まる<sup>\*38</sup>．さらにこの主束は被覆空間になるので， $\forall \sigma \in \text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}(x, x)$  は  $x$  のファイバー内の点  $u \in \pi^{-1}(\{x\})$  について一意的に  $\tilde{\sigma} \in \text{Hom}_{\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)})}(u, \tilde{\sigma}(1))$  へ持ち上がり， $\tilde{\sigma}(1) =: \tilde{\gamma}(0) \triangleleft \gamma_P(\sigma)$  を定める． $\mathcal{M}^{(d)}$  のホモトピーもまた  $P$  上に持ち上がり，結果として群準同型  $\gamma_P: \pi_1(\mathcal{M}^{(d)}) \rightarrow G$  が定まる．始点  $u \in \pi^{-1}(\{x\})$  を  $u \triangleleft h$  に取り替えることは  $\gamma_P(\sigma) \mapsto h^{-1}\gamma_P(\sigma)h$  の変換を引き起こす．ここから

$$[\mathcal{M}^{(d)}, BG] \xleftarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\pi_1(\mathcal{M}^{(d)}), G)/G$$

を示すことができる [?, p.4]. (3.4.3) と比較すると，結局

$$\{\mathcal{M}^{(d)} \text{ 上の主束の同型類}\} \xleftarrow{1:1} \{\mathcal{M}^{(d)} \text{ 上の平坦接続全体の集合}\}$$

であることが分かった．

#### 定義 3.16: Dijkgraaf-Witten 理論

Dijkgraaf-Witten 理論を

$$Z(\mathcal{M}^{(d)}) =: \frac{1}{\#G} \sum_{\gamma \in [\mathcal{M}^{(d)}, BG]} e^{2\pi i S[\gamma]} \quad \text{w/} \quad S[\gamma] := \langle \gamma^* \alpha, [\mathcal{M}^{(d)}] \rangle \quad (3.4.4)$$

と定義する．ここに  $\alpha \in H^d(BG; \mathbb{R}/\mathbb{Z})$  である．

このままだと実用上不便なので，計算しやすい形に書きかえよう． $H^k(BG; \mathbb{U}(1)) \cong H_{\text{Grp}}^k(G; \mathbb{U}(1))$  であるから，結局群コホモロジーを具体的に計算することになる．

$M$  を  $G$  加群とする．Milnor 構成を思い出すと，群コホモロジーのコチェイン  $C^k(G; M)$  を

$$C_{\text{Grp}}^k(G; M) := \{ \omega: G^{n+1} \rightarrow M \mid \forall g \in G, \forall g_0, \dots, g_n \in G, \omega(g_0, \dots, g_n) = \omega(gg_0, \dots, gg_n) \}$$

で定義し，余境界写像  $\delta^{k+1}: H_{\text{Grp}}^k(G; M) \rightarrow H_{\text{Grp}}^{k+1}(G; M)$  を特異コホモロジーからのアナロジーで

$$(\delta^{k+1}\omega)(g_0, \dots, g_{n+1}) := \prod_{j=0}^{n+1} \omega(g_0, \dots, \hat{g}_j, \dots, g_{n+1})^{(-1)^j}$$

と定義してみる<sup>\*39</sup>．すると  $\delta^2 = 0$  が確認できるので系列

$$\dots \xrightarrow{\delta^k} C_{\text{Grp}}^k(G; M) \xrightarrow{\delta^{k+1}} C_{\text{Grp}}^{k+1}(G; M) \xrightarrow{\delta^{k+2}} \dots$$

はコチェイン複体を成す．この複体のコホモロジー類をとることで  $H_{\text{Grp}}^k(G; M)$  が得られる<sup>\*40</sup>．コチェインを別の表示で書くこともできる：

$$\alpha(g_1, \dots, g_n) := \omega(1, g_1, g_1g_2, \dots, g_1 \cdots g_n)$$

<sup>\*37</sup> 離散位相を入れて位相群と見做す．

<sup>\*38</sup> 直観的には，ファイバー方向の接空間，i.e. 垂直部分空間が 0 次元になると考える．

<sup>\*39</sup> 群  $G$  の演算は乗法的な表記を採用した．

<sup>\*40</sup> 群コホモロジーの定義からこの表式を得ることもできるが， $\mathbb{Z}$  の  $\mathbb{Z}[G]$  加群としての射影的分解を構成するのが少し手間である．

このとき、余境界写像は

$$(\delta^{n+1}\alpha)(g_1, \dots, g_{n+1}) = \alpha(g_2, \dots, g_{n+1}) \prod_{j=1}^n \alpha(g_1, \dots, g_{j-1}, g_j g_{j+1}, g_{j+2}, \dots, g_{n+1})^{(-1)^j} \alpha(g_1, \dots, g_n)^{(-1)^{n+1}}$$

と作用する.

群コホモロジーの表式を使って分配関数を計算するには、まず  $\mathcal{M}^{(d)}$  の三角形分割  $|\mathcal{T}| \rightarrow \mathcal{M}^{(d)}$  をとる. 簡単のため  $d = 3$  とする.  $\mathcal{M}^{(3)}$  は連結だとしていたので,  $BG$  の基点  $\text{pt} \in BG$  を 1 つ固定することで, 分類写像  $\gamma: M \rightarrow BG$  をホモトピックに変形して, 任意の 0 単体  $\sigma_0 \in \mathcal{T}$  を  $\gamma[\sigma_0] = \text{pt}$  に写すようにできる. すると, 任意の 1 単体  $\sigma_1 \in \mathcal{T}$  は  $\gamma(\sigma_1) \in \pi_1(BG, \text{pt})$  と見做すことができるが, 命題 3.4 より  $\pi_1(BG, \text{pt}) \cong G$  であるから, 結局分類写像  $\gamma$  によって  $\forall \sigma_1 \in \mathcal{T}$  と何かしらの  $g_{\sigma_1} \in G$  が対応付く. この  $g_{\sigma_1}$  は格子ゲージ理論におけるリンク変数 (i.e. ゲージ場) と見做すと分かりやすい. しかるに,  $G$  が有限群であることから主束の接続は平坦でなくてははいけない. そのため, もし  $\sigma_1^{(1)}, \sigma_1^{(2)}, \sigma_1^{(3)} \in \mathcal{T}$  がある 2 単体  $\sigma_2$  について  $\partial(\sigma_2) = \sigma_1^{(1)} \cup \sigma_1^{(2)} \cup \sigma_1^{(3)}$  をみたすならば

$$g_{\sigma_1^{(1)}} g_{\sigma_1^{(2)}} g_{\sigma_1^{(3)}} = \gamma(\sigma_1^{(1)} \cup \sigma_1^{(2)} \cup \sigma_1^{(3)}) = 1 \quad (3.4.5)$$

にならなくてははいけない. このとき任意の 3 単体  $\sigma_3 \in \mathcal{T}$  に対して  $\alpha \in H_{\text{Grp}}^3(G, \text{U}(1))$  は  $W(\sigma_3) \in \text{U}(1)$  を対応づけることができる. つまり, 任意の 3 単体  $\sigma_3^{(i)}$  を四面体と見做したとき, その 6 つある辺のうち 3 つが  $\gamma$  によって  $g_i, h_i, k_i \in G$  と同定されていれば (3.4.5) から残りの 3 辺も決定できるということであり,  $W(\sigma_3^{(i)}) := \alpha(g_i, h_i, k_i) \in \text{U}(1)$  として定まる.  $|\mathcal{T}| = \bigcup_{\sigma_3 \in \mathcal{T}} \sigma_3$  であり, 3 単体  $\sigma_3^{(i)}$  の向きを特徴付ける  $\epsilon_i \in \{\pm 1\}$  を使って

$$[M] = \sum_i \epsilon_i \gamma(\sigma_3^{(i)})$$

と書くことができる. よって, 作用は

$$e^{2\pi i S[\gamma]} = \prod_i W(\sigma_3^{(i)})^{\epsilon_i} = \prod_i \alpha(g_i, h_i, k_i)^{\epsilon_i} \quad (3.4.6)$$

と書かれる.

### 【例 3.4.1】 Riemann 面の次元

種数  $g$  の Riemann 面  $\Sigma_g$  に対して, TQFT(3.4.4) によって定まる Hilbert 空間  $Z(\Sigma_g)$  の実態は不明だが, その次元を計算することができる. というのも,

$$Z(\Sigma_g \times S^1) = \text{Tr}(Z(\text{id}_{\Sigma_g})) = \text{Tr}(\text{id}_{Z(\Sigma_g)}) = \dim Z(\Sigma_g)$$

であるが, 最左辺は  $\Sigma_g \times S^1$  の具体的な三角形分割をとることで (3.4.6) を使って計算できるのである.

## 3.5 離散的高次ゲージ理論

Dijkgraaf-Witten 理論は離散的ゲージ理論だが, そこで登場したゲージ場は依然として 1 形式のものだった. これを higher gauge theory に拡張するために, 新たなゲージ場の表式を導入する.

### 3.5.1 Deligne-Beilinson コサイクルとしての $U(1)$ ゲージ場

$d = D + 1$  次元時空  $\mathcal{M}^{(d)}$  を考える.  $\mathcal{M}^{(d)}$  の良い被覆  $\mathcal{U} := \{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  を 1 つ固定する.

$\mathcal{M}^{(d)}$  上の  $U(1)$  束  $U(1) \hookrightarrow P \xrightarrow{\pi} \mathcal{M}^{(d)}$  を考える. 命題??より,  $P$  の同型類は変換関数の族  $\{g_{\alpha\beta}: U_\alpha \rightarrow U_\beta\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$  であって, コサイクル条件

$$\forall x \in U_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}, g_{\alpha_0 \alpha_1}(x) g_{\alpha_1 \alpha_2}(x) g_{\alpha_2 \alpha_0}(x) = 1$$

を満たすものによって特徴づけられるのだった. ここで  $g_{\alpha\beta}(x) = e^{2i\pi \Lambda_{\alpha\beta}(x)}$  によって  $\{\Lambda_{\alpha\beta}: U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$  を定義すると, コサイクル条件は

$$\forall x \in U_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}, \Lambda_{\alpha_0 \alpha_1}(x) + \Lambda_{\alpha_1 \alpha_2}(x) + \Lambda_{\alpha_2 \alpha_0}(x) =: n_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}(x) \in \mathbb{Z}$$

と同値である. 今,  $\{\Lambda_{\alpha_0 \alpha_1}\}_{(\alpha_0, \alpha_1) \in \Lambda^2} \in \check{H}^1(\mathcal{U}; \Omega_{\mathcal{M}^{(d)}}^0)$  と見做そう.

$\mathcal{U}$  が良い被覆であることと  $n_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}: U_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2} \rightarrow \mathbb{Z}$  が連続であることから<sup>\*41</sup>  $\forall (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2) \in \Lambda^3$  に対して  $n_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}(x)$  は定数関数であり, 故に  $\{n_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}\}_{(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2) \in \Lambda^3} \in \check{H}^2(\mathcal{U}; \mathbb{Z}_{\mathcal{M}^{(d)}})$  が分かった. 特に

$$\forall x \in U_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3}, n_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2} - n_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_3} + n_{\alpha_0 \alpha_2 \alpha_3} - n_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} = 0$$

が成り立つが, 左辺は Čech 複体の余境界写像  $\delta^3: \check{H}^2(\mathcal{U}; \mathbb{Z}_{\mathcal{M}^{(d)}}) \rightarrow \check{H}^3(\mathcal{U}; \mathbb{Z}_{\mathcal{M}^{(d)}})$  を使って  $\delta^3(\{n_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}\}_{(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2)})$  と等しいので

$$\{n_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}\}_{(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2) \in \Lambda^3} \in \text{Ker } \delta^3$$

i.e. Čech 2-コサイクルの元であることが分かった.

ところで命題??より, ゲージ場とは主束  $P$  の接続形式を  $\mathcal{U}$  に付随する局所切断によって引き戻して得られる族  $\{A_\alpha \in \Omega^1(U_\alpha; \mathfrak{u}(1))\}_{\alpha \in \Lambda}$  のことであるが,  $\mathfrak{u}(1) \cong \mathbb{R}$  なので  $A_\alpha \in \Omega^1(U_\alpha)$  と見做することができる. よって  $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \in \check{H}^0(\mathcal{U}, \Omega_{\mathcal{M}^{(d)}}^1)$  と見做することができる. そしてこのとき  $\forall \alpha_0, \alpha_1 \in \Lambda$  に対して

$$\forall x \in U_{\alpha_0 \alpha_1}, A_{\alpha_1}(x) - A_{\alpha_0}(x) = g_{\alpha_0 \alpha_1}^{-1}(x) dg_{\alpha_0 \alpha_1}(x) = 2i\pi d\Lambda_{\alpha_0 \alpha_1}(x)$$

と言える. 以上を図式にまとめると

$$\begin{array}{ccc} & & \{A_{\alpha_0}\} \\ & & \downarrow -\delta \\ & \{\Lambda_{\alpha_0 \alpha_1}\} & \xrightarrow{d} \downarrow \\ & \downarrow \delta & \\ \{n_{\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2}\} & \xrightarrow{d} \downarrow & \\ \downarrow \delta & & \\ 0 & & \end{array}$$

<sup>\*41</sup>  $\mathbb{Z}$  には離散位相を入れる.

が成り立っている． i.e.

$$(\{n_{\alpha_0\alpha_1\alpha_2}\}, \{\Lambda_{\alpha_0\alpha_1}\}, \{A_{\alpha_0}\}) \in \check{C}^2(\mathcal{U}, \Omega_X^{-1}) \oplus \check{C}^1(\mathcal{U}, \Omega_X^0) \oplus \check{C}^0(\mathcal{U}, \Omega_X^1)$$

であり, Deligne-Beilinson コチェインの元であることが分かった．特に  $C_{D_2}^1$  の元だと見做すとこれはコサイクルである．

3 つ組  $(\mathcal{U}, P, \{A_\alpha\})$  が与えられたとき, 対応する Deligne-Beilinson コサイクルは

$$(\mathrm{d}q^{(0,0)}, \delta q^{(0,0)} + \mathrm{d}_{-1}m^{1,-1}, \delta m^{1,-1}) \text{ w/ } (m^{(1,-1)}, q^{(0,0)}) \in \check{C}^1(\mathcal{U}, \mathbb{Z}_{\mathcal{M}^{(d)}}) \oplus \check{C}^0(\mathcal{U}, \Omega_{\mathcal{M}^{(d)}}^0)$$

の不定性を持つが, この不定性は局所切断の取り替えに伴うゲージ変換に相当し, コバウンダリとして書けている． よって

$$(\mathcal{U}, P, \{A_\alpha\}) \xleftrightarrow{1:1} H_D^2(C_{D_2}, \mathcal{U})$$

なる一対一対応があることが分かった．

ゲージ場の強さは局所的に  $F_\alpha := \mathrm{d}A_\alpha$  と定義されたが, 今の場合

$$F_{\alpha_0} - F_{\alpha_1} = \mathrm{d}(A_{\alpha_0} - A_{\alpha_1}) = -2i\pi \mathrm{d}^2\Lambda_{\alpha_0\alpha_1} = 0$$

となるので大域的に定義されていることが分かった．

higher gauge field に関しても同様である．  $p$ -form のゲージ場であれば

$$(\mathcal{U}, P^{(p)}, \{A_\alpha^{(p)}\}) \xleftrightarrow{1:1} H_D^{p+1}(C_{D_{p+1}}, \mathcal{U}) \quad (3.5.1)$$

の一対一対応がある． 逆に, 応急処置としてしばらくの間 (3.5.1) を  $p$ -form ゲージ場の定義として採用することにしよう．

### 3.5.2 BF-理論

$d = D + 1$  次元時空  $\mathcal{M}^{(d)}$  を考える．

**定義 3.17: BF-理論** (U(1) ゲージ場の理論として)

$p$ -form U(1) ゲージ場  $A^{(p)}$  および  $(d - p - 1)$ -form U(1) ゲージ場  $B^{(d-p-1)}$  を与える．

このとき, **BF-理論**を

$$\begin{aligned} Z_{\mathrm{BF}}[A^{(p)}, B^{(d-p-1)}] &:= e^{-S_{\mathrm{BF}}[A^{(p)}, B^{(d-p-1)}]} \\ \text{w/ } S_{\mathrm{BF}}[A^{(p)}, B^{(d-p-1)}] &:= \frac{in}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(d)}} B^{(d-p-1)} \wedge \mathrm{d}A^{(p)} \end{aligned}$$

と定義する<sup>a</sup>． ただし  $n \in \mathbb{Z}$  とする．

<sup>a</sup>  $\int_{\mathcal{M}^{(d)}}$  は Deligne-Beilinson コチェインの積分と解釈すべきであるが, 形式的に de Rham コチェインの積分として扱っても問題は生じにくい．

$\mathcal{M}^{(d)}$  の良い被覆  $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  を 1 つ固定する．ゲージ変換は Deligne-Beilinson コサイクル

$$\begin{aligned} (\{n_{\alpha_0 \dots \alpha_{p+2}}\}, \{\Lambda_{\alpha_0 \dots \alpha_{p+1}}^{(1)}\}, \dots, \{\Lambda_{\alpha_0 \alpha_1}^{(p-1)}\}, \{A_{\alpha_0}^{(p)}\}) &\in \check{C}^{p+1}(\mathcal{U}; \mathbb{Z}) \oplus \bigoplus_{k=0}^p \check{C}^{p-k}(\mathcal{U}; \Omega^k) \\ (\{m_{\alpha_0 \dots \alpha_{d-p}}\}, \{\lambda_{\alpha_0 \dots \alpha_{d-p-1}}^{(1)}\}, \dots, \{\lambda_{\alpha_0 \alpha_1}^{(d-p-2)}\}, \{B_{\alpha_0}^{(d-p-1)}\}) &\in \check{C}^{d-p-1}(\mathcal{U}; \mathbb{Z}) \oplus \bigoplus_{k=0}^{d-p-1} \check{C}^{d-p-k-1}(\mathcal{U}; \Omega^k) \end{aligned}$$

によって定義される．特に場の強さは  $\forall \alpha_0, \alpha_1 \in \Lambda$  に対して

$$\begin{aligned} dA_{\alpha_1}^{(p)} - dA_{\alpha_0}^{(p)} &= d(\delta A^{(p)})_{\alpha_0 \alpha_1} = d(d\Lambda_{\alpha_0 \alpha_1}^{(p-1)}) = 0, \\ dB_{\alpha_1}^{(d-p-1)} - dB_{\alpha_0}^{(d-p-1)} &= d(\delta B^{(d-p-1)})_{\alpha_0 \alpha_1} = d(d\lambda_{\alpha_0 \alpha_1}^{(d-p-2)}) = 0 \end{aligned}$$

を充たすので大域的に well-defined である．

**BF-理論**から発見的に「ゲージ群」<sup>\*42</sup>が  $\mathbb{Z}_n$  であるような  $p$ -form ゲージ理論を得るトリックを説明する [?, p.6], [?, p.9]. 具体的には, 2 つのゲージ場をダイナミカルにするだけで良い:

$$\begin{aligned} Z_{\text{BF}} &:= \int [da^{(p)}] \int [db^{(d-p-1)}] Z_{\text{BF}}[a^{(p)}, b^{(d-p-1)}] \\ &= \int [da^{(p)}] \int [db^{(d-p-1)}] e^{\frac{in}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(d)}} b^{(d-p-1)} \wedge da^{(p)}} \\ &= \int [da^{(p)}] \Big|_{da^{(p)}=0} \end{aligned}$$

ただし, 最右辺の拘束条件  $da^{(p)} = 0$  は Euler-Lagrange 方程式によるものである．この拘束条件により,  $a^{(p)}$  についての和が**平坦接続**についてのものに制限されたということである．また, 任意の閉部分多様体  $\Sigma^{(p+1)}, \Sigma^{(d-p-2)} \subset \mathcal{M}^{(d)}$  に対するホロノミー

$$\begin{aligned} W(\Sigma^{(p)}) &:= e^{i \int_{\Sigma^{(p+1)}} a^{(p)}}, \\ W(\Sigma^{(d-p-1)}) &:= e^{i \int_{\Sigma^{(d-p-2)}} b^{(d-p-1)}} \end{aligned}$$

は,

$$\begin{aligned} \langle W(\Sigma^{(p)}) \rangle &= \int [da^{(p)}] \int [db^{(d-p-1)}] e^{\frac{in}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(d)}} b^{(d-p-1)} \wedge a^{(p)}} e^{i \int_{\mathcal{M}^{(d)}} a^{(p)} \wedge \delta(\Sigma^{(p+1)})} \\ &= \int [dB^{(d-p-1)}] \Big|_{db^{(d-p-1)} = \frac{2\pi}{n} \delta(\Sigma^{(d-p-2)})}, \\ \langle W(\Sigma^{(d-p-1)}) \rangle &= \int [da^{(p)}] \int [db^{(d-p-1)}] e^{\frac{in}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(d)}} B^{(d-p-1)} \wedge a^{(p)}} e^{i \int_{\mathcal{M}^{(d)}} b^{(d-p-1)} \wedge \delta(\Sigma^{(d-p-2)})} \\ &= \int [da^{(p)}] \Big|_{da^{(p)} = \frac{2\pi}{n} \delta(\Sigma^{(p+1)})} \end{aligned}$$

となることから,  $\Sigma^{(d-p-1)}$  の周りでは

$$W(\Sigma^{(p)}) = e^{-\frac{2\pi i}{n} \text{Link}(\Sigma^{(p)}, \Sigma^{(d-p-1)})} \in \mathbb{Z}_n$$

<sup>\*42</sup> 主  $p$ -束の観点からすると,  $p$ -form ゲージ場に対応する「ゲージ群」は  **$p$ -群**になるべきである．



$\Sigma^{(p)}$  の周りでは

$$W(\Sigma^{(p)}) = e^{-\frac{2\pi i}{n} \text{Link}(\Sigma^{(p)}, \Sigma^{(d-p-1)})} \in \mathbb{Z}_n$$

のホロノミーがあることが分かる。このことから、**BF-理論**に登場する2つのゲージ場をダイナミカルにすることで得られる理論は、ホロノミーが  $\mathbb{Z}_n$  に値をとる平坦接続のゲージ理論であること、i.e.  $\mathbb{Z}_n$  ゲージ理論になっていると見做せるのである。

### 3.5.3 BF-理論の等価な形

前小節で導入したトリックは、いくつかの等価な形で述べるができる。補助場  $\tilde{a}^{(d-p-2)}$  を導入し、場の強さ  $F^{(p+1)} := dA^{(p)}$  を独立な場と見做すことで

$$\begin{aligned} S_{\text{BF}}[F^{(p+1)}, B^{(d-p-1)}, \tilde{a}^{(p)}] &:= \frac{in}{2\pi} B^{(d-p-1)} \wedge F^{(p+1)} + \frac{i}{2\pi} d\tilde{a}^{(d-p-2)} \wedge F^{(p+1)} \\ &= \frac{i}{2\pi} F^{(p+1)} \wedge (d\tilde{a}^{(d-p-2)} + nB^{(d-p-1)}) \end{aligned}$$

とする。ここでゲージ場をダイナミカルにすることで

$$\begin{aligned} Z_{\text{BF}} &= \int [df^{(p+1)}] \int [db^{(d-p-1)}] \int [d\tilde{a}^{(d-p-2)}] e^{-\int_{\mathcal{M}^{(d)}} \left( \frac{in}{2\pi} b^{(d-p-1)} \wedge f^{(p+1)} + \frac{i}{2\pi} d\tilde{a}^{(d-p-2)} \wedge f^{(p+1)} \right)} \\ &= \int [df^{(p+1)}] \Big|_{df^{(p+1)}=0} \int [db^{(d-p-1)}] e^{-\int_{\mathcal{M}^{(d)}} \frac{in}{2\pi} b^{(d-p-1)} \wedge f^{(p+1)}} \\ &= \int [df^{(p+1)}] \Big|_{df^{(p+1)}=0, f^{(p+1)}=0} \end{aligned}$$

となる。汎関数積分において Bianchi 恒等式  $dF^{(p+1)} = 0$  および平坦接続の拘束条件が付いてくれるのである。もしくは、

$$\begin{aligned} Z_{\text{BF}} &= \int [db^{(d-p-1)}] \int [d\tilde{a}^{(d-p-2)}] \int [df^{(p+1)}] e^{-\int_{\mathcal{M}^{(d)}} \frac{i}{2\pi} F^{(p+1)} \wedge (d\tilde{a}^{(d-p-2)} + nb^{(d-p-1)})} \\ &= \int [db^{(d-p-1)}] \int [d\tilde{a}^{(d-p-2)}] \Big|_{d\tilde{a}^{(d-p-2)} + nb^{(d-p-1)}=0} \end{aligned} \quad (3.5.2)$$

と捉えても良い。 $\tilde{a}^{(d-p-2)}$  は、 $Z_{\text{BF}}[F^{(p+1)}, B^{(d-p-1)}, \tilde{a}^{(p)}]$  に対するゲージ不変性の要請から

$$\tilde{a}^{(d-p-2)} \mapsto \tilde{a}^{(d-p-2)} + d\tilde{\lambda}^{(d-p-3)} - n\lambda^{(d-p-2)} \quad (3.5.3)$$

なるゲージ変換を受ける。

### 3.5.4 BF-理論における 't Hooft operator

't Hooft operator の素朴な定義は  $\tilde{T}(\Sigma^{(d-p-2)}) := \exp(i \int_{\Sigma^{(d-p-2)}} \tilde{a}^{(d-p-2)})$  とすることだが、これはゲージ変換 (3.5.3) の下で不変でない。ゲージ不変にするために、 $\partial\Sigma^{(d-p-1)} = \Sigma^{(d-p-2)}$  を満たす  $(d-p-1)$ -次元部分多様体  $\Sigma^{(d-p-1)} \subset \mathcal{M}^{(d)}$  を用いて

$$T(\Sigma^{(d-p-2)}; \Sigma^{(d-p-1)}) := \exp \left( i \int_{\Sigma^{(d-p-2)}} \tilde{a}^{(d-p-2)} + in \int_{\Sigma^{(d-p-1)}} b^{(d-p-1)} \right)$$

と定義する．然るに (3.5.2) から、これの期待値を計算すると

$$\begin{aligned}
& \left\langle T(\Sigma^{(d-p-2)}; \Sigma^{(d-p-1)}) \right\rangle \\
&= \int [db^{(d-p-1)}] \int [d\tilde{a}^{(d-p-2)}] \Big|_{d\tilde{a}^{(d-p-2)} + nb^{(d-p-1)}=0} \exp \left( i \int_{\Sigma^{(d-p-2)}} \tilde{a} d - p - 2^{(+)} i n \int_{\Sigma^{(d-p-1)}} b^{(d-p-1)} \right) \\
&= \int [db^{(d-p-1)}] \int [d\tilde{a}^{(d-p-2)}] \Big|_{d\tilde{a}^{(d-p-2)} + nb^{(d-p-1)}=0} \exp \left( i \int_{\Sigma^{(d-p-1)}} (d\tilde{a}^{(d-p-2)} + nb^{(d-p-1)}) \right) \\
&= 1
\end{aligned}$$

となり消えてしまう．

## 3.6 高次のゲージ理論-より厳密な定式化

時空を  $\mathcal{M}^{(d)}$  と書く．これまでは高次のゲージ場の配位空間<sup>\*43</sup>について全く触れずに計算を進めてきた．しかるに、これらの計算は実質的に  $U(1)$  ゲージ場についての経路積分になっており、ill-defined である．特に平坦接続の拘束条件がどの程度厳密に課されているのかには疑問が残る．また、0-form の **Dijkgraaf-Witten 理論** の場合に見たように、トポロジカルなゲージ場の理論を考える際にはゲージ場の配位空間を真面目に考えないと自明な理論しか得られない可能性がある．この小節では、高次のゲージ場の配位空間の構造をできるだけ正確に記述することを試みる．参考文献は [?] である．

### 3.6.1 0-form のまとめ

一般化の前に 0-form (i.e. ゲージ場としては 1-form) の場合の結果をまとめておくのが有用である．

まずゲージ群  $G$  が一般の位相群である場合、時空  $\mathcal{M}^{(d)}$  上の主束は**普遍束**により分類された：

$$\text{Bun}_G(\mathcal{M}^{(d)}) / \cong \xleftarrow{1:1} [\mathcal{M}^{(d)}, BG] \quad (3.6.1)$$

ただし  $\cong$  はファイバー束の同型である．これは圏  $\mathbf{Mfd}$  における引き戻し<sup>\*44</sup>

$$\begin{array}{ccc}
P & \longrightarrow & * \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{M}^{(d)} & \xrightarrow{\gamma} & BG
\end{array}$$

と理解することができた．ただし命題 3.3 により普遍束の全空間は一点  $*$  と同じホモトピー型なので  $*$  と書いた．一方で、接続としてのゲージ場はこの上に Deligne-Beilinson 2-コサイクルの情報を付加することに他ならない．概念的には、我々の求めたい接続付き主束の同型類全体と 1 対 1 対応がある空間を  $BG_{\text{conn}}$  と書いて

<sup>\*43</sup> 物理では**モジュライ空間** (moduli space) とも言う．

<sup>\*44</sup> 正確には全ての射が up to homotopy だとした、**homotopy pullback** (<https://ncatlab.org/nlab/show/homotopy+pullback>) の図式である．

$$\begin{array}{ccc}
& & BG_{\text{conn}} \\
& \nearrow (A, g) & \downarrow \text{forget} \\
\mathcal{M}^{(d)} & \xrightarrow{\gamma} & BG
\end{array}$$

のようになっている．ここに  $(A, g) \in \text{Del}^2(\mathcal{M}^{(d)}, \Omega^\bullet(-, \mathfrak{g}))$  である．また，平坦接続に話を限った  $BG_{\text{flat}}$  はより簡単な構造を持つ．これは接続を命題 3.6 により関手  $\mathbf{P}_1(\mathcal{M}^{(d)}) \rightarrow BG$  と見做すことで， $\mathcal{M}^{(d)}$  が連結ならば

$$BG_{\text{flat}} \xleftarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\pi_1(\mathcal{M}^{(d)}), G)/G \quad (3.6.2)$$

となることが分かった．

次にゲージ群  $G$  が離散群の場合を考える．このとき接続の定義から自動的に平坦接続になってしまう：

$$BG_{\text{conn}} = BG_{\text{flat}} \xleftarrow{1:1} \text{Bun}_G(\mathcal{M}^{(d)})/\cong \quad (3.6.3)$$

さらに主束が自動的に被覆空間になることから

$$[\mathcal{M}^{(d)}, BG] \xleftarrow{1:1} \text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\pi_1(\mathcal{M}^{(d)}), G)/G$$

が分かり，結局

$$BG_{\text{conn}} = BG_{\text{flat}} \xleftarrow{1:1} \text{Bun}_G(\mathcal{M}^{(d)})/\cong \xleftarrow{1:1} [\mathcal{M}^{(d)}, BG] \quad (3.6.4)$$

が言えた．i.e. ゲージ場の配位空間は  $[\mathcal{M}^{(d)}, BG]$  と求まった．

### 3.6.2 $p$ -form への拡張

全小節の内容を素朴に  $p$ -form (i.e.  $(p+1)$ -form ゲージ場) の場合に拡張することを考えてみよう．まずは  $G$  を一般の位相群とする．このとき (3.6.1) の一般化として，ある「上手く定義された圏」( $\infty$ -トポス)  $\mathbf{H}$  の上の homotopy pullback の図式

$$\begin{array}{ccc}
P & \longrightarrow & * \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{M}^{(d)} & \xrightarrow{\gamma} & \mathbf{BG}
\end{array}$$

があると考えると，

$$\text{Bun}_G(\mathcal{M}^{(d)}) := \text{Hom}_{\mathbf{H}}(\mathcal{M}^{(d)}, \mathbf{BG})$$

とおいてみる．ただし  $\text{Bun}_G(\mathcal{M}^{(d)})$  と言うのは「主  $p$ -束」とでも呼ぶべき構造であり，現時点では未定義である．次に「平坦接続」付き「主  $p$ -束」のモジュライ空間  $\mathbf{BG}_{\text{flat}}$  であるが，これは path groupoid を十分うまく拡張した「path  $(p+1)$ -groupoid」 $\mathbf{P}_{p+1}(\mathcal{M}^{(d)})$  があると考えて (3.6.2) の一般化

$$\mathbf{BG}_{\text{flat}} \cong \text{Hom}_{\mathbf{H}}(\mathbf{P}_{p+1}(\mathcal{M}^{(d)}), \mathbf{BG})$$

を仮定する．平坦でない場合というのは厄介だが， $\mathbf{BG}$  の方を上手く処理できたとして同様に考える．

次に、 $G$  が離散群である場合を考える．このとき問題になるのは、(3.6.3) の一般化

$$\mathbf{B}G_{\text{conn}} = \mathbf{B}G_{\text{flat}}$$

が成り立つのか不明であり、従って (3.6.4) の一般化

$$\mathbf{B}G_{\text{conn}} = \mathbf{B}G_{\text{flat}} \xrightarrow{1:1} \text{Bun}_G(\mathcal{M}^{(d)}) = \text{Hom}_H(\mathcal{M}^{(d)}, \mathbf{B}G)$$

が成り立っているかが不明な点にある．実際、前節で行ったトリックは  $\mathbf{B}G_{\text{conn}}$  について和をとっていることになる．しかし、トポロジカル演算子を挿入することを考えるとむしろ  $\text{Bun}_G(\mathcal{M}^{(d)}) / \cong$  の方が配位空間だと考える方が自然かもしれない．

### 3.6.3 高次群の構造が自明な場合： $\infty$ -groupoid

全小節の推測を真面目に扱うには、 $\infty$ -圏の力を借りる必要がある．

#### 定義 3.18: extended group

有限群の列  $\mathbb{G} = (G_1, G_2, \dots)$  であって、

- ある  $d$  が存在して  $\forall q \geq d$  に対して  $G_q = 1$  を満たす．
- $\forall p \geq 2$  に対して  $G_p$  は可換群

を満たすものを**拡張された群** (extended group) と呼ぶ [?].

時空  $\mathcal{M}^{(d)}$  の三角形分割を与える単体的集合  $T \in \text{Ob}(\mathbf{SimpSet})$  をとり、勝手な  $d$ -単体  $\sigma \in T_d$  を1つ固定する． $\sigma$  はちょうど  $d+1$  個の  $0$ -単体  $\{0, 1, \dots, d\}$  からなる． $\sigma$  の部分  $p$ -単体は  $\{0, 1, \dots, d\}$  から互いに相異なる  $p+1$  個を選んだ  $\{l_0, \dots, l_p\} \subset \{0, 1, \dots, d\}$  からなる．i.e.

$$\binom{d+1}{p+1}$$

個存在する． $d$ -単体  $\sigma$  の部分  $p$ -単体全体の集合を  $\langle d:p \rangle$  と書く． $p$  単体の**向き**は常に  $l_0 < \dots < l_p$  を満たすようにとる．

定義 3.19:

- 自明な高次群 (higher group) の構造を持つ  $\sigma$  上の  $\mathbb{G} = (G_1, G_2, \dots)$ -ゲージ場とは,  $\forall p \geq 1$  に対して与えられた写像

$$A^{(p)}: \langle d: p \rangle \longrightarrow G_p \quad (3.6.5)$$

のこと<sup>a</sup>.

- $\mathbb{G}$ -ゲージ場  $\{A^{(p)}: \langle d: p \rangle \longrightarrow G_p\}_{p \geq 1}$  が平坦 (flat) であるとは,  $\forall p \geq 1$  および  $\forall \tau \in \langle d: p+1 \rangle$  に対して

$$\prod_{j=0}^{p+1} A(\partial_j^{p+1}(\tau))^{(-1)^j} = 1_{G_p} \quad (3.6.6)$$

を充たすこと.

---

<sup>a</sup>  $A^{(p)}$  の像の元をゲージ自由度と呼ぶ.

しばらくの間,  $1 \leq p \leq d$  を 1 つ固定する. (3.6.6) により, 独立なゲージ自由度は

$$\binom{d}{p}$$

個である. よって  $\{1, \dots, d\}$  の互いに相異なる  $p$  点部分集合全体がなす集合を  $[d: p] \subset \langle d: p \rangle$  と書くと, 写像

$$g^{(p)}: [d: p] \longrightarrow G_p, \{q_1, \dots, q_p\} \longmapsto g_{q_1 \dots q_p} \quad (3.6.7)$$

は独立なゲージ自由度を表している. 表示 (3.6.5) と (3.6.7) の間の関係としては [?, p.8] に倣って

$$\forall \{l_0, \dots, l_p\} \subset \{0, \dots, d\}, \quad A(\{l_0, \dots, l_p\}) = \prod_{q_1=l_0+1}^{l_1} \cdots \prod_{q_p=l_{p-1}+1}^{l_p} g_{q_1 \dots q_p}$$

を仮定する. このとき面写像  $d_j^d \in \text{Hom}_\Delta([d-1], [d])$  による  $p$ -form ゲージ場  $A^{(p)}$  の引き戻しは  $\forall \{l_0, \dots, l_p\} \subset \{0, \dots, d-1\}$  について

$$\begin{aligned} & \prod_{q_1=l_0+1}^{l_1} \cdots \prod_{q_p=l_{p-1}+1}^{l_p} (d_j^{d*} g)_{q_1 \dots q_p} \\ &:= d_j^{d*} A(\{l_0, \dots, l_p\}) \\ &= A(d_j^d(\{l_0, \dots, l_p\})) \\ &= A(\{l_0, \dots, l_{k-1}, l_k+1, \dots, l_p+1\}) \quad (l_{k-1} < j \leq l_k) \\ &= \prod_{q_1=l_0+1}^{l_1} \cdots \prod_{q_{k-1}=l_{k-2}+1}^{l_{k-1}} \prod_{q_k=l_{k-1}+1}^{l_k+1} \prod_{q_{k+1}=l_k+2}^{l_{k+1}+1} \cdots \prod_{q_p=l_{p-1}+2}^{l_p+1} g_{q_1 \dots q_p} \end{aligned}$$

と求まり, 縮退写像  $s_j^d \in \text{Hom}_\Delta([d+1], [d])$  による引き戻しは<sup>\*45</sup>  $\forall \{l_0, \dots, l_p\} \subset \{0, \dots, d+1\}$  について

$$\begin{aligned}
& \prod_{q_1=l_0+1}^{l_1} \cdots \prod_{q_p=l_{p-1}+1}^{l_p} (s_j^{d*} g)_{q_1 \dots q_p} \\
&:= s_j^{d*} A(\{l_0, \dots, l_p\}) \\
&= A(s_j^d(\{l_0, \dots, l_p\})) \\
&= A(\{l_0 \dots l_{k-1}, l_k - 1, \dots, l_p - 1\}) \quad (l_{k-1} \leq j < l_k) \\
&= \begin{cases} \prod_{q_1=l_0+1}^{l_1} \cdots \prod_{q_{k-1}=l_{k-2}+1}^{l_{k-1}} \prod_{q_k=l_{k-1}+1}^{l_k-1} \prod_{q_{k+1}=l_k}^{l_{k+1}-1} \cdots \prod_{q_p=l_{p-1}}^{l_p-1} g_{q_1 \dots q_p}, & l_{k-1} < j < l_k \\ 1_{G_p}, & l_{k-1} = j \end{cases}
\end{aligned}$$

となる. i.e.

$$\begin{aligned}
(d_j^{d*} g)_{q_1 \dots q_p} &= \begin{cases} g_{q_1 \dots q_\bullet, q_\bullet+1+1, \dots, q_{p+1}}, & q_\bullet < j < q_{\bullet+1} \\ g_{q_1 \dots q_\bullet, q_\bullet+1+1, \dots, q_{p+1}} g_{q_1 \dots q_\bullet+1, q_\bullet+1+1, \dots, q_{p+1}}, & q_\bullet = j \end{cases} \\
(s_j^{d*} g)_{q_1 \dots q_p} &= \begin{cases} g_{q_1 \dots q_\bullet, q_\bullet+1-1, \dots, q_p-1}, & q_\bullet < j+1 < q_{\bullet+1} \\ 1_{G_p}, & j+1 \in \{q_1, \dots, q_p\} \end{cases}
\end{aligned}$$

が分かった. 以上より, 3 つ組

$$\{X^{(p)}([d]) := \text{Hom}_{\mathbf{Sets}}([d : p], G_p)\}_{d \geq 0},$$

$$\{\partial_j^d : \text{Hom}_{\mathbf{Sets}}([d : p], G_p) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Sets}}([d-1 : p], G_p), g \longmapsto d_j^{d*} g\}_{0 \leq j \leq d, d \geq 1}, \quad (3.6.8)$$

$$\{\sigma_j^d : \text{Hom}_{\mathbf{Sets}}([d : p], G_p) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Sets}}([d+1 : p], G_p), g \longmapsto s_j^{d*} g\}_{0 \leq j \leq d, d \geq 1}, \quad (3.6.9)$$

は単体的恒等式を満たし, 単体的集合

$$X^{(p)} : \Delta^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Sets}$$

を成す.

### 定理 3.7:

単体的集合  $X^{(p)} \in \text{Ob}(\mathbf{SimpSet})$  は  $\infty$ -groupoid である.

証明  $\forall n \geq 0$  および  $0 \leq i \leq n$  を 1 つ固定する. 勝手な圏  $\mathbf{SimpSet}$  の射

$$f : \Lambda_i^n \longrightarrow X^{(p)}$$

を 1 つ固定する. このとき, 圏  $\mathbf{SimpSet}$  における可換図式

$$\begin{array}{ccc}
\Lambda_i^n & \xrightarrow{f} & X^{(p)} \\
\downarrow \iota & \nearrow \exists \bar{f} & \\
\Delta^n & & 
\end{array}$$

<sup>\*45</sup> 部分単体の次数は相変わらず  $p$  であることに注意.

の存在を示せば良い．ところで系??から，射  $f, \iota$  はそれぞれ

$$(f_0, \dots, \widehat{f_i}, \dots, f_n) \in \prod_{k \in [n] \setminus \{i\}} X^{(p)}([n-1]),$$

$$(d_0^n, \dots, \widehat{d_i^n}, \dots, d_n^n) \in \prod_{k \in [n] \setminus \{i\}} \Delta^n([n-1])$$

であって  $\forall j, k \in [n] \setminus \{i\}$  s.t.  $j < k$  について  $\partial_j^{n-1}(f_k) = \partial_{k-1}^{n-1}(f_j)$  を満たすものと同一視できる．よって示すべきは  $\partial_j^n(\bar{f}) = f_j \quad (\forall j \in [n] \setminus \{i\})$  を満たす  $\bar{f} \in X^{(p)}([n-1]) = \text{Hom}_{\mathbf{Sets}}([n-1:p], G_p)$  が存在することである<sup>\*46</sup>． $n \geq p$  のときは自明なので  $n < p$  を考える．

$\{q_1 < \dots < q_p\} \in [n-1:p]$  に含まれない最小の整数を  $j$  とおき， $j$  に関する数学的帰納法によって写像  $\bar{f}$  の行き先  $\bar{f}(\{q_1, \dots, q_p\})$  を構成する．まず  $j = 1$  のときは

$$\bar{f}(\{q_1, \dots, q_p\}) := f_0(\{q_1 - 1, \dots, q_p - 1\})$$

とおく． $j > 1$  のときは帰納法の仮定を使い

$$\begin{aligned} \bar{f}(\{q_1, \dots, q_p\}) &:= f_j(\{q_1, \dots, q_m, q_{m+1} - 1, \dots, q_p - 1\}) \\ &\quad \times \bar{f}(\{q_1 + 1, \dots, q_m + 1, q_{m+1}, \dots, q_p\})^{-1} \end{aligned}$$

(ただし  $q_m = j$ ) とおくと， $j \leq i - 1$  までの帰納法が完成する．

次に  $\{q_1 < \dots < q_p\} \in [n-1:p]$  に含まれない最大の整数を  $j$  とおき， $j$  に関する数学的帰納法によって写像  $\bar{f}$  の行き先  $\bar{f}(\{q_1, \dots, q_p\})$  を構成する．まず  $j = n - 1$  のときは

$$\bar{f}(\{q_1, \dots, q_p\}) := f_n(\{q_1, \dots, q_p\})$$

とおく． $j < n - 1$  のときは帰納法の仮定を使い

$$\begin{aligned} \bar{f}(\{q_1, \dots, q_p\}) &:= \bar{f}(\{q_1, \dots, q_m, q_{m+1} - 1, \dots, q_p - 1\})^{-1} \\ &\quad \times f_j(\{q_1, \dots, q_m, q_{m+1} - 1, \dots, q_p - 1\}) \end{aligned}$$

(ただし  $q_m = j$ ) とおくと， $j \geq i + 2$  までの帰納法が完成する．以上の2段階の帰納法により  $\bar{f}$  が定まった．(3.6.9)を使うと  $\partial_j^n(\bar{f}) = f_j$  が分かる． ■

**定理 3.8:**  $X^{(p)}$  は Eilenberg-MacLane 空間

$$\pi_n(|X^{(p)}|) = \begin{cases} G_p, & n = p \\ 1, & n \neq p \end{cases}$$

**証明** 定理??より， $\infty$ -groupoid  $X^{(p)}$  の単体的ホモトピー群を計算すれば良い． $n = 0$  のときと  $n < p$  のときは  $Z_n(X, *) \subset X_n = \{\emptyset\}$  なので  $\pi_n^\Delta(X, *) = 1$  である．

$n > p$  とする．すると  $\forall Q := \{q_1 < \dots < q_p\} \in [n:p]$  に対してある  $0 \leq j \leq n$  が存在して  $j \notin Q$  を満たす．よって  $\forall h \in Z_n(X, *)$  をとると (3.6.8) から

$$\partial_i^n h(Q) = h(\{q_1, \dots, q_\bullet, q_\bullet + 1, \dots, q_{p+1} + 1\}) = (\sigma_0)^{n-1}(*) = 1_{G_p}$$

<sup>\*46</sup> このような  $\bar{f}$  のことを角  $\Lambda_i^n$  の **filler** と呼ぶ．

が分かる. i.e.  $Z_n(X, *) = \{1\}$  であり,  $\pi_n^\Delta(X, *) = 1$  が分かった.

$n = p$  とする.  $[p : p]$  は一点集合で  $[p+1 : p]$  は  $p+1$  点集合なので  $X^{(p)}([n]) \cong G_p$ ,  $X^{(p)}([n+1]) \cong G_p^{\times(p+1)}$  となる. よって  $x \in X^{(p)}([n+1])$  を

$$x = (x_1, \dots, x_{p+1})$$

と書く.  $\forall a, b \in Z_n(X^{(p)}, *)$  をとる. このとき  $a$  と  $b$  を繋ぐホモトピー  $x \in X^{(p)}([n+1])$  は存在すれば

$$x_1 = x_2 x_1 = \dots = x_p x_{p-1} = 1, x_{p+1} x_p = a, x_{p+1} = b$$

を充たすが, この解は  $a = b$  でないと存在しない. よって  $a \sim b \iff a = b$  であり,  $\pi_n^\Delta(X^{(p)}, *) \cong G_p$  が分かる. ■

### 3.6.4 2-群の場合：ホロノミー 2-関手

次に, ゲージ群が 2-群の場合を考えよう. [?] を参考に, ゲージ群が厳密な 2-Lie 群  $\mathcal{G}$  である場合から出発する. 命題??より  $\mathcal{G}$  は交差加群  $(G_2 \xrightarrow{t} G_1, \alpha)$  と等しい.  $G_1, G_2$  の単位元における接空間をとることで, 微分交差加群  $(\mathfrak{g}_2 \xrightarrow{dt} \mathfrak{g}_1, d\alpha)$  を得る.

時空の good cover  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$  を 1 つ固定する. 命題 3.6 のように, 2-接続をホロノミーのなす関手として定義するところから始める.

#### 定義 3.20: path 2-groupoid

$M$  を  $d$  次元  $C^\infty$  多様体とする. path 2-groupoid  $\mathbf{P}_2(M)$  を以下のように定義する:

- $\text{Ob}(\mathbf{P}_2(M)) := M$
- $\forall x, y \in M$  に対して

$$\text{Ob}(\text{Hom}_{\mathbf{P}_2(M)}(x, y)) := \{ \gamma : [0, 1] \rightarrow M \mid \gamma(0) = x, \gamma(1) = y \} / \sim$$

- $\forall \gamma_0, \gamma_1 \in \text{Ob}(\text{Hom}_{\mathbf{P}_2(M)}(x, y))$  に対して

$$\text{Hom}_{\text{Hom}_{\mathbf{P}_2(M)}}(\gamma_0, \gamma_1) := \left\{ \Sigma : [0, 1] \longrightarrow M \mid \begin{array}{l} \Sigma(0, t) = \text{const.}, \Sigma(1, t) = \text{const.}, \\ \Sigma(-, 0) = \gamma_0, \Sigma(-, 1) = \gamma_1 \end{array} \right\} / \sim$$

2-射は適切な縦の合成と横の合成を持つ [?, Definition20, p.20]. ただし  $\sim$  は thin homotopy [?, Definition19, p.20] である.

定理??と同様に, 主 2-束を変換関数によって特徴付ける.

## 3.7 (1+1)-次元の有限群 0-form 対称性のゲージ化

[?] に従って,  $(1+1)$ -次元系の, フュージョン則が有限群 (非可換でも良い)  $G$  であるような 0-form symmetry をゲージ化する手続きを与える.



### 3.7.1 ユニタリフュージョン圏としての 0-form 対称性

#### 公理 3.3: $(1+1)$ -次元の有限群 0-form 対称性

$(1+1)$ -次元系における有限群  $G$  の 0-form symmetry は、ユニタリフュージョン圏として特徴付けられる。

公理 3.3 を解説する。ユニタリフュージョン圏  $\mathcal{C}$  を 1 つ固定する。

まず、トポロジカル演算子は  $a \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  によってラベルされる。  $C \subset M$  を向きづけられた 1 次元部分多様体 (i.e. 曲線) とすると、理論  $T$  にトポロジカル演算子を挿入した際の分配関数は

$$\langle \cdots U_a(C) \cdots \rangle$$

となる。特に、単位対象  $1 \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対応するトポロジカル演算子は分配関数を変えない：

$$\langle \cdots U_1(C) \cdots \rangle = \langle \cdots \rangle$$

$f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(a, b)$  は、トポロジカルな点状の演算子を表し、トポロジカル演算子のラベルを取り替える。



$\forall a, b \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対し、和

$$\langle \cdots U_{a \oplus b}(C) \cdots \rangle = \langle \cdots U_a(C) \cdots \rangle + \langle \cdots U_b(C) \cdots \rangle$$

が存在する。また、2 つのトポロジカル演算子はフュージョンすることができる：

$$\langle \cdots U_{a \otimes b}(C) \cdots \rangle = \sum_{c \in \text{Simp}(\mathcal{C})} N_{ab}^c \langle \cdots U_c(C) \cdots \rangle$$

特に  $\mathcal{C}$  がフュージョン圏であることから、 $\text{Simp}(\mathcal{C})$  にはある種の有限性を要請していることになる。

$\mathcal{C}$  は rigid なモノイダル圏でもあり、associator, evaluation, coevaluation に対応するデータも持つ。associator に対応するデータはしばしば  $F$ -symbol<sup>\*47</sup> と呼ばれる。

#### 【例 3.7.1】圏 $\text{Vec}_G^\alpha$ とアノマリー

$\mathcal{C} = \text{Vec}_G^\alpha$  とする。【例??】により  $\text{Vec}_G^\alpha$  と  $\text{Vec}_G^{\alpha'}$  の間のテンソル関手は 2 つ組  $(f, \mu) \in \text{Aut}(G) \times H_{\text{Grp}}^3(G; \text{U}(1))$  によって指定される。特に  $f = \text{Id}$  と選ぶと、これは 2 次元の理論  $T$  における Dijkgraaf-Witten タイプの 't Hooft アノマリーを指定することに他ならない。

<sup>\*47</sup>  $F$ -symbol は、厳密には associator そのものではない。

### 【例 3.7.2】圏 $\mathbf{Vec}_G^\alpha$ と $G$ -SPT のスタック

$\mathcal{C} = \mathbf{Vec}_G^\alpha$  とする.  $\mathbf{Vec}_G^\alpha$  の自己同型はモノイダル自然同型によって与えられるが, 【例??】によりそれは 2 つ組  $(f, \tau) \in \mathrm{Aut}(G) \times H_{\mathrm{Grp}}^2(G; \mathrm{U}(1))$  を指定する. これは 2 次元の理論  $T$  に 2 次元のボゾニック  $G$ -SPT をスタックする操作に他ならない.

## 3.7.2 代数対象とゲージ化

$(1 + 1)$ -次元系における有限の **0-form symmetry** を公理 3.3 によりユニタリフュージョン圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \mathrm{ev}^L, \mathrm{coev}^L, \mathrm{ev}^R, \mathrm{coev}^R)$  と見做す.

### 定義 3.21: ゲージ化

$(1 + 1)$ -次元時空  $M^{(2)}$  上の場の理論  $T$  が **0-form symmetry**  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \mathrm{ev}^L, \mathrm{coev}^L, \mathrm{ev}^R, \mathrm{coev}^R)$  を持つとする.

$T$  のゲージ化 (gauging) とは,

- 圏  $\mathcal{C}$  における対称 Frobenius 代数  $(A, \mu, \nu, \Delta, \epsilon)$
- $M^{(2)}$  の十分細かい三角形分割<sup>a</sup>  $K \in \mathrm{Ob}(\mathbf{SimpSet})$

の組のこと. ゲージ化された理論のことを  $T/A$  と書く.

<sup>a</sup> より正確には, Poincaré 双対をとることで  $K$  を再現するような, trivalent junction からなるメッシュのことを指す.

定義 3.21 を解説する. 簡単のため  $G$  を可換とは限らない有限群,  $\mathcal{C} = \mathbf{Vec}_G$  とし,  $A := \bigoplus_{g \in G} \mathbb{K}g$  とおく. ただし  $\forall g \in G$  に対して  $\mathbb{K}g$  は 1 次元  $\mathbb{K}$ -ベクトル空間であり, その基底を  $e_g$  と書く. このとき

- $\mathbf{Vec}_G$  の射

$$\mu: A \otimes A \longrightarrow A, e_g \otimes e_h \longmapsto e_{gh}$$

- $\mathbf{Vec}_G$  の射

$$\nu: 1 \longrightarrow A, 1_G \longmapsto \sum_{g \in G} \delta_{1_G, g} e_g$$

は明らかに  $\mathbf{Vec}_G$  の代数対象である. さらに

- $\mathbf{Vec}_G$  の射

$$\Delta: A \longrightarrow A \otimes A, e_g \longmapsto \sum_{h \in G} e_h \otimes e_{h^{-1}g}$$

- $\mathbf{Vec}_G$  の射

$$\epsilon: A \longrightarrow 1, e_g \longmapsto \delta_{1_G, g} e_{1_G}$$

は  $\forall g \in G$  に対して

$$\begin{aligned}
(\text{Id}_A \otimes \Delta) \circ \Delta(e_g) &= (\text{Id}_A \otimes \Delta) \left( \sum_{h \in G} e_h \otimes e_{h^{-1}g} \right) \\
&= \sum_{h, k \in G} e_h \otimes e_k \otimes e_{(hk)^{-1}g}, \\
(\Delta \otimes \text{Id}_A) \circ \Delta(e_g) &= \sum_{h, k \in G} e_k \otimes e_{k^{-1}h} \otimes e_{h^{-1}g} \\
&= \sum_{k \in G} e_k \otimes \left( \sum_{h \in G} e_{k^{-1}h} \otimes e_{h^{-1}g} \right) \\
&= \sum_{k \in G} e_k \otimes \left( \sum_{h \in G} e_h \otimes e_{(kh)^{-1}g} \right) \\
&= (\text{Id}_A \otimes \Delta) \circ \Delta(e_g), \\
(\epsilon \otimes \text{Id}_A) \circ \Delta(e_g) &= \sum_{h \in G} \delta_{1_G, h} e_{1_G} \otimes e_{h^{-1}g} \\
&= e_{1_G} \otimes e_g \\
&= l_A(e_g), \\
(\text{Id}_A \otimes \epsilon) \circ \Delta(e_g) &= \sum_{h \in G} \delta_{1_G, h^{-1}g} e_h \otimes e_{h^{-1}g} \\
&= e_g \otimes e_{1_G} \\
&= r_A(e_g)
\end{aligned}$$

が成り立つので組  $(A, \Delta, \epsilon)$  は余代数対称である。その上

$$\begin{aligned}
\mu \circ \Delta(e_g) &= \mu \left( \sum_{h \in G} e_h \otimes e_{h^{-1}g} \right) \\
&= \sum_{h \in G} e_g \\
&= |G| \text{Id}_A(e_g)
\end{aligned}$$

が成り立つので分離可能であり,

$$\begin{aligned}
(\text{Id}_A \otimes \mu) \circ (\Delta \otimes \text{Id}_A)(e_g \otimes e_h) &= (\text{Id}_A \otimes \mu) \left( \sum_{k \in G} e_k \otimes e_{k^{-1}g} \otimes e_h \right) \\
&= \sum_{k \in G} e_k \otimes e_{k^{-1}gh}, \\
\Delta \circ \mu(e_g \otimes e_h) &= \sum_{k \in G} e_k \otimes e_{k^{-1}(gh)} \\
(\mu \otimes \text{Id}_A) \circ (\text{Id}_A \otimes \Delta)(e_g \otimes e_h) &= (\mu \otimes \text{Id}_A) \left( \sum_{k \in G} e_g \otimes e_k \otimes e_{k^{-1}h} \right) \\
&= \sum_{k \in G} e_{gk} \otimes e_{k^{-1}h} \\
&= \sum_{k \in G} e_k \otimes e_{(g^{-1}k)^{-1}h} \\
&= \sum_{k \in G} e_k \otimes e_{k^{-1}gh}
\end{aligned}$$

が成り立つので Frobenius 代数であり,

$$\begin{aligned}
(\epsilon \otimes \text{Id}_{A^*}) \circ (\mu \otimes \text{Id}_{x^*}) \circ (\text{Id}_A \otimes \text{coev}_A^L)(e_g) &= (\epsilon \otimes \text{Id}_{A^*}) \circ (\mu \otimes \text{Id}_{x^*}) \left( e_g \otimes \left( \sum_{h \in G} e_h \otimes e_{h^{-1}} \right) \right) \\
&= \sum_{h \in G} \delta_{1_G, gh} e_{h^{-1}} \\
&= e_g, \\
(\text{Id}_{A^*} \otimes \epsilon) \circ (\text{Id}_{x^*} \otimes \mu) \circ (\text{coev}_A^R \otimes \text{Id}_A)(e_g) &= (\text{Id}_{A^*} \otimes \epsilon) \circ (\text{Id}_{x^*} \otimes \mu) \left( \left( \sum_{h \in G} e_{h^{-1}} \otimes e_h \right) \otimes e_g \right) \\
&= \sum_{h \in G} \delta_{1_G, hg} e_{h^{-1}} \\
&= e_g
\end{aligned}$$

が成り立つので対称 Frobenius 代数であることがわかる.

これらの関係式のストリング図式の Poincaré 双対をとることにより, 従来のゲージ化の定義との対応が明らかになる.

### 3.7.3 ゲージ化された理論の持つ対称性

定義 3.21 に倣い, ユニタリフュージョン圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  の対称 Frobenius 代数  $(A, \mu, \nu, \Delta, \epsilon)$  を 1 つ固定する. このとき, **ゲージ化された理論**  $T/A$  の持つ **0-form symmetry** はどのようなユニタリフュージョン圏で特徴づけられるのだろうか?

#### 命題 3.7: ゲージ化された理論の持つ対称性

$T/A$  の持つ対称性は,  $\mathcal{C}$  における  $(A, A)$ -両側加群対象がなす圏  $\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(A, A)$  である.

命題 3.7 を理解しよう．まず， $T/A$  の分配関数は， $T$  の分配関数に  $A$  でラベルされたトポロジカル演算子を，時空多様体  $M^{(2)}$  上のメッシュに沿って挿入したものである：

$$Z_{T/A}(M^{(2)}) = Z_T \left( \begin{array}{c} \text{メッシュに沿ったトポロジカル演算子の挿入} \end{array} \right)$$

したがってトポロジカル演算子として  $p \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  でラベルされるようなものを依然として考えることができるが，それが  $A$  の任意のメッシュの配位に対してトポロジカルであるためには， $p$  でラベルされたトポロジカル演算子と  $A$  でラベルされたトポロジカル演算子との間のフュージョン則にある種の整合性条件を課す必要がある．命題 3.7 は，その整合性条件がまさに  $(A, A)$ -両側加群対象の条件 **(bimod-1)**-(**bimod-3**) であることを主張している．物理的には，トポロジカル演算子の向きが逆になっていてもフュージョンできるべきである．幸いにして  $\mathcal{C}$  がユニタリフュージョン圏であることから， $\text{coev}^L, \text{coev}^R$  を用いることで  $A$ -加群の構造の定義に登場する矢印の向きを全て逆転して， $A$ -余加群の構造を常に持たせることができる．

次に，2つの異なるトポロジカル演算子  $p, q \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を考える．これらの接合部となる点状のトポロジカル演算子  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(p, q)$  は，左右からの  $A$  の作用について可換でなくてはならない．i.e.  $(A, A)$ -両側加群の準同型ということになる．このことから， $(1+1)$ -次元の理論  $T/A$  の持つトポロジカル演算子全体が圏  $\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(A, A)$  を成すことがわかる．

しかるに，圏  $\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(A, A)$  が **0-form symmetry** であるためにはそれがユニタリフュージョン圏にならなくてはならない．まず，テンソル積は代数  $A$  上のテンソル積  $(\otimes_A, \pi)$  だと考えられる．実際，こうすることで  $(p, \lambda_1, \rho_1), (q, \lambda_2, \rho_2) \in \text{Ob}(\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(A, A))$  のフュージョン則が

$$\begin{array}{c} p \otimes_A q \\ \downarrow \pi \\ p \quad q \\ \downarrow \rho_1 \quad \downarrow \rho_2 \\ p \quad q \end{array} = \begin{array}{c} p \otimes_A q \\ \downarrow \pi \\ p \quad q \\ \downarrow \lambda_1 \quad \downarrow \lambda_2 \\ p \quad q \end{array}$$

のようになるが，これはまさに  $p, q$  に挟まれた  $A$  のメッシュを  $p, q$  のフュージョンにおいて無視できることを意味する． $\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(A, A)$  の associator と unitors, left/right evaluation, coevaluation は

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{p,q,r} &:= \pi_{p,q \otimes_A r} \circ (\text{Id}_p \otimes \pi_{q,r}) \circ a_{p,q,r} \circ (\bar{\pi}_{p,q} \otimes \text{Id}_r) \circ \bar{\pi}_{p \otimes_A q, r}, \\ \bar{\text{ev}}_p^L &:= v \circ \text{ev}_p^L \circ \bar{\pi}_{p^*, p}, \\ \bar{\text{coev}}_p^L &:= \pi_{p, p^*} \circ \text{coev}_p^L \circ \Delta, \\ &\vdots \end{aligned}$$

のように定義する．こうして  $(\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(A, A), \otimes_A, 1, \bar{a}, \bar{l}, \bar{r}, \bar{\text{ev}}^L, \bar{\text{coev}}^L, \bar{\text{ev}}^R, \bar{\text{coev}}^R)$  がユニタリフュージョン圏になり，公理 3.3 の意味で  $T/A$  の 0-form symmetry を特徴付ける．

**命題 3.8: ゲージ化前後のドメインウォールの持つ対称性**

時空多様体  $M$  が 1 次元部分多様体  $D$  によって 2 つの領域  $M_1, M_2$  に分割されているとする. 左側の  $M_1$  には理論  $T$  を, 右側の  $M_2$  にはゲージ化された理論  $T/A$  を置く. このとき  $D$  の持つ対称性は  $\mathbf{Mod}_C\text{-}A$  であり,  $(C, \mathbf{Bimod}_C(A, A))$ -両側加群圏の構造を持つ.

**【例 3.7.3】  $\mathbf{Vec}_G$  のゲージ化**

$G$  を有限群とする. 前小節と同様に,  $\mathbf{Vec}_G$  の対象 Frobenius 代数として

$$\begin{aligned} A &:= \bigoplus_{g \in G} \mathbb{K}\{e_g\} \\ \mu: A \otimes A &\longrightarrow A, e_g \otimes e_h \longmapsto e_{gh} \\ v: 1 &\longrightarrow A, 1_G \longmapsto \sum_{g \in G} \delta_{1_G, g} e_g \\ \Delta: A &\longrightarrow A \otimes A, e_g \longmapsto \sum_{h \in G} e_h \otimes e_{h^{-1}g} \\ \epsilon: A &\longrightarrow 1, e_g \longmapsto \delta_{1_G, g} e_{1_G} \end{aligned}$$

を選ぶ.  $\mathbf{Vec}_G$  の右  $A$ -加群対象全体がなす圏  $\mathbf{Mod}_{\mathbf{Vec}_G}\text{-}A$  とはなんだろうか.

まず,  $\forall m \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Vec}_G)$  に対してある非負整数の族  $\{N_g\}_{g \in G}$  が存在して  $m = \bigoplus_{g \in G} N_g \mathbb{K}\{e_g\}$  と書くことができる.  $m$  が右  $A$ -加群対象であるためには, **(associativity)**, **(unitarity)** を充たす  $\mathbf{Vec}_G$  の射  $\rho \in \mathbf{Hom}_{\mathbf{Vec}_G}(m \otimes A, m)$  を見つけなくてはならない. 【例??】から,  $\mathbf{Vec}_G$  のテンソル積は

$$m \otimes A = \bigoplus_{g \in G} \bigoplus_{h \in G} N_h \mathbb{K}e_h \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}e_{h^{-1}g}$$

と書けるから, 結局  $\forall g, h \in G$  に対して

$$\rho_{g,h}: N_g \mathbb{K}e_g \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K}e_h \longrightarrow N_{gh} \mathbb{K}e_{gh}$$

を指定すれば  $\rho$  が定まる. **(associativity)** より  $\forall g, h, k \in G$  に対して

$$\rho_{gh,k} \circ \rho_{g,h} = \rho_{g,hk}$$

が, **(unitarity)** より  $\forall g \in G$  に対して

$$\rho_{g,1_G} = \text{Id}$$

がわかる. よって  $\forall g, h \in G$  に対して

$$\rho_{g,h} \circ \rho_{gh,h^{-1}} = \rho_{gh,1_G} = \text{Id}$$

が言える. ここから

$$N_g = N_{1_G} =: N \rho_{g,h} = \rho_{1_G,gh} \circ \rho_{1_G,g}^{-1}$$

が分かる. i.e.  $m = NA$  であり,  $\rho$  は線型同型写像の族  $\{\rho_{1_G,g}\}_{g \in G}$  によって完全に決定できる. ところが,  $\forall (NA, \{\rho_{1_G,g}\}_{g \in G}) \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Mod}_{\mathbf{Vec}_G}\text{-}A)$  は明らかに  $(NA, \{\text{Id}\}_{g \in G})$  と右  $A$ -加群対象として同型である. よって  $(NA, \{\text{Id}\}_{g \in G})$  のみ考えれば良い.

次に, 射  $f \in \text{Hom}_{\mathbf{ModVec}_G-A}(NA, N'A)$  を考える. 右作用が自明なのでこれはただの線型写像である. 以上の考察から, まず  $\mathbf{ModVec}_G-A \cong \mathbf{Vec}_{\mathbb{K}}$  が分かった.

同様の考察から,  $(NA, \{\lambda_{g,1_G}\}_{g \in G}, \{\rho_{1_G,g}\}_{g \in G}) \in \text{Ob}(\mathbf{BimodVec}_G(A, A))$  と見做することができる. 条件 **(bimod-3)** から  $\forall g, h \in G$  に対して

$$\lambda_{g,1_G} \circ \lambda_{h,1_G} = x_{gh,1_G}$$

がわかるが,  $\lambda_{g,1_G} \in \text{GL}(NA)$  であることから左作用のデータ  $\{\lambda_{g,1_G}\}_{g \in G}$  は群  $G$  の表現を与えることが分かる.  $\mathbf{BimodVec}_G(A, A)$  の射は明らかに  $G$ -同変写像であるから,  $\mathbf{BimodVec}_G(A, A) \cong \mathbf{Rep}(G)$  が分かった.

### 【例 3.7.4】 $\mathbf{Rep}(G)$ のゲージ化

$G$  を有限群とする.  $\mathbf{Rep}(G)$  の対象 Frobenius 代数としては, **正則表現** (regular representation)

$$A: G \longrightarrow \text{GL}\left(\bigoplus_{g \in G} \mathbb{K}\hat{g}\right), g \longmapsto (\hat{h} \longmapsto g\hat{h})$$

をとってくる. 代数対象の乗法は  $G$ -同変写像

$$\mu: \left(\bigoplus_{g \in G} \mathbb{K}\hat{g}\right) \otimes \left(\bigoplus_{g \in G} \mathbb{K}\hat{g}\right) \longrightarrow \bigoplus_{g \in G} \mathbb{K}\hat{g}, \hat{g} \otimes \hat{g} \longmapsto \delta_{g,h}\hat{g}$$

で, unit は  $G$ -同変写像

$$v: 1 \longrightarrow \bigoplus_{g \in G} \mathbb{K}\hat{g}, 1 \longmapsto \sum_{g \in G} \hat{g}$$

である.

$\forall (r: G \longrightarrow \text{GL}(R)) \in \text{Ob}(\mathbf{Rep}(G))$  を 1 つ固定する. 右  $A$ -加群対象を指定するには右作用  $\rho: r \otimes A \longrightarrow r$  を指定せねばならない.

### 3.7.4 等価なゲージ化

時空多様体  $M^{(2)}$  のメッシュが同一だとすると, 異なる対称 Frobenius 代数  $(A, \mu, v, \Delta, \epsilon), (A', \mu', v', \Delta', \epsilon')$  はいつ同じゲージ化された理論  $T/A \cong T/A'$  を与えるのだろうか? この  $\cong$  は, ゲージ化された理論の持つ対称性およびドメインウォールの持つ対称性が等価であることを意味する.

#### 定義 3.22: 等価なゲージ化

$T/A \cong T/A'$  であるとは, 左  $C$ -加群圏の同値  $\mathbf{Mod}_C-A \cong \mathbf{Mod}_C-A'$  が成り立つこと, i.e.  $A$  と  $A'$  が森田同値であることを言う.

### 定理 3.9: 加群圏の特徴付け

- 有限な多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$
- 既約かつ完全な左  $\mathcal{C}$ -加群圏  $(\mathcal{M}, \blacktriangleright, \alpha, \lambda)^a$
- 勝手な  $\mathcal{M}$  の対象  $m \in \text{Ob}(\mathcal{M})$

を与える. このとき  $\mathcal{M}$  の internal hom functor  $\multimap: \mathcal{M}^{\text{op}} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$  に関して  $m \multimap m$  は  $\mathcal{C}$  における代数対象になり, 関手

$$F: \mathcal{M} \rightarrow \mathbf{Mod}_{\mathcal{C}}(m \multimap m), n \mapsto m \multimap n$$

は左  $\mathcal{C}$ -加群圏の同値である.

<sup>a</sup> [?, p.152]

**証明** [?, THEOREM7.10.1, p.150] ■

定理 3.9 および定義 3.22 より, ゲージ化の同値類は既約かつ完全な左  $\mathcal{C}$ -加群圏  $(\mathcal{M}, \blacktriangleright, \alpha, \lambda)^{*48}$  と一対一対応する. このことから, ゲージ化された理論を  $T/A$  と書く代わりに  $T/\mathcal{M}$  と書く. さらに命題 3.8 より, その  $\mathcal{M}$  は元の理論  $T$  とゲージ化された理論  $T/\mathcal{M}$  の接触境界が持つ対称性を記述する.

### 3.7.5 再ゲージ化

既約かつ完全な左  $\mathcal{C}$ -加群圏  $(\mathcal{M}, \blacktriangleright, \alpha, \lambda)$  を 1 つ固定する. 命題 3.7, 3.8 および定理 3.9 から, ある対称 Frobenius 代数対象  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が存在して左  $\mathcal{C}$ -加群圏の同値  $\mathcal{M} \cong \mathbf{Mod}_{\mathcal{C}}-A$  が成り立ち, ゲージ化された理論  $T/\mathcal{M}$  は  $\mathcal{C}' := \mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(A, A)$  の対称性を持ち,  $\mathcal{M}$  は自然に  $(\mathcal{C}, \mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(A, A))$ -両側加群圏の構造を持つ.

既約かつ完全な左  $\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(A, A)$ -加群圏  $(\mathcal{M}', \blacktriangleright', \alpha', \lambda')'$  をとってきてこの操作を繰り返すことは,  $(\mathcal{C}, \mathcal{C}')$ -両側加群圏の構造を持つ Deligne のテンソル積  $\mathcal{M} \boxtimes_{\mathcal{C}'} \mathcal{M}'$  によって  $T/(\mathcal{M} \boxtimes_{\mathcal{C}'} \mathcal{M}')$  とゲージ化することに等しい. 特に,  $\mathcal{M}$  の反対加群<sup>\*49</sup>  $\mathcal{M}_{\text{op}}$  を加群積の順序を逆にすることで定義する<sup>\*50</sup>と,  $\mathcal{M}_{\text{op}}$  は  $(\mathcal{C}', \mathcal{C})$ -両側加群圏となり,  $\mathcal{M} \boxtimes_{\mathcal{C}'} \mathcal{M}_{\text{op}}$  によるゲージ化は対称性を元に戻す. i.e. 定義 3.22 の意味で  $T \cong T/\mathcal{M}/\mathcal{M}_{\text{op}}$  が成り立つ.

### 3.7.6 ゲージ化で移り合える対称性・anyon condensation

#### 命題 3.9: ゲージ化で互いに移り合える対称性

$(1+1)$ -次元の理論の対称性  $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$  が適切なゲージ化によって互いに移り合える必要十分条件は, その Drinfeld センターが一致することである.

<sup>\*48</sup> [?, p.152]

<sup>\*49</sup> 反対圏は  $\text{op}$  を上付きに書くことで区別する.

<sup>\*50</sup> より正確には, さらに left/right actor の逆写像をとる



命題 3.9 の操作をモジュラーテンソル圏に対して行うことを**エニオン凝縮** (anyon condensation) と呼ぶ。

## 3.8 離散的高次対称性

離散群によって特徴付けられる対称性に対しては、保存カレントを定義することはできないが、**トポロジカル演算子**と **charged object** ならば定義できる。

### 3.8.1 $BF$ -理論における離散的高次対称性

**$BF$ -理論**を考える。まず最初に、この理論が以下の変換の下で不変であることに注意する：

$$\begin{aligned} A^{(p)} &\longmapsto A^{(p)} + \frac{1}{n}\epsilon^{(p)}, \\ B^{(d-p-1)} &\longmapsto B^{(d-p-1)} + \frac{1}{n}\epsilon^{(d-p-1)}, \\ F^{(p+1)} &\longmapsto F^{(p+1)}, \\ \tilde{A}^{(d-p-2)} &\longmapsto \tilde{A}^{(d-p-2)} - \tilde{\epsilon}^{(d-p-2)} \end{aligned}$$

ただし  $\epsilon^{(p)}, \epsilon^{(d-p-1)}$  は閉形式であり、任意の閉部分多様体  $\Sigma^{(p)}, \Sigma^{(d-p-1)} \subset \mathcal{M}^{(d)}$  について

$$\int_{\Sigma^{(p)}} \epsilon^{(p)}, \int_{\Sigma^{(d-p-1)}} \epsilon^{(d-p-1)} \in 2\pi\mathbb{Z}$$

を満たすとする。また、局所的に  $\epsilon^{(d-p-1)} =: d\tilde{\epsilon}^{(d-p-2)}$  と定義した。実際、この変換によって

$$\begin{aligned} Z_{\text{BF}} &= \int [da^{(p)}] \int [db^{(d-p-1)}] e^{\frac{in}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(d)}} b^{(d-p-1)} \wedge a^{(p)}} \\ &\longmapsto \int [da^{(p)}] \int [db^{(d-p-1)}] e^{\frac{in}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(d)}} b^{(d-p-1)} \wedge a^{(p)}} e^{\frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(d)}} \epsilon^{(d-p-1)} \wedge da^{(p)}} \\ &= \int [da^{(p)}] \Big|_{da^{(p)}=0} e^{\frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(d)}} \epsilon^{(d-p-1)} \wedge a^{(p)}} \\ &= Z_{\text{BF}} \end{aligned}$$

となる。トポロジカル演算子は

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{e^{2\pi i k/n}}(\Sigma^{(p)}) &:= e^{ik \int_{\Sigma^{(p)}} a^{(p)}} \\ \mathcal{U}_{e^{2\pi i k/n}}(\Sigma^{(d-p-1)}) &:= e^{ik \int_{\Sigma^{(d-p-1)}} b^{(d-p-1)}} \end{aligned}$$

の2つあり、それぞれに対応する charged object は

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_n(\mathcal{C}^{(d-p-1)}) &:= e^{in \int_{\mathcal{C}^{(d-p-1)}} b^{(d-p-1)}} \\ \mathcal{W}_n(\mathcal{C}^{(p)}) &:= e^{in \int_{\mathcal{C}^{(p)}} a^{(p)}} \end{aligned}$$

となっている。

【例 3.8.1】  $(3+1)$ -次元における  $\mathbb{Z}_n$  ゲージ理論

$(3+1)$ -次元時空  $\mathcal{M}^{(4)}$  におけるトポロジカルな  $\mathbb{Z}_n$  ゲージ理論

$$\begin{aligned} S[a^{(1)}, b^{(2)}] &:= \frac{in}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} b^{(2)} \wedge da^{(1)} + \frac{ipn}{4\pi} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} b^{(2)} \wedge b^{(2)} \\ &= \frac{in}{4\pi p} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} (da^{(1)} + pb^{(2)}) \wedge (da^{(1)} + pb^{(2)}) - \frac{in}{4\pi p} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} da^{(1)} \wedge da^{(1)} \end{aligned}$$

を考える [?, p.21].  $a^{(1)}, b^{(2)}$  はダイナミカルなので, 作用は  $\text{mod } 2\pi$  でゲージ不変でなくてはいけない. よって  $b^{(2)}$  のゲージ変換  $b^{(2)} \mapsto b^{(2)} + d\lambda^{(1)}$  は  $a^{(1)}$  にも同時に変換を引き起こさなくてはならない<sup>a</sup>:

$$a^{(1)} \mapsto a^{(1)} - p\lambda^{(1)}$$

注意すべきなのは,  $a^{(1)}, \lambda^{(1)}$  の両者が  $U(1)$  ゲージ場なので, その値が  $\text{mod } 2\pi$  でしか決まらないことである. よってこのゲージ変換における作用の非自明な変化は

$$-\pi ipn \int_{\mathcal{M}^{(4)}} \frac{d\lambda}{2\pi} \wedge \frac{d\lambda}{2\pi}$$

で記述される. この項が  $\text{mod } 2\pi$  で消えるためには

$$\frac{pn}{2} \in \mathbb{Z}$$

が必要である<sup>b</sup>.

**BF-理論**の節で行った議論と同様にこの理論を補助場  $f^{(2)}$  および  $U(1)$  ゲージ場  $\hat{a}^{(1)}$  を含む等価な形で述べることができる:

$$\begin{aligned} S[f^{(2)}, b^{(2)}, \hat{a}^{(1)}] &:= \frac{in}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} b^{(2)} \wedge f^{(2)} + \frac{ipn}{4\pi} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} b^{(2)} \wedge b^{(2)} + \frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} d\hat{a}^{(1)} \wedge f^{(2)} \\ &= \frac{i}{2\pi} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} f^{(2)} \wedge (d\hat{a}^{(1)} + nb^{(2)}) + \frac{ipn}{4\pi} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} b^{(2)} \wedge b^{(2)} \end{aligned}$$

ただし,  $b^{(2)}$  のゲージ変換  $b^{(2)} \mapsto b^{(2)} + d\lambda^{(1)}$  は  $f^{(2)}, \hat{a}^{(1)}$  にも同時に変換を引き起こさなくてはならない:

$$\begin{aligned} f^{(2)} &\mapsto f^{(2)} - p d\lambda^{(1)}, \\ \hat{a}^{(1)} &\mapsto \hat{a}^{(1)} - n\lambda^{(1)} \end{aligned}$$

$f^{(2)}, b^{(2)}$  に関する汎関数積分を実行することで

$$S[\hat{a}^{(1)}] = \frac{ip}{4\pi n} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} d\hat{a}^{(1)} \wedge d\hat{a}^{(1)} \quad (3.8.1)$$

とも等価である.

この理論の持つトポロジカル演算子を求めよう.  $p = 0$  のときは **BF-理論** のものと全く同じだが,  $p \neq 0$  のときは運動方程式  $da^{(1)} + pb^{(2)} = 0$  および  $d\hat{a}^{(1)} + nb^{(2)} = 0$  により

$$W(\mathcal{C}^{(2)}) := e^{i \int_{\mathcal{C}^{(2)}} b^{(2)}}$$

とおくと

$$\begin{aligned}\langle (W(\mathcal{C}^{(2)})^p) \rangle &= 1, \\ \langle (W(\mathcal{C}^{(2)})^N) \rangle &= 1\end{aligned}\tag{3.8.2}$$

がわかる. i.e.

$$\langle (W(\mathcal{C}^{(2)})^{\gcd(n,p)}) \rangle = 1$$

である. もう 1 つの Wilson line は, ゲージ不変性の要請から

$$\tilde{\mathcal{W}}(\mathcal{C}^{(1)}; \Sigma^{(2)}) := e^{i \int_{\mathcal{C}^{(1)}} a^{(1)}} e^{ip \int_{\Sigma^{(2)}} b^{(2)}}$$

とせざるを得ない. これは  $\pm^{(2)}$  に依存しているので genuine line operator でないが, (3.8.2) を使うと

$$\tilde{\mathcal{W}}(\mathcal{C}^{(1)}; \Sigma^{(2)})^N = e^{i \int_{\mathcal{C}^{(1)}} (Na^{(1)} - p\hat{a}^{(1)})}$$

がわかる. ここから,

$$\mathcal{W}(\mathcal{C}^{(1)}) := \tilde{\mathcal{W}}(\mathcal{C}^{(1)}; \Sigma^{(2)})^{N/\gcd(n,p)}$$

がもう一つの line operator であることがわかり,  $\mathbb{Z}_{\gcd(n,p)}$ -チャージが導出された.

---

<sup>a</sup>  $a^{(1)}, \lambda^{(1)}$  が共に U(1) ゲージ場であることから,  $p \in \mathbb{Z}$  でなくてはならない.

<sup>b</sup> この条件は  $\mathcal{M}^{(4)}$  がスピン多様体ならば  $p \in \mathbb{Z}$  と等価である.

### 3.8.2 中心対称性のゲージ化

(3+1)-次元の物質場を持たない SU( $n$ ) ゲージ理論をトポロジカルな  $\mathbb{Z}_n$  ゲージ理論【例 3.8.1】と結合させることにより, SU( $n$ )/ $\mathbb{Z}_n$  ゲージ理論が得られることを見よう.

今, (3+1)-次元の SU( $n$ ) 1-form ゲージ場を  $a$  と書く<sup>\*51</sup>. ここで, 天下りのだが U(1) 1-form ゲージ場  $\hat{a}^{(1)}$  を用いて

$$\tilde{a} := a + \frac{1}{n} \hat{a}^{(1)} \mathbb{1}_n$$

と書く. すると,  $a$  は  $\mathfrak{su}(n)$  に値をとることから

$$\mathrm{Tr} \tilde{a} = \mathrm{Tr} a + \hat{a}^{(1)} \in i\mathbb{R}$$

となり,  $\tilde{a}$  が  $\mathfrak{u}(n)$  に値をとるように見える. よって  $\tilde{a}$  を U( $n$ ) ゲージ場と見做することができる.

ここで, 理論に新たな U(1) 1-form ゲージ不変性  $\tilde{a} \mapsto \tilde{a} - \lambda^{(1)} \mathbb{1}_n$  を要請する. ただし  $\lambda^{(1)}$  は U(1) ゲージ場である. このゲージ変換は元々の SU( $n$ ) ゲージ場  $a$  には作用しないが, 新たに付け足した U(1) ゲージ

---

<sup>\*51</sup> ダイナミカルである.

場  $\hat{a}^{(1)}$  に関しては

$$\hat{a}^{(1)} \mapsto \hat{a}^{(1)} - n\lambda^{(1)} \quad (3.8.3)$$

のゲージ変換を引き起こす。変換 (3.8.3) に関する不変性を尊重するためには  $\hat{a}^{(1)}$  の運動項は許されないが、トポロジカル項

$$\frac{ip}{4\pi n} \int_{\mathcal{M}^{(4)}} \hat{a}^{(1)} \wedge \hat{a}^{(1)}$$

を付け足すことは依然として許されている。この項はまさにトポロジカルな  $\mathbb{Z}_n$  ゲージ理論 (3.8.1) である。

このようにして得られたゲージ理論の変換関数について考察する。 $\mathcal{M}^{(4)}$  の良い被覆  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  を 1 つ固定する。新たな  $U(1)$  ゲージ不変性の要請によって  $\tilde{a}$  のゲージ変換は変換関数  $\{g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow U(n)\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$  によるものと、変換関数  $\{\lambda_{\alpha\beta}^{(1)}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \Omega^1(U_\alpha \cap U_\beta, \mathfrak{u}(1))\}_{\alpha, \beta \in \Lambda}$  によるものが混ざった

$$\tilde{a}_\beta = g_{\beta\alpha}(\tilde{a}_\alpha - i \mathrm{d}g_{\beta\alpha})g_{\beta\alpha}^{-1} - \lambda_{\alpha\beta}^{(1)}$$

になる。注意すべきなのは、 $\lambda_{\alpha\beta}^{(1)}$  に対するゲージ変換  $\lambda_{\alpha\beta}^{(1)} \mapsto \lambda_{\alpha\beta}^{(1)} + \mathrm{d}h_{\alpha\beta}^{(0)}$  が  $g_{\beta\alpha}$  にも作用することである：

$$g_{\beta\alpha} \mapsto e^{-ih_{\alpha\beta}} g_{\beta\alpha} \quad (3.8.4)$$

ここで  $\lambda_{\alpha\beta}^{(1)}$  の Deligne-Beilinson コチェインとしてのゲージ変換 (i.e.  $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$  における整合性条件) は、 $\{f_{\alpha\beta\gamma}: U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma \rightarrow \Omega^0(U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma; \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})\}_{\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda}$  によって

$$\lambda_{\alpha\beta}^{(1)} + \lambda_{\beta\gamma}^{(1)} + \lambda_{\gamma\alpha}^{(1)} = \mathrm{d}f_{\alpha\beta\gamma}$$

となっているので、ゲージ変換  $\lambda_{\alpha\beta}^{(1)} \mapsto \lambda_{\alpha\beta}^{(1)} + \mathrm{d}h_{\alpha\beta}^{(0)}$  に際しては

$$f_{\alpha\beta\gamma} \mapsto f_{\alpha\beta\gamma} + h_{\alpha\beta} + h_{\beta\gamma} + h_{\gamma\alpha} \pmod{2\pi}$$

と言う変換を受ける。故に  $g_{\alpha\beta}$  に要請するコサイクル条件であって (3.8.4) を尊重するものは

$$g_{\alpha\beta}g_{\beta\gamma}g_{\gamma\alpha} = e^{-if_{\alpha\beta\gamma}} \mathbf{1}_n \in U(1) \quad (3.8.5)$$

だと考えられる [?, p.28]。一般化されたコサイクル条件 (3.8.5) の  $\det$  をとることにより

$$f_{\alpha\beta\gamma} + \frac{1}{n} (\log \det g_{\alpha\beta} + \log \det g_{\beta\gamma} + \log \det g_{\gamma\alpha}) =: \frac{2\pi m_{\alpha\beta\gamma}}{n} \in \frac{2\pi}{n} \mathbb{Z}$$

がわかる。 $f_{\alpha\beta\gamma}$  の満たすべきコサイクル条件は

$$f_{\alpha\beta\gamma} + f_{\beta\gamma\delta} + f_{\gamma\delta\alpha} + f_{\delta\alpha\beta} = 0 \pmod{2\pi}$$

であるから、

$$m_{\alpha\beta\gamma} + m_{\beta\gamma\delta} + m_{\gamma\delta\alpha} + m_{\delta\alpha\beta} = 0 \pmod{n}$$

がわかる。i.e.  $m := \{m_{\alpha\beta\gamma}\}_{\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda} \in \check{H}^2(\mathcal{M}^{(d)}; \mathbb{Z}_n)$  である。

### 3.8.3 有限部分群のゲージ化

中心対称性に関して議論する際、理論の持つ対称性  $G$  の有限な正規部分群  $A$  についてのみゲージ化するという操作が必要になった。ここでは有限部分群のゲージ化に関する一般論を述べる [?].