

## 第 1 章

# モノイダル圏・フュージョン圏・高次群

この章では標数 0 の体  $\mathbb{K}$  のみを考える.

### 1.1 加法圏

#### 定義 1.1: 加法圏・アーベル圏

圏  $\mathcal{C}$  が体  $\mathbb{K}$  上の**加法圏** (additive category) であるとは, 以下を充たすこと:

##### (add-1)

任意の Hom 集合  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  が可換群の構造をもち, かつ射の合成

$$\circ: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$$

が群演算に関して双加法的である.

##### (add-2)

**零対象**<sup>a</sup> (zero object)  $\mathbf{0} \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が存在し,  $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathbf{0}, X) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \mathbf{0}) = 0$  を充たす<sup>b</sup>.

##### (add-3)

有限の余積が常に存在する.

加法圏  $\mathcal{C}$  は,  $\forall X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に関して  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  が  $\mathbb{K}$ -ベクトル空間の構造を持ち, かつ合成  $\circ$  が  $\mathbb{K}$ -双線形写像でもあるとき,  **$\mathbb{K}$ -線形** ( $\mathbb{K}$ -linear) であると言われる.

<sup>a</sup> 始対象かつ終対象

<sup>b</sup> 最右辺は (add-1) の意味で零ベクトル空間.

加法圏  $\mathcal{C}$  は, 以下の条件を充たすとき**アーベル圏** (abelian category) と呼ばれる:

##### (Ab-1)

任意の射  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  が核  $\ker f: \text{Ker } f \longrightarrow X$  および余核  $\text{coker } f: Y \longrightarrow \text{Coker } f$  を持つ.

**(Ab-2)**

$\text{Ker } f = \mathbf{0}$  ならば  $f = \ker(\text{coker } f)$ , かつ  $\text{Coker } f = \mathbf{0}$  ならば  $f = \text{coker}(\ker f)$

**定義 1.2: 加法的関手・完全関手**

**加法圏**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  の間の関手  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  が**加法的** (additive) であるとは,  $\forall X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して定まる写像

$$F_{X,Y}: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y)), f \mapsto F(f)$$

が可換群の準同型であることを言う. 特に加法圏  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  が  **$\mathbb{K}$ -線形** で, かつ  $\forall X, Y \in \mathcal{C}$  に対して  $F_{X,Y}$  が  $\mathbb{K}$ -線型写像でもあるとき,  $F$  は  **$\mathbb{K}$ -線形** ( $\mathbb{K}$ -linear) であると言う.

**アーベル圏**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  の間の加法的関手  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  を与える.

- $F$  が**左完全** (left exact) であるとは,  $\mathcal{C}$  の任意の短完全列  $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$  に対して

$$0 \rightarrow F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{F(g)} F(Z)$$

が  $\mathcal{D}$  の完全列になること.

- $F$  が**右完全** (right exact) であるとは,  $\mathcal{C}$  の任意の短完全列  $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$  に対して

$$F(X) \xrightarrow{F(f)} F(Y) \xrightarrow{F(g)} F(Z) \rightarrow 0$$

が  $\mathcal{D}$  の完全列になること.

- $F$  が**完全** (exact) であるとは,  $F$  が右完全かつ左完全であること.

**【例 1.1.1】表現の圏**

$G$  を群とする. このとき

- $G$  の表現  $(\rho, V)$  を対象とする
- $G$ -同変な  $\mathbb{K}$ -線型写像  $(\rho, V) \xrightarrow{f} (\rho', V')$  を射とする

圏を  $\mathbf{Rep}(G)$  と書く.  $\mathbf{Rep}(G)$  は**アーベル圏**である.

### 定義 1.3: 単純・半単純

- アーベル圏  $\mathcal{C}$  の対象  $X \in \mathcal{C}$  が**単純** (simple) であるとは、任意のモノ射  $i: U \hookrightarrow X$  が 0 であるか同型射であることを言う。
- アーベル圏  $\mathcal{C}$  が**半単純** (semisimple) であるとは、 $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が単純対象の有限余積と同型であることを言う。i.e. 単純対象の族  $\{V_i \in \text{Ob}(\mathcal{C})\}_{i \in I}$  および有限個を除いて 0 であるような非負整数の族  $\{N_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}_{i \in I}$  が存在して

$$X \cong \bigoplus_{i \in I} N_i X_i$$

が成り立つこと。

### 定義 1.4: 有限性

アーベル圏  $\mathcal{C}$  とその対象  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を与える。

- $X$  が**有限長** (finite length) を持つとは、有限のフィルトレーション

$$0 = X_0 \subset X_1 \subset \cdots \subset X_{n-1} \subset X_n = X$$

であって  $X_i/X_{i-1} := \text{Coker}(X_{i-1} \hookrightarrow X_i)$  ( $\forall i$ ) が**単純対象**であるようなもの (**Jordan-Hölder 列**と言う) が存在することを言う。このときの  $n$  を  $X$  の**長さ** (length) と呼ぶ<sup>a</sup>。

以下、アーベル圏  $\mathcal{C}$  は  **$\mathbb{K}$ -線形**であるとする。

- $\mathcal{C}$  が**局所有限** (locally finite) であるとは、以下の 2 条件を充たすこと：
  - (IFin-1)  $\forall X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して、 $\mathbb{K}$ -ベクトル空間  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  が有限次元
  - (IFin-2)  $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が有限長を持つ。
- $\mathcal{C}$  が**有限** (finite) であるとは、以下の 4 条件を充たすこと：
  - (Fin-1)  $\forall X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して、 $\mathbb{K}$ -ベクトル空間  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  が有限次元
  - (Fin-2)  $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が有限長を持つ。
  - (Fin-3)  $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が射影的被覆<sup>b</sup>を持つ。
  - (Fin-4) 単純対象の同型類が有限個である。

<sup>a</sup> Jordan-Hölder の定理 [?, THEOREM 1.5.4, p.5] から、 $X$  の任意の Jordan-Hölder 列は存在すれば同一の長さを持つ。

<sup>b</sup>  $P \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が**射影的** (projective) であるとは、関手  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, -)$  が完全関手であることを言う。 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  の**射影的被覆** (projective cover) とは、射影的对象  $P_X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  とエビ射  $p_X: P_X \twoheadrightarrow X$  の組み  $(P_X, p_X)$  であって、任意の射影的对象  $P \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  およびエビ射  $p: P \twoheadrightarrow X$  に対してあるエビ射  $h: P \twoheadrightarrow P_X$  が存在して  $p_X \circ h = p$  を充たすようなもののこと。

## 1.2 モノイダル圏

これまで何回か登場したが、モノイダル圏についてまとめておく：

### 定義 1.5: モノイダル圏

モノイダル圏 (monoidal category) は、以下の 5 つのデータからなる：

- 圏  $\mathcal{C}$
- テンソル積 (tensor product) と呼ばれる関手  $\otimes: \mathcal{C} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$
- 単位対象 (unit object)  $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$
- associator と呼ばれる自然同値

$$\{a_{X,Y,Z}: (X \otimes Y) \otimes Z \xrightarrow{\cong} X \otimes (Y \otimes Z)\}_{X,Y,Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

- left/right unitors と呼ばれる自然同値

$$\begin{aligned} \{l_X: I \otimes X &\xrightarrow{\cong} X\}_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}, \\ \{r_X: X \otimes I &\xrightarrow{\cong} X\}_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})} \end{aligned}$$

これらは  $\forall X, Y, Z, W \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  について以下の 2 つの図式を可換にする：

(triangle diagram)

$$\begin{array}{ccc} (X \otimes I) \otimes Y & \xrightarrow{a_{X,I,Y}} & X \otimes (I \otimes Y) \\ & \searrow r_X \otimes \text{Id}_Y & \swarrow \text{Id}_X \otimes l_Y \\ & X \otimes Y & \end{array}$$

(pentagon diagram)

$$\begin{array}{ccccc} & & ((W \otimes X) \otimes Y) \otimes Z & & \\ & \swarrow a_{W \otimes X, Y, Z} & & \searrow a_{W, X, Y \otimes \text{Id}_Z} & \\ (W \otimes X) \otimes (Y \otimes Z) & & & & (W \otimes (X \otimes Y)) \otimes Z \\ & \searrow a_{W, X, Y \otimes Z} & & \downarrow a_{W, X \otimes Y, Z} & \\ & & W \otimes ((X \otimes Y) \otimes Z) & & \\ & \swarrow \text{Id}_Z \otimes a_{X, Y, Z} & & & \\ & W \otimes (X \otimes (Y \otimes Z)) & & & \end{array}$$

モノイダル圏  $\mathcal{C}$  が**厳密** (strict) であるとは、 $\forall X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して

$$\begin{aligned} (X \otimes Y) \otimes Z &= X \otimes (Y \otimes Z), \\ I \otimes X &= X, \quad X \otimes I = X \end{aligned}$$

が成り立ち、かつ  $a_{X,Y,Z}$ ,  $l_X$ ,  $r_X$  が恒等射であることを言う。

! 定義 1.5 で言うモノイダル圏を、**弱いモノイダル圏** (weak monoidal category) と呼ぶこともある。

### 【例 1.2.1】 $\mathbf{Cat}$ のモノイダル構造

$\mathbf{Cat}$  を小圏と関手が成す圏とする。このとき、関手

$$\times: \mathbf{Cat} \times \mathbf{Cat} \longrightarrow \mathbf{Cat}$$

を  $\text{Ob}(\mathcal{C} \times \mathcal{D}) := \text{Ob}(\mathcal{C}) \times \text{Ob}(\mathcal{D})$  により定めると、組み  $(\mathbf{Cat}, \times, I)$  は厳密なモノイダル圏になる。  
ただし  $I$  はただ 1 つの対象  $\bullet$  を持ち、 $\text{Hom}_I(\bullet, \bullet) = \{\text{Id}_\bullet\}$  とする圏である<sup>a</sup>

<sup>a</sup> これは  $\mathbf{Cat}$  の終対象でもある。

### 定義 1.6: モノイダル関手

2 つのモノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes_{\mathcal{C}}, I_{\mathcal{C}}, a^{\mathcal{C}}, l^{\mathcal{C}}, r^{\mathcal{C}})$ ,  $(\mathcal{D}, \otimes_{\mathcal{D}}, I_{\mathcal{D}}, a^{\mathcal{D}}, l^{\mathcal{D}}, r^{\mathcal{D}})$  の間の関手

$$F: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}$$

が**弱いモノイダル関手** (lax monoidal functor) であるとは、

- 射

$$\varepsilon: I_{\mathcal{D}} \longrightarrow F(I_{\mathcal{C}})$$

- 自然変換

$$\{\mu_{X,Y}: F(X) \otimes_{\mathcal{D}} F(Y) \longrightarrow F(X \otimes_{\mathcal{C}} Y)\}_{X,Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

があって、 $\forall X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して以下の図式が可換になること：

(associativity)

$$\begin{array}{ccc} (F(X) \otimes_{\mathcal{D}} F(Y)) \otimes_{\mathcal{D}} F(Z) & \xrightarrow{a_{F(X), F(Y), F(Z)}^{\mathcal{D}}} & F(X) \otimes_{\mathcal{D}} (F(Y) \otimes_{\mathcal{D}} F(Z)) \\ \mu_{X,Y} \otimes \text{Id}_{F(Z)} \downarrow & & \downarrow \text{Id}_{F(X)} \otimes \mu_{Y,Z} \\ F(X \otimes_{\mathcal{C}} Y) \otimes_{\mathcal{D}} F(Z) & & F(X) \otimes_{\mathcal{D}} F(Y \otimes_{\mathcal{C}} Z) \\ \mu_{X \otimes_{\mathcal{C}} Y, Z} \downarrow & & \downarrow \mu_{X,Y \otimes_{\mathcal{C}} Z} \\ F((X \otimes_{\mathcal{C}} Y) \otimes_{\mathcal{C}} Z) & \xrightarrow{F(a_{X,Y,Z}^{\mathcal{C}})} & F(X \otimes_{\mathcal{C}} (Y \otimes_{\mathcal{C}} Z)) \end{array}$$

(unitality)

$$\begin{array}{ccc}
I_{\mathcal{D}} \otimes_{\mathcal{D}} F(X) & \xrightarrow{\varepsilon \otimes \text{Id}_{F(X)}} & F(I_{\mathcal{C}}) \otimes_{\mathcal{D}} F(X) \\
\downarrow l_{F(X)}^{\mathcal{D}} & & \downarrow \mu_{I_{\mathcal{C}}, X} \\
F(X) & \xleftarrow{F(l_X^{\mathcal{C}})} & F(I_{\mathcal{C}} \otimes_{\mathcal{C}} X) \\
\\ 
F(X) \otimes_{\mathcal{D}} I_{\mathcal{D}} & \xrightarrow{\text{Id}_{F(X)} \otimes \varepsilon} & F(X) \otimes_{\mathcal{D}} F(I_{\mathcal{C}}) \\
\downarrow r_{F(X)}^{\mathcal{D}} & & \downarrow \mu_{X, I_{\mathcal{C}}} \\
F(X) & \xleftarrow{F(r_X^{\mathcal{C}})} & F(X \otimes_{\mathcal{C}} I_{\mathcal{C}})
\end{array}$$

- 弱いモノイダル関手  $F$  の  $\varepsilon$  と  $\mu_{X,Y}$  が全て同型射ならば,  $F$  は強いモノイダル関手 (strong monoidal functor) と呼ばれる.
- 弱いモノイダル関手  $F$  の  $\varepsilon$  と  $\mu_{X,Y}$  が全て恒等射ならば,  $F$  は厳密なモノイダル関手 (strict monoidal functor) と呼ばれる.

#### 定義 1.7: モノイダル自然変換

2つのモノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes_{\mathcal{C}}, I_{\mathcal{C}}, a^{\mathcal{C}}, l^{\mathcal{C}}, r^{\mathcal{C}})$ ,  $(\mathcal{D}, \otimes_{\mathcal{D}}, I_{\mathcal{D}}, a^{\mathcal{D}}, l^{\mathcal{D}}, r^{\mathcal{D}})$  の間の2つの弱いモノイダル関手  $(F_i: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, \varepsilon_i: I_{\mathcal{D}} \rightarrow F_i(I_{\mathcal{C}}), \{\mu_{iX,Y}: F_i(X) \otimes F_i(Y) \rightarrow F_i(X \otimes Y)\}_{X,Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})})$   $w/$   $i = 1, 2$  の間の自然変換

$$\begin{array}{ccc}
& F_1 & \\
& \downarrow \tau & \\
& F_2 & 
\end{array}
\begin{array}{c}
\mathcal{C} \quad \mathcal{D}
\end{array}$$

がモノイダル自然変換 (monoidal natural transformation) であるとは,  $\forall X, Y \in \mathcal{C}$  に対して以下の図式が可換になること:

(テンソル積の保存)

$$\begin{array}{ccc}
F_1(X) \otimes_{\mathcal{D}} F_1(Y) & \xrightarrow{\tau_X \otimes_{\mathcal{D}} \tau_Y} & F_2(X) \otimes_{\mathcal{D}} F_2(Y) \\
\downarrow \mu_{1X,Y} & & \downarrow \mu_{2X,Y} \\
F_1(X \otimes_{\mathcal{C}} Y) & \xrightarrow{\tau_{X \otimes_{\mathcal{C}} Y}} & F_2(X \otimes_{\mathcal{C}} Y)
\end{array}$$

(単位対象の保存)

$$\begin{array}{ccc}
& I_{\mathcal{D}} & \\
\varepsilon_1 \swarrow & & \searrow \varepsilon_2 \\
F_1(I_{\mathcal{C}}) & \xrightarrow{\tau_{I_{\mathcal{C}}}} & F_2(I_{\mathcal{C}})
\end{array}$$

### 1.2.1 rigid なモノイダル圏

#### 定義 1.8: 双対

モノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, I, a, l, r)$  およびその任意の対象  $X, X^* \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を与える.  $X^*$  が  $X$  の左双対 (left dual) であるとは,

- **coevaluation** と呼ばれる射

$$\text{coev}_X^L: I \longrightarrow X \otimes X^*$$

- **evaluation** と呼ばれる射

$$\text{ev}_X^L: X^* \otimes X \longrightarrow I$$

が存在して以下の図式を可換にすることを言う:

(zig-zag equations)

$$\begin{array}{ccc} I \otimes X & \xrightarrow{\text{coev}_X^L \otimes \text{Id}_X} & (X \otimes X^*) \otimes X \\ \downarrow r_X & & \downarrow a_{X, X^*, X} \\ & & X \otimes (X^* \otimes X) \\ & & \downarrow \text{Id}_X \otimes \text{ev}_X^L \\ X & \xleftarrow{r_X} & X \otimes I \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} X^* \otimes I & \xrightarrow{\text{Id}_{X^*} \otimes \text{coev}_X^L} & X^* \otimes (X \otimes X^*) \\ \downarrow l_{X^*} & & \downarrow a_{X^*, X, X^*}^{-1} \\ & & (X^* \otimes X) \otimes X^* \\ & & \downarrow \text{ev}_X^L \otimes \text{Id}_{X^*} \\ X^* & \xleftarrow{l_{X^*}} & I \otimes X^* \end{array}$$

モノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, I, a, l, r)$  およびその任意の対象  $X, {}^*X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を与える.  ${}^*X$  が  $X$  の右双対 (right dual) であるとは,

- 射

$$\text{coev}_X^R: I \longrightarrow {}^*X \otimes X$$

- 射

$$\text{ev}_X^R: X \otimes {}^*X \longrightarrow I$$

が存在して以下の図式を可換にすることを言う：

(zig-zag equations)

$$\begin{array}{ccc} X \otimes I & \xrightarrow{\text{Id}_X \otimes \text{coev}_X^R} & X \otimes ({}^*X \otimes X) \\ \downarrow l_X & & \downarrow a_{X, {}^*X, X}^{-1} \\ & & (X \otimes {}^*X) \otimes X \\ & & \downarrow \text{ev}_X^R \otimes \text{Id}_X \\ X & \xleftarrow{l_X} & I \otimes X \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} I \otimes {}^*X & \xrightarrow{\text{coev}_X^R \otimes \text{Id}_{{}^*X}} & ({}^*X \otimes X) \otimes {}^*X \\ \downarrow l_X^* & & \downarrow a_{{}^*X, X, {}^*X}^{-1} \\ & & {}^*X \otimes (X \otimes {}^*X) \\ & & \downarrow \text{Id}_{{}^*X} \otimes \text{ev}_X^R \\ {}^*X & \xleftarrow{r_X^*} & {}^*X \otimes I \end{array}$$

ストリング図式で書くときは


$$\text{coev}_X^L := \text{diagram of a cup with an arrow pointing down} \quad \text{ev}_X^L := \text{diagram of a cap with an arrow pointing down} \quad \text{coev}_X^R := \text{diagram of a cup with an arrow pointing up} \quad \text{ev}_X^R := \text{diagram of a cap with an arrow pointing up}$$

とする．ストリング図式において  $\text{coev}^L, \text{ev}^L$  に対する (zig-zag equations) は zzzz

$$\begin{array}{c} \text{vertical line with upward arrow} \\ \text{vertical line with downward arrow} \end{array} = \begin{array}{c} \text{zig-zag path with upward arrows} \\ \text{zig-zag path with downward arrows} \end{array}$$



$\text{coev}^R, \text{ev}^R$  に対する (zig-zag equations) は



と書ける.

### 補題 1.1: 双対の基本性質


モノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, I, a, l, r)$  およびその対象  $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を与える.

- (1)  $Y$  が  $X$  の左双対ならば,  $X$  は  $Y$  の右双対である.
- (2)  $Z$  が  $X$  の右双対ならば,  $X$  は  $Z$  の左双対である.
- (3)  $X$  が左・右双対を持つならば,  $*(X^*) \cong X \cong (*X)^*$  が成り立つ.

**証明** (1) 仮定より,  $\text{coev}_X^L: I \rightarrow X \otimes Y, \text{ev}_X^L: Y \otimes X \rightarrow I$  が存在して左双対の (zig-zag-equations) を満たす. よって  $\text{coev}_Y^R := \text{coev}_X^L, \text{ev}_Y^R := \text{ev}_X^L$  と定めれば, 組  $(Y, X, \text{coev}_Y^R, \text{ev}_Y^R)$  は右双対の (zig-zag-equations) を満たす.

(2) 仮定より,  $\text{coev}_X^R: I \rightarrow Z \otimes X, \text{ev}_X^R: X \otimes Z \rightarrow I$  が存在して右双対の (zig-zag-equations) を満たす. よって  $\text{coev}_Z^L := \text{coev}_X^R, \text{ev}_Z^L := \text{ev}_X^R$  と定めれば, 組  $(Z, X, \text{coev}_Z^L, \text{ev}_Z^L)$  は左双対の (zig-zag-equations) を満たす.

(3) 射  $\alpha: X \rightarrow *(X^*), \beta: *(X^*) \rightarrow X$  をそれぞれ



と定義すれば, (zig-zag-equations) により  $\alpha \circ \beta = \text{Id}_{X^*}, \beta \circ \alpha = \text{Id}_X$  が言える.  $(X^*)^*$  についても同様である. ■

### 定義 1.9: rigid なモノイダル圏

モノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, I, a, l, r)$  が rigid であるとは,  $\forall X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が左・右双対を持つことを言う.

rigid なモノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, I, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  において, 対応

$$(-)^*: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

を次のように構成する:

- $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対してその左双対  $X^* \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を対応づける.
- $f: X \longrightarrow Y$  に対して,

$$f^* := \begin{array}{c} \text{ev}_Y^L \\ \curvearrowright \\ Y \\ \bullet f \\ X \\ \curvearrowleft \\ Y^* \\ \text{coev}_X^L \end{array} \quad (1.2.1)$$

#### 補題 1.2: 関手性

- (1) 対応  $(-)^*: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$  は反変関手である.
- (2)  $\forall X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $(X \otimes Y)^* = Y^* \otimes X^*$  が成り立つ.

証明 (1) 任意の射  $f: X \longrightarrow Y, g: Y \longrightarrow Z$  をとる. (zig-zag-equations) により,

$$\begin{aligned} (g \circ f)^* &= \begin{array}{c} X^* \\ \bullet (g \circ f)^* \\ Z^* \end{array} = \begin{array}{c} \text{ev}_Z^L \\ \curvearrowright \\ Z \\ \bullet g \\ Y \\ \bullet f \\ X \\ \curvearrowleft \\ Y^* \\ \text{coev}_X^L \end{array} = \begin{array}{c} \text{ev}_Z^L \\ \curvearrowright \\ Z \\ \bullet g \\ \curvearrowleft \\ Y \\ \bullet f \\ X \\ \curvearrowleft \\ Y^* \\ \text{coev}_X^L \end{array} \\ &= \begin{array}{c} \text{ev}_Z^L \\ \curvearrowright \\ Z \\ \bullet g \\ \curvearrowleft \\ Y \\ \bullet f \\ X \\ \curvearrowleft \\ Y^* \\ \text{coev}_X^L \end{array} = \begin{array}{c} X^* \\ \bullet f^* \\ Y^* \\ \bullet g^* \\ Z^* \end{array} \end{aligned}$$

(2)  $X \otimes Y$  に関する **coevaluation, evaluation** をそれぞれ

$$\begin{aligned} \text{coev}_{X \otimes Y}^L: I &\xrightarrow{\text{coev}_X^L} X \otimes X^* \xrightarrow{l_X^{-1}} (X \otimes I) \otimes X^* \xrightarrow{(\text{Id}_X \otimes \text{coev}_Y^L) \otimes \text{Id}_{X^*}} (X \otimes (Y \otimes Y^*)) \otimes X^* \\ &\xrightarrow{a} (X \otimes Y) \otimes (Y^* \otimes X^*) \\ \text{ev}_{X \otimes Y}^L: (Y^* \otimes X^*) \otimes (X \otimes Y) &\xrightarrow{a} (Y^* \otimes (X^* \otimes X)) \otimes Y \xrightarrow{(\text{Id}_{Y^*} \otimes \text{ev}_X^L) \otimes \text{Id}_Y} (Y^* \otimes I) \otimes Y \\ &\xrightarrow{l_{Y^*}} Y^* \otimes Y \xrightarrow{\text{ev}_Y^L} I \end{aligned}$$

で定義し, 組  $(X \otimes Y, Y^* \otimes X^*, \text{coev}_{X \otimes Y}^L, \text{ev}_{X \otimes Y}^L)$  が **(zig-zag-equations)** を満たすことを示せば良い. スtring図式で書くと

$$\begin{aligned} X \otimes Y \quad Y^* \otimes X^* &\xrightarrow{\text{coev}_{X \otimes Y}^L} I \\ &:= \text{String diagram with 4 wires: } X, Y, Y^*, X^* \text{ and a cup} \\ Y^* \otimes X^* \quad X \otimes Y &\xrightarrow{\text{ev}_{X \otimes Y}^L} I \\ &:= \text{String diagram with 4 wires: } X, Y, Y^*, X^* \text{ and a cap} \end{aligned}$$

なので明らか. ■

全く同様にして, 反変関手

$$^*(-): \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

を作ることができる.

### 【例 1.2.2】 双対関手

補題 1.2 より, **rigid なモノイダル圏**  $(\mathcal{C}, \otimes, I, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  において関手

$$\begin{aligned} (-)^{**}: \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C} \\ **(-): \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C} \end{aligned}$$

は**モノイダル関手**である.

### 補題 1.3: rigidity isomorphism

rigid なモノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, I, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  に対し、以下が成り立つ：

(1)  $\forall X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して自然な同型

$$\alpha_{X,Y,Z} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X \otimes Y, Z) \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z \otimes Y^*)$$

$$\beta_{Y,X,Z} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y^* \otimes X, Z) \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y \otimes Z)$$

が存在する。


(2)  $\forall X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して自然な同型

$$\gamma_{X,Y,Z} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X \otimes {}^*Y, Z) \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z \otimes Y)$$

$$\gamma_{Y,X,Z} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y \otimes X, Z) \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, {}^*Y \otimes Z)$$

が存在する。

証明 (1) 最初の同型は



である。他も同様。 ■

### 1.2.2 組紐付きモノイダル圏

### 定義 1.10: 組紐付きモノイダル圏

組紐付きモノイダル圏 (braided monoidal category) とは, 以下の 2 つからなる:

- モノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, I, a, l, r)$
- 組紐 (braiding) と呼ばれる自然同型

$$\{b_{X,Y}: X \otimes Y \xrightarrow{\cong} Y \otimes X\}_{X,Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

これらは  $\forall X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  について以下の図式を可換にする:

(hexagon diagrams)

$$\begin{array}{ccccc} X \otimes (Y \otimes Z) & \xrightarrow{a_{X,Y,Z}^{-1}} & (X \otimes Y) \otimes Z & \xrightarrow{b_{X,Y} \otimes \text{Id}_Z} & (Y \otimes X) \otimes Z \\ \downarrow b_{X,Y \otimes Z} & & & & \downarrow a_{Y,X,Z} \\ (Y \otimes Z) \otimes X & \xleftarrow{a_{Y,Z,X}^{-1}} & Y \otimes (Z \otimes X) & \xleftarrow{\text{Id}_X \otimes b_{X,Z}} & Y \otimes (X \otimes Z) \\ & & & & \\ (X \otimes Y) \otimes Z & \xrightarrow{a_{X,Y,Z}} & X \otimes (Y \otimes Z) & \xrightarrow{\text{Id}_X \otimes b_{Y,Z}} & X \otimes (Z \otimes Y) \\ \downarrow b_{X \otimes Y, Z} & & & & \downarrow a_{X,Z,Y}^{-1} \\ Z \otimes (X \otimes Y) & \xleftarrow{a_{Z,X,Y}} & (Z \otimes X) \otimes Y & \xleftarrow{b_{X,Z} \otimes \text{Id}_Y} & (X \otimes Z) \otimes Y \end{array}$$

組紐付きモノイダル圏  $\mathcal{C}$  であって,  $\mathcal{C}$  の組紐が  $b_{X,Y} = b_{Y,X}^{-1}$  を満たすもののことを対称モノイダル圏 (symmetric monoidal category) と呼ぶ.

## 1.3 テンソル圏・フュージョン圏



これまではモノイダル圏の対象を英大文字  $X, Y, Z, \dots$  で, 単位対象を  $I$  と書いてきたが, 以下では対象を英小文字  $x, y, z, \dots$  で, 単位対象を  $1$  と書くことにする.

### 定義 1.11: 環圏

圏  $\mathcal{C}$  が多重環圏 (multiring category) であるとは, 以下の条件を満たすこと:

- (mR-1)  $\mathcal{C}$  は局所有有限な  $\mathbb{K}$ -線形アーベル圏
- (mR-2)  $\mathcal{C}$  はモノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$
- (mR-3) 関手  $\otimes: \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$  が  $\mathbb{K}$ -線形かつ双完全

圏  $\mathcal{C}$  が環圏 (ring category) であるとは, 以下の条件を満たすこと:

- (R-1)  $\mathcal{C}$  は多重環圏
- (R-2)  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(1, 1) \cong \mathbb{K}$

### 定義 1.12: テンソル圏・フュージョン圏

圏  $\mathcal{C}$  が多重テンソル圏 (multitensor category) であるとは、以下の条件を満たすこと：

(mT-1)  $\mathcal{C}$  は局所有限な  $\mathbb{K}$ -線形アーベル圏

(mT-2)  $\mathcal{C}$  は rigid なモノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$

(mT-3) 関手  $\otimes: \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$  が  $\forall x, y, z, w \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して定める写像  $\otimes_{x,y,z,w}: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(z, w) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x \otimes z, y \otimes w)$  が  $\mathbb{K}$ -双線形

圏  $\mathcal{C}$  がテンソル圏 (tensor category) であるとは、以下の条件を満たすこと：

(T-1)  $\mathcal{C}$  は多重テンソル圏

(T-2)  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(1, 1) \cong \mathbb{K}$

圏  $\mathcal{C}$  が多重フュージョン圏 (multifusion category) であるとは、以下の条件を満たすこと：

(mFus-1)  $\mathcal{C}$  は多重テンソル圏

(mFus-2)  $\mathcal{C}$  は  $\mathbb{K}$ -線形アーベル圏として有限かつ半単純

圏  $\mathcal{C}$  がフュージョン圏 (fusion category) であるとは、以下の条件を満たすこと：

(Fus-1)  $\mathcal{C}$  はテンソル圏

(Fus-2)  $\mathcal{C}$  は  $\mathbb{K}$ -線形アーベル圏として有限かつ半単純

### 命題 1.1: 多重テンソル圏のテンソル積は双完全

多重テンソル圏  $\mathcal{C}$  の関手  $\otimes: \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$  は双完全である。

証明 [?, PROPOSITION 4.2.1., p.66] ■

命題 1.1 より,

$$(\text{多重}) \text{ テンソル圏} \implies (\text{多重}) \text{ 環圏}$$

が言える。

【例 1.3.1】 圏  $\mathcal{C}_G$  と  $\text{Vec}_G$

$G$  を群とする。厳密なモノイダル圏  $\mathcal{C}_G$  を,

- $\text{Ob}(\mathcal{C}_G) := G$
- $\forall g_1, g_2 \in G$  に対して

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_G}(g_1, g_2) := \begin{cases} \text{U}(1), & g_1 = g_2 \\ \emptyset, & g_1 \neq g_2 \end{cases}$$

- $g_1 \otimes g_2 := g_1 g_2$  かつ,  $g_i \xrightarrow{\forall \theta_i} g_i$  に対して  $\theta_1 \otimes \theta_2 := \theta_1 \theta_2$
- $1 := 1_G$

- $a_{g_1, g_2, g_3} := 1, l_g := 1, r_g := 1$

で定義する.

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$  とする. 厳密なモノイダル圏  $\mathbf{Vec}_G$  を,

- $G$ -graded な  $\mathbb{K}$ -ベクトル空間

$$V = \bigoplus_{g \in G} V_g$$

を対象とする.

- grading を保存する  $\mathbb{K}$ -線型変換

$$f: \bigoplus_{g \in G} V_g \longrightarrow \bigoplus_{g \in G} W_g \quad \text{s.t.} \quad \forall g \in G, f(V_g) \subset W_g$$

を射とする.

- テンソル積  $\otimes: \mathbf{Vec}_G \times \mathbf{Vec}_G \longrightarrow \mathbf{Vec}_G$  は,

$$V \otimes W := \bigoplus_{g \in G} \left( \bigoplus_{\substack{x, y \in G, \\ xy = g}} V_x \otimes_{\mathbb{K}} W_y \right)$$

と定義する.

- 単位対象は  $1 := \mathbb{K}$  とする<sup>a</sup>
- $a_{g_1, g_2, g_3} := 1, l_g := 1, r_g := 1$

によって定義する.  $G$  が有限群ならば  $\mathcal{C}_G$  はフュージョン圏である.

---

<sup>a</sup>  $1_G \in G$  成分以外が全て 0

### 【例 1.3.2】 圏 $\mathcal{C}_G^\alpha$ と $\mathbf{Vec}_G^\alpha$

$G$  を群とする. 【例 1.3.1】 の associator と unitors を非自明にしてみよう. 今  $\alpha \in Z_{\text{Grp}}^3(G; \text{U}(1))$  を 1 つ固定する<sup>a</sup>.

モノイダル圏  $\mathcal{C}_G^\alpha$  を,

$$\begin{aligned} a_{g_1, g_2, g_3} &:= \alpha(g_1, g_2, g_3), \\ l_g &:= \alpha(1, 1, g)^{-1}, \\ r_g &:= \alpha(g, 1, 1) \end{aligned}$$

とおくことにより定義する<sup>b</sup>. 実際, コサイクル条件および  $U(1)$  の可換性により

$$\begin{aligned}
& (\text{Id}_{g_4} \otimes a_{g_1, g_2, g_3}) \circ a_{g_4, g_1 \otimes g_2, g_3} \circ (a_{g_4, g_1, g_2} \otimes \text{Id}_{g_3}) \\
&= \alpha(g_1, g_2, g_3) \alpha(g_4, g_1 g_2, g_3) \alpha(g_4, g_1, g_2) \\
&= \alpha(g_4 g_1, g_2, g_3) \alpha(g_4, g_1, g_2 g_3) \\
&= \alpha(g_4, g_1, g_2 g_3) \alpha(g_4 g_1, g_2, g_3) \\
&= a_{g_4, g_1, g_2 g_3} \circ a_{g_4 \otimes g_1, g_2, g_3}
\end{aligned}$$

の通りに (pentagon identity) が成り立ち,

$$\begin{aligned}
(\text{Id}_{g_1} \otimes l_{g_2}) \circ a_{g_1, 1, g_2} &= \frac{\alpha(g_1, 1, g_2)}{\alpha(1, 1, g_2)} \\
&= \frac{\alpha(g_1, 1, 1) \alpha(g_1, 1, g_2) \alpha(1, 1, g_2)}{\alpha(g_1, 1, g_2) \alpha(1, 1, g_2)} \\
&= \alpha(g_1, 1, 1) \\
&= r_{g_1}
\end{aligned}$$

の通りに (triangle identity) が成り立つ. もし  $l_g = r_g = \text{Id}_g$  にしたければ

$$\forall g, h \in G, \alpha(g, 1, h) = 1_G$$

を充たす  $\alpha \in Z_{\text{Grp}}^3(G; U(1))$  をとることが必要十分である (正規化条件).

圏  $\mathbf{Vec}_G^\alpha$  は,  $\alpha \in Z_{\text{Grp}}^3(G; \mathbb{K}^\times)$  に対して  $\mathcal{C}_G^\alpha$  の構成を線形に拡張することで得られる.  $G$  が有限群ならば  $\mathbf{Vec}_G^\alpha$  はフュージョン圏である.

<sup>a</sup> i.e. 3-コサイクル

<sup>b</sup> 他のデータは【例 1.3.1】と全く同じである

### 定義 1.13: テンソル関手・ファイバー関手

$\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を多重環圏とする. 関手  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  を与える.  $F$  がテンソル関手 (tensor functor) であるとは, 以下を充たすこと:

(TF-1)  $F$  は  $\mathbb{K}$ -線形

(TF-2)  $F$  は強いモノイダル関手

(TF-3)  $F$  は完全かつ忠実<sup>a</sup>

特に  $\mathcal{D} = \mathbf{Vec}_{\mathbb{K}}$  のとき, テンソル関手  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Vec}_{\mathbb{K}}$  はファイバー関手 (fiber functor) と呼ばれる.

<sup>a</sup> この条件は [?, DEFINITION 4.2.5., p.66] に合わせて付けたものであり, テンソル関手と言った際には必要とされないことも多い.



【例 1.3.3】圏  $\mathbf{Vec}_G^\alpha$  のテンソル関手

$G_1, G_2$  を群,  $\omega_i \in Z_{\text{Grp}}^3(G_i; \mathbf{U}(1))$  を 3-コサイクルとする. テンソル関手

$$F: \mathcal{C}_{G_1}^{\alpha_1} \longrightarrow \mathcal{C}_{G_2}^{\alpha_2}$$

とはどのようなものだろうか.

まず  $F$  は強いモノイダル関手であるから, 対象の対応について群準同型

$$f: G_1 \longrightarrow G_2$$

このとき強いモノイダル関手の持つ自然変換とは, ある  $\mu \in C_{\text{Grp}}^2(G_1; \mathbf{U}(1))$  を用いて

$$\mu_{g_1, g_2} := \mu(g_1, g_2) \text{Id}_{f(g_1 g_2)}: f(g_1) f(g_2) \xrightarrow{\cong} f(g_1 g_2) \quad \forall g_1, g_2 \in G_1$$

と書けるが, (associativity) から

$$\mu(g_1, g_2 g_3) \mu(g_2, g_3) \alpha_2(f(g_1), f(g_2), f(g_3)) = \alpha_1(g_1, g_2, g_3) \mu(g_1 g_2, g_3) \mu(g_1, g_2)$$

でなくてはならない. i.e.

$$\alpha_1 = f^* \alpha_2 \cdot \delta \mu \quad (1.3.1)$$

である. 逆に群準同型  $f: G_1 \longrightarrow G_2$  および  $\mu \in C_{\text{Grp}}^3(G_1; \mathbf{U}(1))$  の組  $(f, \mu)$  であって (1.3.1) を満たすものが与えられると, これらを素材にしてテンソル関手

$$F: \mathcal{C}_{G_1}^{\alpha_1} \longrightarrow \mathcal{C}_{G_2}^{\alpha_2}$$

を構成することができる. このような関手  $F$  が圏同値になる必要十分条件は  $f$  が群の同型写像になることである.

【例 1.3.4】圏  $\mathbf{Vec}_G^\alpha$  のモノイダル自然変換

【例 1.3.3】の構成で得られるテンソル関手を  $F_{f, \mu}$  と書く. このとき, モノイダル自然変換

$$\begin{array}{ccc} & F_{f, \mu} & \\ \text{Vec}_{G_1}^{\alpha_1} & \xrightarrow{\quad} & \text{Vec}_{G_2}^{\alpha_2} \\ & F_{f', \mu'} & \end{array} \quad \tau$$

を同定しよう. まず自然変換と言うからには  $\forall g \in G_1$  に対して

$$\tau_g := \tau(g) \text{Id}_{f(g)}: f(g) \longrightarrow f'(g)$$

を定めないとはいけない. ただし  $\tau \in C_{\text{Grp}}^1(G_1; \mathbf{U}(1))$  である. ところが, 【例 1.3.2】より  $\text{Vec}_{G_2}^{\alpha_2}$  の射は  $f(g) = f'(g)$ , i.e.  $f = f'$  でないと自然変換が存在しない.



スtring図式で書くと次のようになる<sup>b</sup> :

---

<sup>a</sup>  $\text{ev}_{V*}^L = \text{ev}_{V**}^R$  を使った.  
<sup>b</sup>  $\text{ev}_{**x}^R = \text{ev}_{*x}^L$  を使った.

#### 定義 1.15: 旋回構造

rigid なモノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  を与える.  $\mathcal{C}$  の巡回構造 (pivotal structure) とは, モノイダル自然同型

のこと. ただし  $(-)^{**}$  は【例 1.2.2】で構成したモノイダル関手である.

## 補題 1.4: 巡回構造と双対

rigid なモノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  の巡回構造  $p$  を与える. このとき  $\forall x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して以下が成り立つ:

- (1)  $p_{x^*} = (p_x)^{* - 1}$
- (2)  $p_{x^{**}} = (p_x)^{**}$

証明  $\forall x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を 1 つ固定する.

- (1)
- (2)  $p$  の自然性より

$$(p_x)^{**} \circ p_x = p_{x^{**}} \circ p_x$$

が言える.  $p_x: x \longrightarrow x^{**}$  は同型射だから示された.

非常に重要な予想がある [?, Conjecture 2.8., p.5] :

**予想 1.1: フュージョン圏は pivotal**

任意のフュージョン圏は旋回構造を持つ。

本資料ではこの予想を認める。

**定義 1.16: 量子次元**

旋回構造  $p$  を持つ rigid なモノイダル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  を与える。  $\mathcal{C}$  の対象  $x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  の,  $p$  に関する量子次元 (quantum dimension) を以下で定義する：

$$\dim_p(x) := \text{Tr}^L(p_x) := \begin{array}{c} \text{---} x^{**} \text{---} \\ \text{---} p_x \text{---} \\ \text{---} x \text{---} \end{array} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(1, 1)$$

補題 1.1-(2) の証明より

$$\begin{aligned} \left( \begin{array}{c} x \quad x^* \\ \text{coev}_x^L \end{array} \right)^* &= \begin{array}{c} \text{---} x^{**} \text{---} \\ \text{---} x^* \text{---} \end{array} \\ &= \begin{array}{c} \text{---} x^{**} \text{---} \\ \text{---} x^* \text{---} \end{array} \\ &= \begin{array}{c} \text{---} x^{**} \text{---} \\ \text{---} x^* \text{---} \end{array} \\ &= \begin{array}{c} \text{---} x^{**} \text{---} \\ \text{---} x^* \text{---} \end{array} \\ &= \begin{array}{c} \text{---} x^{**} \text{---} \\ \text{---} x^* \text{---} \end{array} \end{aligned}$$

であるから,  $(-)^{**}$  の関手性および補題 1.4(2) により

$$\dim_p(x^{**}) = \begin{array}{c} \text{---} x^{****} \text{---} \\ \text{---} p_{x^{**}} \text{---} \\ \text{---} x^{**} \text{---} \end{array} = \left( \begin{array}{c} \text{---} x^{**} \text{---} \\ \text{---} p_x \text{---} \\ \text{---} x \text{---} \end{array} \right)^{**} = \dim_p(x)$$

が言える。ただし,  $(-)^*$  の定義 (1.2.1) より  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(1, 1)$  に対して<sup>\*1</sup>  $f^* = (l_1 \otimes \text{Id}_1) \circ (\text{Id}_1 \otimes f \otimes \text{Id}_1) \circ (\text{Id}_1 \otimes l_1^{-1}) = f$  が成り立つことを使った。

<sup>\*1</sup>  $1^* = *1 = 1$  である。

### 定義 1.17: 球狀圈

テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \mathrm{ev}^L, \mathrm{coev}^L, \mathrm{ev}^R, \mathrm{coev}^R)$  の旋回構造  $p$  が球状 (spherical) であるとは、  
 $\forall x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$  に対して

$$\mathrm{Tr}^{\mathrm{L}}(p_x) = \begin{array}{c} \text{Diagram 1: A box labeled } p_x \text{ with an incoming arrow from the bottom labeled } x \text{ and an outgoing arrow to the top labeled } x^{**}. \end{array} = \begin{array}{c} \text{Diagram 2: A box labeled } p_x \text{ with an incoming arrow from the bottom labeled } x \text{ and an outgoing arrow to the top labeled } {}^*x. \end{array} = \mathrm{Tr}^{\mathrm{R}}(p_x)$$

が成り立つことを言う.

### 1.3.2 Deligne のテンソル積

### 定義 1.18: Deligne のテンソル積

$\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を局所有限な  $\mathbb{K}$ -線形アーベル圏とする. Deligne のテンソル積 (Deligne's tensor product) とは, 以下の性質をみたす  $\mathbb{K}$ -線形アーベル圏  $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$  と双右完全関手  $\boxtimes: \mathcal{C} \times \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$  の組み  $(\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}, \boxtimes)$  のこと:

(普遍性)

任意の双右完全関手  $F: \mathcal{C} \times \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{A}$  に対し, ある双右完全関手  $\bar{F}: \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{A}$  が一意的に存在して  $\bar{F} \circ \boxtimes = F$  を充たす.

## 命題 1.2: Deligne のテンソル積の基本性質

- (1) Deligne のテンソル積は存在し、それ自身が局所有限な  $\mathbb{K}$ -線形アーベル圏になる。
- (2) 関手  $\boxtimes: \mathcal{C} \times \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$  は双完全であり、

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x_1, y_1) \otimes_{\mathbb{K}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(x_2, y_2) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}}(x_1 \boxtimes x_2, y_1 \boxtimes y_2)$$

を充たす.

- (3)  $C, D$  が (多重) 環圏/(多重) テンソル圏ならば  $C \boxtimes D$  は (多重) 環圏/(多重) テンソル圏である.

**証明** (1) [?, PROPOSITION 1.11.2., p.15]

- (2) [?, PROPOSITION 1.11.2., p.15]  
 (3) [?, PROPOSITION 4.6.1., p.73]



## 1.4 加群圏

### 1.4.1 左/右加群圏

#### 定義 1.19: 左/右加群圏

$(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r)$  をモノイダル圏とする。左  $\mathcal{C}$ -加群圏 (left  $\mathcal{C}$ -module category)  $\mathcal{M}$  は、以下のデータからなる：

- 圏  $\mathcal{M}$
- 左加群積 (left module product) と呼ばれる関手<sup>a</sup>  $\blacktriangleright: \mathcal{C} \times \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$
- left actor と呼ばれる自然同型  $\{\alpha_{x,y,m}: (x \otimes y) \blacktriangleright m \longrightarrow x \blacktriangleright (y \blacktriangleright m)\}_{x,y \in \text{Ob}(\mathcal{C}), m \in \text{Ob}(\mathcal{M})}$
- left unitor と呼ばれる自然同型  $\{\lambda_m: 1 \blacktriangleright m \longrightarrow m\}_{m \in \text{Ob}(\mathcal{M})}$

これらは以下の条件を充たさねばならない：

(IMod-1)  $\forall x, y, z \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall m \in \text{Ob}(\mathcal{M})$  に対して以下の図式を可換にする：

$$\begin{array}{ccc}
 ((x \otimes y) \otimes z) \blacktriangleright m & & (x \otimes y) \blacktriangleright (z \blacktriangleright m) \\
 \swarrow a_{x,y,z} \blacktriangleright \text{Id}_m & & \searrow \alpha_{x \otimes y, z, m} \\
 (x \otimes (y \otimes z)) \blacktriangleright m & & \\
 \searrow \alpha_{x, y \otimes z, m} & & \downarrow \alpha_{x, y, z \blacktriangleright m} \\
 & x \blacktriangleright ((y \otimes z) \blacktriangleright m) & x \blacktriangleright (y \blacktriangleright (z \blacktriangleright m)) \\
 & \nearrow \text{Id}_x \blacktriangleright \alpha_{y, z, m} &
 \end{array}$$

(IMod-2)  $\forall x \in \mathcal{C}, \forall m \in \mathcal{M}$  に対して以下の図式を可換にする：

$$\begin{array}{ccc}
 (x \otimes 1) \blacktriangleright m & \xrightarrow{\alpha_{x, 1, m}} & x \blacktriangleright (1 \blacktriangleright m) \\
 \searrow r_x \blacktriangleright \text{Id}_m & & \swarrow \text{Id}_x \blacktriangleright \lambda_m \\
 & x \blacktriangleright m &
 \end{array}$$

<sup>a</sup> 記号として  $\circ$  を使うこともある (参考：<https://ncatlab.org/nlab/show/action+of+a+monoidal+category>)。

$(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r)$  をモノイダル圏とする。右  $\mathcal{C}$ -加群圏  $\mathcal{M}$  は、以下のデータからなる：

- 圏  $\mathcal{M}$

- 右加群積 (left module product) と呼ばれる関手<sup>a</sup>  $\blacktriangleright: \mathcal{C} \times \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$
- right actor と呼ばれる自然同型  $\{\beta_{m,x,y}: m \blacktriangleleft (x \otimes y) \longrightarrow (m \blacktriangleleft x) \blacktriangleleft y\}_{x,y \in \text{Ob}(\mathcal{C}), m \in \text{Ob}(\mathcal{M})}$
- right unitor と呼ばれる自然同型  $\{\rho_m: m \blacktriangleleft 1 \longrightarrow m\}_{m \in \text{Ob}(\mathcal{M})}$

これらは以下の条件を充たさねばならない：

**(rMod-1)**  $\forall x, y, z \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall m \in \text{Ob}(\mathcal{M})$  に対して以下の図式を可換にする：

**(rMod-2)**  $\forall x \in \mathcal{C}, \forall m \in \mathcal{M}$  に対して以下の図式を可換にする：

$$\begin{array}{ccc}
 m \blacktriangleleft (1 \otimes x) & \xrightarrow{\beta_{m,1,x}} & (m \blacktriangleleft 1) \blacktriangleleft x \\
 \searrow \text{Id}_m \blacktriangleleft l_x & & \swarrow \rho_m \blacktriangleleft \text{Id}_x \\
 & m \blacktriangleleft x &
 \end{array}$$

<sup>a</sup> 記号として  $\odot$  を使うこともある (参考：<https://ncatlab.org/nlab/show/action+of+a+monoidal+category>).

$\mathcal{C}$  が多重テンソル圏である場合は、左/右加群積が射について  $\mathbb{K}$ -双線形であること、および両方の引数について完全関手になっていることを要請する<sup>\*2</sup>.

#### 定義 1.20: 加群関手

$(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r)$  をモノイダル圏,  $(\mathcal{M}_i, \blacktriangleright_i, \alpha_i, \lambda_i)$   $w/ i = 1, 2$  を左  $\mathcal{C}$ -加群圏とする. 左  $\mathcal{C}$ -加群関手 (left  $\mathcal{C}$ -module functor) は、以下のデータからなる：

- 関手  $F: \mathcal{M}_1 \longrightarrow \mathcal{M}_2$
- 自然同型  $\{s_{x,m}: F(x \blacktriangleright_1 m) \longrightarrow x \blacktriangleright_2 F(m)\}_{x \in \text{Ob}(\mathcal{C}), m \in \text{Ob}(\mathcal{M}_1)}$

これらは以下の条件を充たさねばならない：

**(pentagon identity)**  $\forall x, y \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall m \in \text{Ob}(\mathcal{M}_1)$  に対して以下の図式を可換にする：

<sup>\*2</sup> 実際には、第 1/第 2 引数について完全になっていさえいれれば残りの引数についても自動的に完全になる [?, EXERCISE 7.3.2, p.135]

$$\begin{array}{ccccc}
& & F((x \otimes y) \blacktriangleright_1 m) & & \\
& \swarrow F(\alpha_{1x,y,m}) & \searrow s_{x \otimes y, m} & & \\
& F(x \blacktriangleright_1 (y \blacktriangleright_1 m)) & & (x \otimes y) \blacktriangleright_2 F(m) & \\
& \searrow s_{x,y \blacktriangleright_1 m} & & \downarrow \alpha_{2x,y,F(m)} & \\
& & x \blacktriangleright_2 (y \blacktriangleright_2 F(m)) & & \\
& & \uparrow \text{Id}_x \blacktriangleright_2 s_{y,m} & & \\
& & x \blacktriangleright_2 F(y \blacktriangleright_1 m) & & 
\end{array}$$

(triangle identity)  $\forall m \in \mathcal{M}_1$  に対して以下の図式を可換にする：

$$\begin{array}{ccc}
F(1 \blacktriangleright_1 m) & \xrightarrow{s_{1,m}} & 1 \otimes_2 F(m) \\
& \searrow F(\lambda_{1m}) & \swarrow \lambda_{2F(m)} \\
& F(m) & 
\end{array}$$

### 定義 1.21: 加群圏の自然変換

$(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r)$  をモノイダル圏,  $(\mathcal{M}_i, \blacktriangleright_i, \alpha_i, \lambda_i) \text{ w/ } i = 1, 2$  を左  $\mathcal{C}$ -加群圏,  $(F_i: \mathcal{M}_1 \rightarrow \mathcal{M}_2, s_i) \text{ w/ } i = 1, 2$  を  $\mathcal{C}$ -加群関手とする。このとき、自然変換

$$\begin{array}{ccc}
& F_1 & \\
\mathcal{M}_1 & \xrightarrow{\quad \tau \quad} & \mathcal{M}_2 \\
& F_2 & 
\end{array}$$

が  $\mathcal{C}$ -加群圏の自然変換であるとは,  $\forall x \in \mathcal{C}, \forall m \in \mathcal{M}_1$  に対して以下の図式が可換になること：

$$\begin{array}{ccc}
F_1(x \blacktriangleright_1 m) & \xrightarrow{s_{1x,m}} & x \blacktriangleright_2 F_1(m) \\
\downarrow \tau_{x \blacktriangleright_1 m} & & \downarrow \tau_x \blacktriangleright_2 \text{Id}_m \\
F_2(x \blacktriangleright_1 m) & \xrightarrow{s_{2x,m}} & x \blacktriangleright_2 F_2(m)
\end{array}$$

(action の保存)

### 定義 1.22: 加群圏の完全性

十分射影的対象を持つ多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  を与える。

局所有限な左  $\mathcal{C}$ -加群圏  $(\mathcal{M}, \blacktriangleright, \alpha, \lambda)$  が完全 (exact) であるとは, 任意の射影的対象  $p \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  および任意の対象  $m \in \mathcal{M}$  に対して  $p \blacktriangleright m$  が  $\mathcal{M}$  の射影的対象になることを言う。



### 1.4.2 両側加群圏

#### 定義 1.23: 両側加群圏

$(\mathcal{C}_i, \otimes_i, 1, a_i, l_i, r_i)$   $w/ i = 1, 2$  をモノイダル圏とする.  $(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ -両側加群圏  $((\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ -bimodule category)  $\mathcal{M}$  は, 以下のデータからなる:

- 圏  $\mathcal{M}$
- 左加群積と呼ばれる関手  $\triangleright: \mathcal{C}_1 \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$
- 右加群積と呼ばれる関手  $\triangleleft: \mathcal{M} \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{M}$
- left actor と呼ばれる自然同型

$$\{\alpha_{x_1, y_1, m}: (x_1 \otimes y_1) \triangleright m \rightarrow x_1 \triangleright (y_1 \triangleright m)\}_{x_1, y_1 \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1), m \in \text{Ob}(\mathcal{M})}$$

- left unitor と呼ばれる自然同型  $\{\lambda_m: 1 \triangleright m \rightarrow m\}_{m \in \text{Ob}(\mathcal{M})}$
- right actor と呼ばれる自然同型

$$\{\beta_{m, x_2, y_2}: m \triangleleft (x_2 \otimes y_2) \rightarrow (m \triangleleft x_2) \triangleleft y_2\}_{x_2, y_2 \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2), m \in \text{Ob}(\mathcal{M})}$$

- right unitor と呼ばれる自然同型  $\{\rho_m: m \triangleleft 1 \rightarrow m\}_{m \in \text{Ob}(\mathcal{M})}$
- middle actor と呼ばれる自然同型

$$\{b_{x_1, m, x_2}: (x_1 \triangleright m) \triangleleft x_2 \rightarrow x_1 \triangleright (m \triangleleft x_2)\}_{x_1 \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1), x_2 \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2), m \in \text{Ob}(\mathcal{M})}$$


これらは以下の条件を充たす:

**(Bimod-1)** 組  $(\mathcal{M}, \triangleright, \alpha, \lambda)$  は左  $\mathcal{C}_1$ -加群圏である.

**(Bimod-2)** 組  $(\mathcal{M}, \triangleleft, \beta, \rho)$  は右  $\mathcal{C}_2$ -加群圏である.

**(Bimod-3)**  $\forall x_i, y_i \in \text{Ob}(\mathcal{C}_i), \forall m \in \text{Ob}(\mathcal{M})$  に対して以下の図式を可換にする:

$$\begin{array}{ccc}
 & ((x_1 \otimes_1 y_1) \triangleright m) \triangleleft x_1 & \\
 \alpha_{x_1, y_1, m} \triangleright \text{Id}_{x_1} \swarrow & & \searrow b_{x_1 \otimes_1 y_1, m, x_2} \\
 (x_1 \triangleright (y_1 \triangleright m)) \triangleleft x_1 & & (x_1 \otimes_1 y_1) \triangleright (m \triangleleft x_2) \\
 & & \downarrow \alpha_{x_1, y_1, m} \triangleleft x_2 \\
 & & x_1 \triangleright (y_1 \triangleright (m \triangleleft x_2)) \\
 b_{x_1, y_1 \triangleright m, x_2} \searrow & & \swarrow \text{Id}_{x_1} \triangleright b_{y_1, m, 1} \\
 & x_1 \triangleright ((y_1 \triangleright m) \triangleleft x_1) &
 \end{array}$$



### 1.4.3 代数と加群


#### 定義 1.24: 代数対象

多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  を与える.  $\mathcal{C}$  の代数対象 (algebra object)  $x$  とは, 以下のデータからなる:

- $\mathcal{C}$  の対象  $x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$
- 乗法 (multiplication) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $\mu: x \otimes x \rightarrow x$
- 単位 (unit) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $v: 1 \rightarrow x$

これらは以下の条件を充たさねばならない:

(associativity)



(unitality)

$$\begin{array}{ccc}
 1 \otimes x & \xrightarrow{l_x} & x \\
 v \otimes \text{Id}_x \downarrow & & \downarrow \text{Id}_x \\
 x \otimes x & \xrightarrow{\mu} & x
 \end{array}$$
  

$$\begin{array}{ccc}
 x \otimes 1 & \xrightarrow{r_x} & x \\
 \text{Id}_x \otimes v \downarrow & & \downarrow \text{Id}_x \\
 x \otimes x & \xrightarrow{\mu} & x
 \end{array}$$

多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  を与える.  $\mathcal{C}$  の余代数対象 (coalgebra object)  $y$  とは, 以下のデータからなる:

- $\mathcal{C}$  の対象  $y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$
- 余乗法 (comultiplication) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $\Delta: y \rightarrow y \otimes y$
- 余単位 (counit) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $\epsilon: y \rightarrow 1$

これらは以下の条件を充たさねばならない:

(coassociativity)


$$\begin{array}{ccccc}
 & & (y \otimes y) \otimes y & & \\
 & \nearrow \Delta \otimes \text{Id}_y & \nwarrow a_{y,y,y} & & \\
 y \otimes y & & & & y \otimes (y \otimes y) \\
 & \nwarrow \Delta & & \nearrow \text{Id}_y \otimes \Delta & \\
 & & y & & y \otimes y
 \end{array}$$

(unitality)


$$\begin{array}{ccc}
 1 \otimes y & \xleftarrow{l_y} & y \\
 \epsilon \otimes \text{Id}_y \uparrow & & \uparrow \text{Id}_y \\
 y \otimes y & \xleftarrow{\Delta} & y
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
y \otimes 1 & \xleftarrow{r_y} & y \\
\uparrow \text{Id}_y \otimes \epsilon & & \uparrow \text{Id}_y \\
y \otimes y & \xleftarrow{\Delta} & y
\end{array}$$

ストリング図式で代数対象  $(x, \mu, \nu)$  の **(associativity)**, **(unitality)** を書くと, それぞれ



となり, 余代数対象  $(y, \Delta, \epsilon)$  の **(associativity)**, **(unitality)** を書くと



となる.


#### 定義 1.25: 加群対象

多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の代数対象  $(x, \mu, \nu)$  を与える.  $\mathcal{C}$  における, 左  $x$ -加群対象 (right  $x$ -module object)  $m$  とは, 以下のデータからなる:


- $\mathcal{C}$  の対象  $m \in \text{Ob}(\mathcal{C})$
- 左作用 (right action) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $\lambda: m \otimes x \longrightarrow m$

これらは以下の条件を充たさねばならない:

(associativity)



(unitarity)




多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の代数対象  $(x, \mu, v)$  を与える.  
 $\mathcal{C}$  における, 右  $x$ -加群対象 (right  $x$ -module object)  $m$  とは, 以下のデータからなる:

- $\mathcal{C}$  の対象  $m \in \text{Ob}(\mathcal{C})$
- 右作用 (right action) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $\rho: m \otimes x \longrightarrow m$

これらは以下の条件を充たさねばならない:

(associativity)



(unitarity)

$$\begin{array}{ccc} m \otimes 1 & \xrightarrow{r_m} & m \\ \text{Id}_m \otimes v \downarrow & & \downarrow \text{Id}_m \\ m \otimes x & \xrightarrow{\rho} & m \end{array}$$

定義 1.26: 代数および加群の準同型

多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の 2 つの代数対象  $(x_i, \mu_i, \nu_i)$  w/  $i = 1, 2$  を与える.

このとき,  $\mathcal{C}$  の射  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x_1, x_2)$  が代数準同型 (algebra homomorphism) であるとは, 以下の条件を満たすことを言う:

(乗法の保存)

$$\begin{array}{ccc} x_1 \otimes x_1 & \xrightarrow{f \otimes f} & x_2 \otimes x_2 \\ \mu_1 \downarrow & & \downarrow \mu_2 \\ x_1 & \xrightarrow{f} & x_2 \end{array}$$

(単位の保存)

$$\begin{array}{ccc} 1 & \xrightarrow{\nu_1} & A_1 \\ & \searrow \nu_2 & \swarrow f \\ & A_2 & \end{array}$$

- 多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$
- $\mathcal{C}$  の代数対象  $(x, \mu, \nu)$
- $\mathcal{C}$  の 2 つの左  $x$ -加群対象  $(m_i, \lambda_i)$  w/  $i = 1, 2$

を与える.

このとき,  $\mathcal{C}$  の射  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(m_1, m_2)$  が左  $x$ -加群準同型 (left  $x$ -module homomorphism) であるとは, 以下の条件を満たすことを言う:

(左作用の保存)

$$\begin{array}{ccc} x \otimes m_1 & \xrightarrow{\text{Id}_x \otimes f} & x \otimes m_2 \\ \lambda_1 \downarrow & & \downarrow \lambda_2 \\ x_1 & \xrightarrow{f} & x_2 \end{array}$$

しばらくの間 多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の代数対象  $(x, \mu, \nu)$  を 1 つ固定する.

2つの左  $x$ -加群対象  $(m_i, \lambda_i)$   $w/ i = 1, 2$  の間の左  $x$ -加群の準同型全体がなす集合を  $\mathbf{Hom}_x(m_1, m_2) \subset \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(m_1, m_2)$  と書くと、これは部分  $\mathbb{K}$ -ベクトル空間をなす。さらに準同型の合成は準同型であるから、アーベル圏  $x\text{-Mod}_{\mathcal{C}}$  を次のようにして構成することができる：

- $\mathcal{C}$  における左  $x$ -加群対象を対象とする。
- 左  $x$ -加群の準同型を射とする。

同様に  $\mathcal{C}$  における右  $x$ -加群対象がなす圏  $\mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x}$  を定義できる。

左加群圏と  $\mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x}$  の間には関係がある。今、 $\mathcal{C}$  における任意の右  $x$ -加群対象  $(m, \rho)$  および  $\mathcal{C}$  の任意の対象  $y \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C})$  を与える。すると、 $y \otimes m \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C})$  と

$$\rho_{y \otimes m} : (y \otimes m) \otimes x \xrightarrow{a_{y, m, x}} y \otimes (m \otimes x) \xrightarrow{\text{Id}_y \otimes \rho} y \otimes m$$

の組み  $(y \otimes m, \rho_{y \otimes m})$  は右  $x$ -加群になる。i.e.  $(y \otimes m, \rho_{y \otimes m}) \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x})$  である。この構成により関手

$$\blacktriangleright : \mathcal{C} \times \mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x} \longrightarrow \mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x} \quad (1.4.1)$$

が定義できる。さらに、 $\mathcal{C}$  が元々持っていた associator と unitors に関しては、 $\forall (m, \rho) \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x}), \forall y, z \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C})$  に対して

$$\begin{aligned} a_{y, z, m} : (y \otimes z) \blacktriangleright m &\longrightarrow y \blacktriangleright (z \blacktriangleright m) \\ l_y : 1 \blacktriangleright m &\longrightarrow m \end{aligned}$$

が自然な<sup>\*3</sup>右  $x$ -加群の同型になる。

### 命題 1.3: $\mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x}$ は左加群圏

多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の代数対象  $(x, \mu, \nu)$  を1つ与える。

このとき、組み<sup>a</sup>  $(\mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x}, \blacktriangleright, a, l)$  は左  $\mathcal{C}$ -加群圏である。

<sup>a</sup>  $\blacktriangleright : \mathcal{C} \times \mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x} \longrightarrow \mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x}$  は (1.4.1) で定義した関手である。

証明  $\forall y, z, w \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C}), \forall (m, \rho) \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x})$  に対して (IMOD-1), (IMOD-2) が成り立つことを示せば良い。 ■

### 定義 1.27: 森田同値

多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  を与える。

$\mathcal{C}$  の2つの代数対象  $(x_i, \mu_i, \nu_i)$   $w/ i = 1, 2$  が森田同値 (Morita equivalent) であるとは、左  $\mathcal{C}$ -加群圏として  $x_1\text{-Mod}_{\mathcal{C}}$  と  $x_2\text{-Mod}_{\mathcal{C}}$  が圏同値であることを言う。

<sup>\*3</sup>  $a := \{a_{y, z, m}\}_{y, z \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C}), m \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x})}$  が自然同型。

### 定義 1.28: 代数上のテンソル積

- 多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の代数対象  $(x, \mu, \nu)$
- $\mathcal{C}$  における右  $x$ -加群対象  $(m, \rho) \in \text{Ob}(\text{Mod}_{\mathcal{C}-x})$
- $\mathcal{C}$  における左  $x$ -加群対象  $(n, \lambda) \in \text{Ob}(\text{Mod-}\mathcal{C}x)$

を与える。このとき、 $m$  と  $n$  の  $x$  上のテンソル積 (tensor product over  $x$ )  $m \otimes_x n \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を、以下の図式のコイコライザとして定義する：

$$m \otimes x \otimes n \xrightarrow[\text{Id}_m \otimes \lambda]{\rho \otimes \text{Id}_n} m \otimes n \xrightarrow{\pi} m \otimes_x n$$

### 1.4.4 両側加群

#### 定義 1.29: 両側加群

多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の2つの代数対象  $(x_i, \mu_i, \nu_i)$  を与える。 $\mathcal{C}$  における  $(x_1, x_2)$ -両側加群対象  $((x_1, x_2)\text{-bimodule object})$  とは、以下のデータからなる：

- $\mathcal{C}$  の対象  $m \in \text{Ob}(\mathcal{C})$
- 左作用 (left action) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $\lambda: x_1 \otimes m \rightarrow m$
- 右作用 (right action) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $\rho: m \otimes x_2 \rightarrow m$

これらは以下の条件を充たさねばならない：

(bimod-1) 組  $(m, \lambda)$  は  $\mathcal{C}$  の左  $x_1$ -加群対象

(bimod-2) 組  $(m, \rho)$  は  $\mathcal{C}$  の右  $x_2$ -加群対象

(bimod-3) 以下の図式を可換にする：

$$\begin{array}{ccccc}
 & (x_1 \otimes m) \otimes x_2 & & & \\
 & \swarrow \lambda \otimes \text{Id}_{x_2} & \searrow a_{x_1, m, x_2} & & \\
 & m \otimes x_2 & & x_1 \otimes (m \otimes x_2) & \\
 & \searrow \rho & & \downarrow \text{Id}_{x_1} \otimes \rho & \\
 & & & x_1 \otimes m & \\
 & & \swarrow \lambda & & \\
 & m & & & 
 \end{array}$$



### 定義 1.30: 両側加群の準同型

- 多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の 2 つの代数対象  $(x_i, \mu_i, \nu_i)$
- 2 つの  $(x_1, x_2)$ -両側加群対象  $(m_i, \lambda_i, \rho_i) \quad w/ \quad i = 1, 2$

を与える. このとき,  $\mathcal{C}$  の射  $f: m_1 \rightarrow m_2$  が  $(x_1, x_2)$  両側加群の準同型であるとは, それが左  $x_1$ -加群の準同型かつ右  $x_2$ -加群の準同型であることを言う.

しばらくの間 多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の 2 つの代数対象  $(x_i, \mu_i, \nu_i)$  を固定する.

2 つの  $(x_1, x_2)$ -両側加群対象  $(m_i, \lambda_i, \rho_i) \quad w/ \quad i = 1, 2$  の間の  $(x_1, x_2)$ -両側加群の準同型全体がなす集合を  $\mathbf{Hom}_{x_1-x_2}(m_1, m_2) \subset \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(m_1, m_2)$  と書くと, これは部分  $\mathbb{K}$ -ベクトル空間をなす. さらに準同型の合成は準同型であるから, アーベル圏  $\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(x_1, x_2)$  を次のようにして構成することができる:

- $\mathcal{C}$  における  $(x_1, x_2)$ -加群対象を対象とする.
- $(x_1, x_2)$ -両側加群の準同型を射とする.

同様に  $\mathcal{C}$  における右  $x$ -加群対象がなす圏  $\mathbf{Mod}_{\mathcal{C}-x}$  を定義できる.

### 補題 1.5: 両側加群のテンソル積

- 多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  および  $\mathcal{C}$  の 4 つの代数対象  $(x_i, \mu_i, \nu_i) \quad w/ \quad i = 1, \dots, 4$
- $(x_1, x_2)$ -両側加群対象  $(m_1, \lambda_1, \rho_1) \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(x_1, x_2))$
- $(x_2, x_3)$ -両側加群対象  $(m_2, \lambda_2, \rho_2) \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(x_2, x_3))$
- $(x_3, x_4)$ -両側加群対象  $(m_3, \lambda_3, \rho_3) \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(x_3, x_4))$

を与える. このとき以下が成り立つ:

- (1)  $m_1 \otimes_{x_2} m_2$  は自然な  $(x_1, x_3)$ -両側加群対象の構造を持つ.
- (2) 自然な  $(x_1, x_4)$ -両側加群の同型

$$\begin{aligned} \bar{a}_{m_1, m_2, m_3} &: (m_1 \otimes_{x_2} m_2) \otimes_{x_3} m_3 \xrightarrow{\cong} m_1 \otimes_{x_2} (m_2 \otimes_{x_3} m_3) \\ \bar{l}_{m_1} &: x_1 \otimes_{x_1} m_1 \xrightarrow{\cong} m_1 \\ \bar{r}_{m_1} &: m_1 \otimes_{x_2} x_2 \xrightarrow{\cong} m_1 \end{aligned}$$

が存在する.

証明 (1)

■


$\mathcal{C}$  の任意の代数対象  $(x, \mu, \nu)$  について, 明らかに  $(x, \mu, \mu) \in \mathbf{Bimod}_{\mathcal{C}}(x, x)$  である.

### 定義 1.31: 分離可能性

テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  の代数対象  $(x, \mu, \nu)$  が分離可能 (separable) であるとは, ある  $(x, x)$ -両側加群の準同型  $\bar{\mu}: x \rightarrow x \otimes x$  が存在して  $\mu \circ \bar{\mu} = \text{Id}_x$  を満たすことを言う<sup>a</sup>.

<sup>a</sup> 補題 1.5-(1) によって  $x \otimes x$  を  $(x, x)$ -両側加群対象と見做す.

分離可能性をストリング図式で表すと



となる.

### 命題 1.4: 分離可能性と半単純性

フュージョン圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  の代数対象  $(x, \mu, \nu)$  を与える.  
このときもし  $(x, \mu, \nu)$  が分離可能ならば, アーベル圏  $\text{Mod}_{\mathcal{C}\text{-}x}$  は半単純である.

証明 [?, PROPOSITION 7.8.30, p.146] ■

### 1.4.5 Frobenius 代数

### 定義 1.32: Frobenius 代数

多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  を与える.

$\mathcal{C}$  の代数対象  $(x, \mu, \nu)$  が **Frobenius 代数** (Frobenius algebra) であるとは,

- 余乗法 (comultiplication) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $\Delta: x \longrightarrow x \otimes x$
- 余単位 (counit) と呼ばれる  $\mathcal{C}$  の射  $\epsilon: x \longrightarrow 1$


が存在して以下を充たすことを言う:

**(Frob-1)**  $(x, \Delta, \epsilon)$  は  $\mathcal{C}$  の余代数対象である.

**(Frob-2)** 以下の図式を可換にする:

$$\begin{array}{ccccc}
 & x \otimes x & & & \\
 \Delta \otimes \text{Id}_x \swarrow & \downarrow \mu & \searrow \text{Id}_x \otimes \Delta & & \\
 x \otimes x \otimes x & x & x \otimes x \otimes x & & \\
 \text{Id}_x \otimes \mu \searrow & \downarrow \Delta & \swarrow \mu \otimes \text{Id}_x & & \\
 & x \otimes x & & & 
 \end{array}$$

ストリング図式で **(Frob-2)** を書くと次のようになる:




### 定義 1.33: 対称 Frobenius 代数

多重テンソル圏  $(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L, \text{ev}^R, \text{coev}^R)$  を与える.

$\mathcal{C}$  の **Frobenius 代数**  $(x, \mu, \nu, \Delta, \epsilon)$  が **対称** (symmetric) であるとは, 以下の図式を可換にすることを言う:

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{\text{coev}_x^R \otimes \text{Id}_x} & *x \otimes x \otimes x \\
 \text{Id}_x \otimes \text{coev}_x^L \downarrow & & \downarrow \text{Id}_{*x} \otimes \mu \\
 x \otimes x \otimes x^* & & *x \otimes x \\
 \mu \otimes \text{Id}_{x^*} \downarrow & & \downarrow \text{Id}_{*x} \otimes \epsilon \\
 x \otimes x^* & \xrightarrow{\epsilon \otimes \text{Id}_{x^*}} & *x
 \end{array}$$

ストリング図式では



となる.

### 1.4.6 加群圏における internal hom

**定義 1.34:** 加群圏における internal hom

$(\mathcal{C}, \otimes, 1, a, l, r)$  をモノイダル圏とする. 左  $\mathcal{C}$ -加群圏  $(\mathcal{M}, \blacktriangleright, \alpha, \lambda)$  を与える.  $\mathcal{M}$  の internal hom とは, 以下のデータの組のこと:

- 関手

$$\multimap: \mathcal{M}^{\text{op}} \times \mathcal{M} \longrightarrow \mathbf{Vec}_{\mathbb{K}}$$

- currying と呼ばれる自然同型

$$\{c_{x, m_1, m_2}: \text{Hom}(x \blacktriangleright m_1, m_2) \xrightarrow{\cong} \text{Hom}(x, m_1 \multimap m_2)\}_{x \in \text{Ob}(\mathcal{C}), Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

## 1.5 2-群

### 1.5.1 豊穡圏と 2-圏

まず, 厳密な 2-圏 (strict 2-category) を導入する.

**定義 1.35:** 豊穡圏

モノイダル圏  $(V, \otimes, I)$  を与える.

$V$ -豊穡圏 ( $V$ -enriched category)  $\mathcal{C}$  は, 以下のデータからなる:

- 集合  $\text{Ob}(\mathcal{C})$
- $\forall x, y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して, **Hom 対象**と呼ばれる  $V$  の対象  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \in \text{Ob}(V)$  を持つ
- $\forall x, y, z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して, **合成射**と呼ばれる  $V$  の射  $\circ_{x, y, z}: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(y, z) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, z)$  を持つ
- $\forall x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して, **恒等素**と呼ばれる  $V$  の射  $j_x: I \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, x)$  を持つ

これらは以下の図式を可換にしておくといけない：

**(associativity)**

$\forall x, y, z, w \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  について<sup>a</sup>

$$\begin{array}{ccc}
 (\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(y, z)) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(z, w) & \xrightarrow{\circ_{x,y,z} \otimes \text{Id}_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}(z,w)}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, z) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(z, w) \\
 \downarrow \cong & & \downarrow \circ_{x,z,w} \\
 & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, w) \\
 & & \uparrow \circ_{x,y,w} \\
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \otimes (\text{Hom}_{\mathcal{C}}(y, z) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(z, w)) & \xrightarrow{\text{Id}_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x,y)} \otimes \circ_{y,z,w}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(y, w)
 \end{array}$$

**(unitality)**

$\forall x, y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  について<sup>b</sup>

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, x) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) & \xrightarrow{\circ_{x,x,y}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) & \xleftarrow{\circ_{x,y,y}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(y, y) \\
 j_x \otimes \text{Id}_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x,y)} \uparrow & \nearrow \cong & & \nwarrow \cong & \uparrow \text{Id}_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x,y)} \otimes j_y \\
 I \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) & & & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \otimes I
 \end{array}$$

<sup>a</sup>  $\cong$  はモノイダル圏  $V$  の associator

<sup>b</sup>  $\cong$  はモノイダル圏  $V$  の left/right unitor

### 定義 1.36: 豊穣関手

モノイダル圏  $(V, \otimes, I)$  を与える.

2つの  $V$ -豊穣圏  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  の間の  $V$ -豊穣関手 ( $V$ -enriched functor)

$$F: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}$$

は, 以下のデータからなる:

- 写像  $F_0: \text{Ob}(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{Ob}(\mathcal{D}), x \longmapsto F_0(x)$
- $V$  の射の族

$$\{F_{x,y}: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F_0(x), F_0(y))\}_{x,y \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

これらは以下の図式を可換にしなくてはならない:

(enriched-1)

$\forall x, y, z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して<sup>a</sup>

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{C}}(y, z) & \xrightarrow{\circ_{x,y,z}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, z) \\ \downarrow F_{x,y} \otimes F_{y,z} & & \downarrow F_{x,z} \\ \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F_0(x), F_0(y)) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F_0(y), F_0(z)) & \xrightarrow{\circ_{F_0(x), F_0(y), F_0(z)}} & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F_0(x), F_0(z)) \end{array}$$

(enriched-2)

$\forall x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して<sup>b</sup>

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{j_x} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, x) \\ & \searrow j_{F_0(x)} & \downarrow F_{x,x} \\ & & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F_0(x), F_0(x)) \end{array}$$

<sup>a</sup> これは, 通常の関手において射の合成が保存されることに対応する.

<sup>b</sup> これは, 通常の関手において恒等射が保存されることに対応する.

与えられたモノイダル圏  $V$  に対して,  $V$ -豊穣圏のなす圏を  $V\text{-Cat}$  と書く.  $V\text{-Cat}$  は

- $V$ -豊穣圏を対象とする
- $V$ -豊穣関手を射とする

ことで得られる圏である.

### 定義 1.37: 厳密な 2-圏

小圏と関手の圏  $\mathbf{Cat}$  を【例 1.2.1】の方法でモノイダル圏と見做す.  $\mathbf{Cat}$ -豊穣圏のことを厳密な 2-圏 (strict 2-category) と呼ぶ.

定義 1.37 を解説しよう．まず，小圏と関手の圏  $\mathbf{Cat}$  における対象とは小圏のことで，射とは関手のことである．さらに， $\mathbf{Cat}$  のテンソル積とは【例 1.2.1】より直積  $\times$  のことである．よって豊稜圏の定義から，厳密な 2-圏  $\mathcal{C}$  は

- 対象 (object)<sup>\*4</sup> 全体の集合  $\text{Ob}(\mathcal{C})$
- $\forall x, y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  の間の 1-射 (1-morphism)<sup>\*5</sup> 全体が成す圏  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \in \text{Ob}(\mathbf{Cat})$ .
- 合成 (composition) と呼ばれる関手  $\circ: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(y, z) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, z)$
- 恒等素 (identity morphism) と呼ばれる関手  $j_x: 1 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, x)$

の 4 つのデータからなる．従って 1-射  $f: x \longrightarrow y$  とは圏  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)$  の対象  $f \in \text{Ob}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y))$  のことであるから，2 つの 1-射  $f, g \in \text{Ob}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y))$  が与えられると，圏  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)$  における，それらの間の射  $\alpha \in \text{Hom}_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)}(f, g)$  が存在する．このような  $\alpha$  を 2-射 (2-morphism)<sup>\*6</sup> と呼び，混乱防止のため  $\alpha: f \longrightarrow g$  と書く代わりに  $\alpha: f \Longrightarrow g$  と書く．

2 つの 2-射  $\alpha \in \text{Hom}_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)}(f, g)$ ,  $\beta \in \text{Hom}_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)}(g, h)$  は，圏  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)$  における射の合成  $*$  によって結合的かつ単位的に合成することができる：

$$\begin{array}{c} x \quad \xrightarrow{\quad f \quad} \quad y \\ \quad \quad \downarrow \beta * \alpha \quad \\ \quad \quad \quad h \end{array} \quad := \quad \begin{array}{c} x \quad \xrightarrow{\quad f \quad} \quad y \\ \quad \quad \downarrow \alpha \quad \\ \quad \quad \quad g \quad \\ \quad \quad \downarrow \beta \quad \\ \quad \quad \quad h \end{array}$$

このような 2-射の合成を縦の合成 (vertical composition) と呼ぶ．一方，4 つの 1-射  $f, g: x \longrightarrow y$ ,  $f', g': y \longrightarrow z$  および 2 つの 2-射  $\alpha: f \Longrightarrow g$ ,  $\alpha': f' \Longrightarrow g'$  が与えられたとき，1-射の合成  $\circ$  が関手であることによって，圏  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(y, z)$  の射  $(\alpha, \alpha'): (f, f') \longrightarrow (g, g')$  に対して圏  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, z)$  の射，i.e. 2-射

$$\alpha' \circ \alpha := \circ(\alpha, \alpha'): f' \circ f \Longrightarrow g' \circ g$$

が対応付く：

$$\begin{array}{c} x \quad \xrightarrow{\quad f' \circ f \quad} \quad z \\ \quad \quad \downarrow \alpha' \circ \alpha \quad \\ \quad \quad \quad g' \circ g \end{array} \quad := \quad \begin{array}{c} x \quad \xrightarrow{\quad f \quad} \quad y \quad \xrightarrow{\quad f' \quad} \quad z \\ \quad \quad \downarrow \alpha \quad \quad \downarrow \alpha' \quad \\ \quad \quad \quad g \quad \quad \quad g' \end{array}$$

このような 2-射の合成を横の合成 (horizontal composition) と呼ぶ．横の合成は，モノイダル圏  $\mathbf{Cat}$  が厳密なモノイダル圏であること，および関手  $\circ$  の (associativity), (unitality) によって結合的かつ単位的になる．

<sup>\*4</sup> 0-セル (0-cell) とも言う

<sup>\*5</sup> 1-セル (1-cell) とも言う．正確には，圏  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)$  の対象のことを 1-射と呼ぶ．

<sup>\*6</sup> 2-セル (2-cell) とも言う

縦の合成と横の合成は、 $\circ$  が関手であることによって交換する：

$$\begin{aligned} (\beta' * \alpha') \circ (\beta * \alpha) &= \circ((\beta, \beta') * (\alpha, \alpha')) \\ &= (\circ(\beta, \beta')) * (\circ(\alpha, \alpha')) \\ &= (\beta' \circ \beta) * (\alpha' \circ \alpha) \end{aligned}$$

図式で書くと一目瞭然である：



### 定義 1.38: 2-圏

厳密な 2-圏と同様の

- 対象 (object)<sup>a</sup> 全体の集合  $\text{Ob}(\mathcal{C})$
- $\forall x, y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  の間の 1-射 (1-morphism)<sup>b</sup> 全体が成す圏  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \in \text{Ob}(\mathbf{Cat})$ .
- 合成 (composition) と呼ばれる関手  $\circ: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(y, z) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, z)$
- 恒等素 (identity morphism) と呼ばれる関手  $j_x: 1 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, x)$

の 4 つのデータに加えて




- $\forall x, y, z, w \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して **associator** と呼ばれる自然同型<sup>c</sup>.



- $\forall x, y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して **left/right unitor** と呼ばれる自然同型

$$\lambda_{x,y} := \{l_{x,y}f: f \mapsto f \circ j_x(1)\}_{f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x,y)}$$

$$\rho_{x,y} := \{l_{x,y}f: f \mapsto j_x(1) \circ f\}_{f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(x,y)}$$



を持ち,

- associator が **(pentagon identity)** を
- unitors が **(triangle identity)** を

満たす  $\mathcal{C}$  のことを **2-圏** (2-category) と呼ぶ.

<sup>a</sup> **0-セル** (0-cell) とも言う

<sup>b</sup> **1-セル** (1-cell) とも言う. 正確には, 圏  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y)$  の対象のことを 1-射と呼ぶ.

<sup>c</sup> これは圏 **Cat** における図式である.

要するに、**厳密な 2-圏**において合成  $\circ$  の associativity および unitality を自然同型まで弱めたものが **2-圏** である。

### 【例 1.5.1】2-圏としてのモノイダル圏

**モノイダル圏**  $(\mathcal{C}, \otimes, I, \{a_{x,y,z}\}, \{l_x\}, \{r_y\})$  は **2-圏** である。実際、2-圏  $\mathbf{BC}$  を

- $\text{Ob}(\mathbf{BC}) := \{\bullet\}$  (1 点集合)
- $\text{Hom}_{\mathbf{BC}}(\bullet, \bullet) := \mathcal{C}$
- $\circ := \otimes: \mathcal{C} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$
- $j_x := \iota_I: I \hookrightarrow \mathcal{C}$
- $\alpha_{\bullet,\bullet,\bullet} := \{a_{x,y,z}\}$
- $\lambda_{\bullet,\bullet} := \{l_{x,y,z}\}, \quad \rho_{\bullet,\bullet} := \{r_{x,y,z}\}$

により定義すると  $\mathcal{C} = \mathbf{BC}$  となる。

## 1.5.2 弱い 2-群・コヒーレントな 2-群・厳密な 2-群

[?] に倣い **2-群** (2-group) を導入する。

### 定義 1.39: 弱い逆対象

**モノイダル圏**  $(\mathcal{C}, \otimes, 1)$  の対象  $x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を 1 つとる。

- 対象  $y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が  $x$  の **弱い逆対象** (weak inverse) であるとは、対象の同型の意味で<sup>a</sup>  $x \otimes y \cong 1$  かつ  $y \otimes x \cong 1$  が成り立つことを言う。
- $x$  が **弱可逆** (weakly invertible) であるとは、 $x$  が弱い逆対象を持つことを言う。

<sup>a</sup> 自然同型ではない

### 定義 1.40: 弱い 2-群・コヒーレントな 2-群・厳密な 2-群

- **弱い 2-群** (weak 2-group) とは、**モノイダル圏**  $\mathcal{G}$  であって、任意の対象が **弱可逆** であかつ任意の射が同型射であるもののこと。
- **コヒーレントな 2-群** (coherent 2-group) とは、**モノイダル圏**  $\mathcal{G}$  であって、任意の対象  $x \in \text{Ob}(\mathcal{G})$  が可逆な **unit**, **counit**  $(x, \bar{x}, i_x, e_x)$  を持ち、かつ任意の射が同型射であるもののこと。
- **厳密な 2-群** (strict 2-group) とは、**モノイダル圏**  $\mathcal{G}$  であって、任意の対象が可逆<sup>a</sup> であかつ任意の射が同型射であるもののこと。

<sup>a</sup>  $x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $x^{-1} \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  が存在して、厳密に  $x \otimes x^{-1} = 1, x^{-1} \otimes x = 1$  が成り立つ。

**定義 1.41: 2-群の準同型**

2-群  $\mathcal{G}, \mathcal{G}'$  の間の準同型とは, モノイダル関手  $f: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$  のこと.

**定理 1.1: 弱い 2-群はコヒーレントな 2-群**


任意の弱い 2-群はコヒーレントな 2-群にすることができる.

証明 勝手な弱い 2-群  $\mathcal{G}$  を 1 つ固定する. このとき  $\forall x \in \text{Ob}(\mathcal{G})$  に対してある  $\bar{x} \in \text{Ob}(\mathcal{G})$  および同型射  $i'_x: 1 \rightarrow x \otimes \bar{x}$ ,  $e'_x: \bar{x} \otimes x \rightarrow 1$  が存在する.



ここで  $e_x := e'_x$  とおき,

$$i_x := (l_x \otimes \text{Id}_{\bar{x}}) \circ a_{1, x, \bar{x}}^{-1} \circ (i'_x)^{-1} \otimes \text{Id}_{x \otimes \bar{x}} \circ a_{x, \bar{x}, x \otimes \bar{x}}^{-1} \circ (\text{Id}_x \otimes a_{\bar{x}, x, \bar{x}}) \circ (\text{Id}_x \otimes e'_x)^{-1} \otimes \text{Id}_{\bar{x}} \circ (\text{Id}_x \otimes l_{\bar{x}}^{-1}) \circ i'_x$$

とおくと組  $(x, \bar{x}, i_x, e_x)$  が zig-zag equation を満たすことを示す. 実際,  $i_x$  の定義をストリング図式で書くと



となるから,




が言える. ■

**!** 定理 1.1 を踏まえ, 以下では**コヒーレントな 2-群**のことを単に **2-群** (2-group) と呼ぶ.

2-群  $\mathcal{G}$  において, **弱い逆対象**を対応づける関手

$$\text{inv}: \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}, x \longmapsto \bar{x} \quad (1.5.1)$$

を考えたいが, 射の対応は少々厄介である. [?, p.34] に倣うと



とすれば良いことがわかる<sup>\*7</sup>.

以上より, 2-群  $\mathcal{G}$  を【例 1.5.1】により 2 圏  $\mathbf{BG}$  の言葉で表現すると

- ただ 1 つの対象を持つ:  $\text{Ob}(\mathbf{BG}) = \{\bullet\}$

<sup>\*7</sup> 定義から**コヒーレントな 2 群**は**rigid なモノイダル圏**であり, zigzag identity を使えることが肝になる.

- 任意の 1-射  $x \in \text{Ob}(\text{Hom}_{\mathbf{BG}}(\bullet, \bullet)) = \text{Ob}(\mathcal{G})$  が弱可逆であり, その弱い逆対象  $\bar{x}$  は関手 (1.5.1) によって与えられる.
- 任意の 2-射  $\alpha \in \text{Hom}_{\text{Hom}_{\mathbf{BG}}(\bullet, \bullet)}(x, y) = \text{Hom}_{\mathcal{G}}(x, y)$  が同型射

ということになる. 特に厳密な 2-群とは, 全ての  $\alpha, \lambda, \rho, i, e$  が  $\mathcal{G}$  の恒等射となっていることを言う.

### 1.5.3 交差加群との関係

#### 定義 1.42: 交差加群

交差加群 (crossed module) とは,

- 群準同型  $G_2 \xrightarrow{t} G_1$
- $G_1$  の左作用  $\alpha: G_1 \rightarrow \text{Aut}(G_2)$

の組であって, 以下の条件を満たすもののこと:

(cr-1) 以下の図式を可換にする:

$$\begin{array}{ccc} G_2 \times G_2 & \xrightarrow{t \times \text{Id}} & G_1 \times G_2 \\ & \searrow \text{Ad} & \swarrow \alpha \\ & G_2 & \end{array}$$

あるいは同じことだが,  $\forall g_i \in G_i$  に対して

$$t(\alpha(g_1)(g_2)) = g_1 t(g_2) g_1^{-1}$$

を充たす.

(cr-2) 以下の図式を可換にする:

$$\begin{array}{ccc} G_1 \times G_2 & \xrightarrow{\alpha} & G_2 \\ \text{Id} \times t \downarrow & & \downarrow t \\ G_1 \times G_1 & \xrightarrow{\text{Ad}} & G_1 \end{array}$$

あるいは同じことだが,  $\forall g_2, g'_2 \in G_2$  に対して

$$\alpha(t(g_2))(g'_2) = g_2 g'_2 g_2^{-1}$$

を充たす (Peiffer identity).

命題 1.5: 交差加群と厳密な 2-群

- (1) 交差加群  $(G_2 \xrightarrow{t} G_1, \alpha)$  が与えられたとする. このとき
- 1-射の集合  $\mathcal{G}_0 := G_1$
  - 2-射の集合  $\mathcal{G}_1 := G_1 \ltimes_{\alpha} G_2$  (外部半直積)
  - 始点射  $\sigma: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_0, (g_1, g_2) \rightarrow g_1$
  - 終点射  $\tau: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_0, (g_1, g_2) \rightarrow t(g_2)g_1$
  - 恒等素  $j: \mathcal{G}_0 \rightarrow \mathcal{G}_1, g_1 \rightarrow (g_1, 1_{G_2})$
  - 2-射の合成  $\circ: \mathcal{G}_1 \times_{\mathcal{G}_0} \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_1, ((g_1, g_2), (g'_1, g'_2)) \mapsto (g'_1, g_2 g'_2)$
- とおくと, 圏  $\mathcal{G}$  は厳密な 2-群になる.
- (2) 逆に厳密な 2-群  $(\mathcal{G}, \otimes, 1)$  が与えられたとき,
- $G_1 := \mathcal{G}_0$
  - $G_2 := \text{Ker } \sigma \subset \mathcal{G}_1$
  - $t := \tau|_{G_2}: G_2 \rightarrow G_1$
  - $\alpha: G_1 \rightarrow \text{Aut}(G_2), g_1 \mapsto (g_2 \mapsto j(g_1) \otimes g_2 \otimes j(g_1)^{-1})$
- とおくことで交差加群  $(G_2 \xrightarrow{t} G_1, \alpha)$  が得られる.

証明 (1) 圏  $\mathcal{G}$  を

- 対象が成す集合を  $\text{Ob}(\mathcal{G}) := \mathcal{G}_0$  と定義する.
- $\forall g, h \in \text{Ob}(\mathcal{G}) = \mathcal{G}_0$  に対して, その間の射が成す集合を

$$\text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h) := \{ (f_1, f_2) \in \mathcal{G}_1 \mid \sigma(f_1, f_2) = g, \tau(f_1, f_2) = h \}$$

と定義する.

- $\forall g, h, k \in \mathcal{G}$  に対して, 射の合成を

$$\begin{aligned} \circ_{g,h,k}: \text{Hom}_{\mathcal{G}}(h, k) \times \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, k), \\ ((l_1, l_2), (m_1, m_2)) &\mapsto (m_1, l_2 m_2) \end{aligned}$$

と定義する. なお,

$$\begin{aligned} \sigma(m_1, l_2 m_2) &= m_1 = \sigma(m_1, m_2) = g, \\ \tau(m_1, l_2 m_2) &= t(l_2 m_2) m_1 \\ &= t(l_2)(t(m_2) m_1) \\ &= t(l_2)h \\ &= t(l_2)\sigma(l_1, l_2) \\ &= t(l_2)l_1 \\ &= \tau(l_1, l_2) \\ &= k \end{aligned}$$

が成り立つので写像  $\circ_{g,h,k}$  は well-defined である.

として構成する．実際,  $\forall (f_1, f_2) \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h)$  に対して<sup>\*8</sup>

$$\begin{aligned}(f_1, f_2) \circ (g, 1_{G_2}) &= (g, f_2) = (f_1, f_2), \\ (h, 1_{G_2}) \circ (f_1, f_2) &= (f_1, f_2)\end{aligned}$$

が成り立つので  $\text{Id}_g = (g, 1_{G_2}) = j(g) \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, g)$  であり, かつ  $\forall (f_1, f_2) \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h), \forall (g_1, g_2) \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(h, k), \forall (h_1, h_2) \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(k, l)$  に対して

$$\begin{aligned}((h_1, h_2) \circ (g_1, g_2)) \circ (f_1, f_2) &= (g_1, h_2 g_2) \circ (f_1, f_2) \\ &= (f_1, h_2 g_2 f_2) \\ &= (h_1, h_2) \circ (f_1, g_2 f_2) \\ &= (h_1, h_2) \circ ((g_1, g_2) \circ (f_1, f_2))\end{aligned}$$

が成り立つので,  $\mathcal{G}$  は圏の公理を充たす.

さて,  $\mathcal{G}_1$  の積を  $(g_1, g_2) \cdot (h_1, h_2) := (g_1 h_1, g_2 \alpha(g_1)(h_2))$  と書こう. そして関手

$$\otimes: \mathcal{G} \times \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$$

を次のように定義する:

- $\forall (g, h) \in \text{Ob}(\mathcal{G} \times \mathcal{G}) = \mathcal{G}_0 \times \mathcal{G}_0$  に対して

$$g \otimes h := gh \in \text{Ob}(\mathcal{G}) = \mathcal{G}_0$$

を対応付ける

- $\forall ((f_1, f_2), (g_1, g_2)) \in \text{Hom}_{\mathcal{G} \times \mathcal{G}}((g, h), (g', h'))$  に対して

$$(f_1, f_2) \otimes (g_1, g_2) := (f_1, f_2) \cdot (g_1, g_2) \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(gh, g'h')$$

を対応付ける. なお,

$$\begin{aligned}\sigma((f_1, f_2) \cdot (g_1, g_2)) &= f_1 g_1 \\ &= \sigma(f_1, f_2) \sigma(g_1, g_2) \\ &= gh, \\ \tau((f_1, f_2) \cdot (g_1, g_2)) &= t(f_2 \alpha(f_1)(g_2)) f_1 g_1 \\ &= t(f_2) t(\alpha(f_1)(g_2)) f_1 g_1 \\ &= t(f_2) f_1 t(g_2) g_1 && \because \text{Crossed module の定義} \\ &= \tau(f_1, f_2) \tau(g_1, g_2) \\ &= g' h'\end{aligned}$$

なのでこの対応は well-defined である.

群演算の結合則より  $\otimes$  に関する associator は全て恒等射で, かつ  $1 := 1_{G_1}$  とおくと left/right unitor も恒等射になる. よって  $(\mathcal{G}, \otimes, 1_{G_1}, \{\text{Id}\}, \{\text{Id}\}, \{\text{Id}\})$  は**厳密なモノイダル圏**を成す.  $\forall g \in \mathcal{G}_0$  に対して明らかに  $g \otimes g^{-1} = g^{-1} \otimes g = 1$  であり, かつ  $\forall (f_1, f_2) \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h)$  に対して  $(h, f_2^{-1}) \in \text{Hom}_{\text{Hom}_{\mathcal{G}}(\bullet, \bullet)}(h, g)$  は

$$\begin{aligned}(f_1, f_2) \circ (h, f_2^{-1}) &= (h, 1_{G_2}) = \text{Id}_h \\ (h, f_2^{-1}) \circ (f_1, f_2) &= (g, 1_{G_2}) = \text{Id}_g\end{aligned}$$

---

<sup>\*8</sup> Hom 集合の定義より  $f_1 = \sigma(f_1, f_2) = g$  が自動的に成り立つ.

を充たすので,  $\mathcal{G}$  は**厳密な 2 群**である.

- (2) 始めに, **厳密な 2-群の定義**から 1-射の集合  $\mathcal{G}_0 := \text{Ob}(\mathcal{G})$  は  $\otimes$  を積とする群を成し, 2-射全体がなす集合  $\mathcal{G}_1 := \bigcup_{g, h \in \mathcal{G}_0} \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h)$  もまたテンソル積  $\otimes$  について群を成すことに注意する<sup>\*9</sup>. 恒等素は

$$j: \mathcal{G}_0 \longrightarrow \mathcal{G}_1, g \longmapsto \text{Id}_g$$

と定義され, 始点射および終点射は

$$\begin{aligned} \sigma: \mathcal{G}_1 &\longrightarrow \mathcal{G}_0, \underbrace{\varphi}_{\in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h)} \longmapsto g \\ \tau: \mathcal{G}_1 &\longrightarrow \mathcal{G}_0, \underbrace{\varphi}_{\in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h)} \longmapsto h \end{aligned}$$

のように定義される. 特に  $\forall \varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h), \forall \psi \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g', h')$  に対して

$$\begin{aligned} \sigma(\psi \otimes \varphi) &= g \otimes g' = \sigma(\psi) \otimes \sigma(\varphi) \\ \tau(\psi \otimes \varphi) &= h \otimes h' = \tau(\psi) \otimes \tau(\varphi) \end{aligned}$$

が成り立つので  $\sigma, \tau$  は群準同型である.

**交差加群**の定義 **(cr-1)**, **(cr-2)** を確認する.

**(cr-1)**  $\forall g_1 \in G_1, \forall g_2 \in G_2$  に対して

$$\begin{aligned} t(\alpha(g_1)(g_2)) &= t(\text{Id}_{g_1} \otimes g_2 \otimes \text{Id}_{g_1^{-1}}) \\ &= g_1 \otimes t(g_2) \otimes g_1^{-1} \end{aligned}$$

**(cr-2)**  $\forall g_2, g'_2 \in G_2$  に対して

$$\begin{aligned} \alpha(t(g_2))(g'_2) &= \text{Id}_{t(g_2)} \otimes g'_2 \otimes \text{Id}_{t(g_2)^{-1}} \\ &= \text{Id}_{\tau(g_2)} \otimes g'_2 \otimes \text{Id}_{\tau(g_2)^{-1}} \\ &= g_2 \otimes g'_2 \otimes g_2^{-1} \end{aligned}$$

ただし  $\sigma(g_2) = 1$  であることを使った.

■

#### 1.5.4 2-群の分類

##### 定義 1.43: 骨格的

**コヒーレントな 2 群**  $(\mathcal{G}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L)$  が**骨格的** (skeltal) であるとは, 任意の同型な 1-射が等しいことを言う.

<sup>\*9</sup> まず,  $\forall \varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h)$  に対して  $\varphi \otimes \text{Id}_1 = \varphi$  であるから, 単位元は  $\text{Id}_1 \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(1, 1)$  である. 逆元を見つけるのは少し難しい.  $\forall \varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h)$  を 1 つ固定しよう.  $\mathcal{G}$  が厳密な 2-群であることから,  $g \otimes g^{-1} = 1$  を充たす  $g^{-1} \in \text{Ob}(\mathcal{G})$  が存在する. よって  $\otimes$  が関手なので  $\text{Id}_g \otimes \text{Id}_{g^{-1}} = \text{Id}_{g \otimes g^{-1}} = \text{Id}_1$  であり, 任意の恒等射が逆元を持つことが分かった. さらに,  $\otimes$  が関手であることにより  $\forall \varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g, h), \forall \psi \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g', h')$  に対して

$$\varphi \otimes \psi = (\text{Id}_h \circ \varphi) \otimes (\psi \circ \text{Id}_{g'}) = (\text{Id}_h \otimes \psi) \circ (\varphi \otimes \text{Id}_{g'})$$

が成り立つので,  $\varphi$  の  $\otimes$  に関する逆元は  $\psi := \text{Id}_{h^{-1}} \otimes \varphi^{-1} \otimes \text{Id}_{g^{-1}}$  であることが分かる.



骨格的であるとは、同型射が自己同型しか存在しないことを意味する。[?, p.55] に倣って特別な 2 群を定義する。

**定義 1.44: 特別な 2 群**

コヒーレントな 2 群  $(\mathcal{G}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L)$  が特別 (special) であるとは、骨格的でかつ  $l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L$  が恒等自然変換であることを言う。

**命題 1.6:**

任意のコヒーレントな 2 群  $(\mathcal{G}, \otimes, 1, a, l, r, \text{ev}^L, \text{coev}^L)$  は、ある特別な 2 群と同型である。

**証明** コヒーレントな 2 群  $\mathcal{G}$  から、それと 2 群として同型な特別な 2 群  $(\mathcal{G}, \tilde{\otimes}, 1, \tilde{a}, \tilde{l}, \tilde{r}, \tilde{\text{ev}}^L, \tilde{\text{coev}}^L)$  を構成する<sup>\*10</sup>。そのためにまず、 $\forall x, y \in \text{Ob}(\mathcal{G})$  に対してある対象  $x \tilde{\otimes} y \in \text{Ob}(\mathcal{G})$  および同型射  $\gamma_{x,y} \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(x \tilde{\otimes} y, x \otimes y)$  を選べたとしよう。このとき、 $\gamma_{x,y}$  の可逆性により

- 関手  $\text{id}: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$
- 射  $\text{Id}_1: 1 \rightarrow \text{id}(1) = 1$
- 射の族  $\{\gamma_{x,y}: \text{id}(x \tilde{\otimes} y) \rightarrow \text{id}(x) \otimes \text{id}(y)\}_{x,y \in \text{Ob}(\mathcal{G})}$

の 3 つ組がモノイダル関手になるように関手  $\tilde{\otimes}: \mathcal{G} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$  および自然変換  $\tilde{a}, \tilde{l}, \tilde{r}$  を構成することができる。 $\tilde{\text{ev}}^L, \tilde{\text{coev}}^L$  は、以下の可換図式が成り立つように決めれば良い：

$$\begin{array}{ccc}
 \text{id}(x \tilde{\otimes} x^*) & \xrightarrow{\gamma_{x,x^*}} & \text{id}(x) \otimes \text{id}(x^*) \\
 \text{id}(\text{coev}_x^L) \uparrow & & \uparrow \text{coev}_{\text{id}(x)}^L \\
 \text{id}(1) & \xleftarrow{\text{Id}_1} & 1 \\
 \text{id}(x \tilde{\otimes} x^*) & \xrightarrow{\gamma_{x,x^*}} & \text{id}(x) \otimes \text{id}(x^*) \\
 \text{id}(\text{ev}_x^L) \downarrow & & \downarrow \text{ev}_{\text{id}(x)}^L \\
 \text{id}(1) & \xleftarrow{\text{Id}_1} & 1
 \end{array}$$

このようにして得られる rigid なモノイダル圏  $(\mathcal{G}, \tilde{\otimes}, 1, \tilde{a}, \tilde{l}, \tilde{r}, \tilde{\text{ev}}^L, \tilde{\text{coev}}^L)$  は明らかにコヒーレントな 2 群であり、2 群の準同型  $(\text{id}, \text{Id}_1, \{\gamma_{x,y}\})$  がもとのコヒーレントな 2 群  $(\mathcal{G}, \tilde{\otimes}, 1, \tilde{a}, \tilde{l}, \tilde{r}, \tilde{\text{ev}}^L, \tilde{\text{coev}}^L)$  との同型

<sup>\*10</sup> 下地になる圏  $\mathcal{G}$  と単位対象 1 は同じものをとる。

を与える．具体的に

$$x \tilde{\otimes} y := \begin{cases} y, & x = 1 \\ x, & y = 1 \\ 1, & x = y^* \\ 1, & y = x^* \\ x \otimes y, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\gamma_{x,y} := \begin{cases} l_y^{-1}, & x = 1 \\ r_x^{-1}, & y = 1 \\ \text{ev}_y^L, & x = y^* \\ \text{coev}_x^L, & y = x^* \\ \text{Id}_{x \otimes y}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

と選ぶことで，上述の構成で  $\tilde{l}, \tilde{r}, \text{ev}^L, \text{coev}^L$  を全て恒等自然変換にすることができる．

ところで，選択公理を認めると，任意の圏  $\mathcal{G}$  は骨格的な充満部分圏  $\text{sk}(\mathcal{G})$  を持つ． $\mathcal{G}$  を  $\text{sk}(\mathcal{G})$  と同一視することで証明が完了する． ■

命題 1.6 により，コヒーレントな 2 群の分類は特別な 2 群の分類と一致する．

#### 命題 1.7: 2 群の分類

特別な 2 群  $(\mathcal{G}, \otimes, 1, a)$  は以下のデータの組  $(G, H, \alpha, a)$  と 1 対 1 対応する：

- 群  $G$
- 可換群  $H$
- 群作用  $\alpha: G \longrightarrow H$
- 正規化された 3-コサイクル  $a \in Z_{\text{Grp}}^3(G; H)$

証明 特別な 2 群  $(\mathcal{G}, \otimes, 1, a)$  を与える． $\mathcal{G}$  は骨格的なので，その 1-射の集合は  $\otimes$  に関して群をなす．

$$G := \text{Ob}(\mathcal{G})$$

とおく．

$\forall h, h' \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(1, 1)$  に対して， $\otimes$  の関手性から

$$\begin{aligned} h \otimes h' &= (h \circ \text{Id}_1) \otimes (\text{Id}_1 \circ h') \\ &= (h \otimes \text{Id}_1) \circ (\text{Id}_1 \otimes h') \\ &= h \circ h' \\ &= (\text{Id}_1 \otimes h) \circ (h' \otimes \text{Id}_1) \\ &= (\text{Id}_1 \circ h') \otimes (h \circ \text{Id}_1) \\ &= h' \otimes h \end{aligned}$$

が成り立つ．命題 1.5-(2) の証明と同様の議論により  $\otimes$  に関する逆元も存在するので，

$$H := \text{Hom}_{\mathcal{G}}(1, 1)$$

は  $\otimes$  に関して可換群をなす．

ここで、写像

$$\alpha: G \longrightarrow \text{Aut}(H), g \longmapsto (h \longmapsto (\text{Id}_g \otimes h) \otimes \text{Id}_{g*})$$

を考える。⊗ の関手性により α は群準同型である。

最後に、 $\mathcal{G}$  が骨格的であることから associator が

$$a_{g_1, g_2, g_3} \in \text{Hom}_{\mathcal{G}}(g_1 \otimes g_2 \otimes g_3, g_1 \otimes g_2 \otimes g_3)$$

のように自己同型になることに注意する。ここから

$$a: G^{\times 3} \longrightarrow H, (g_1, g_2, g_3) \longmapsto a_{g_1, g_2, g_3} \otimes (\text{Id}_{(g_1 \otimes g_2 \otimes g_3)^*})$$

のように定義すると、pentagon identity から  $a \in Z_{\text{Grp}}^3(G; H)$  が分かり、triangle identity から  $g_1, g_2, g_3$  のうち少なくとも1つが 1 であるときに  $a(g_1, g_2, 1) = \text{Id}_1$  が成り立つことが分かる。■

## 1.6 3-群

### 1.6.1 3-圏

一般の 3-圏は associator, unitors のせいで扱いが難しいので、まずは**厳密な 3-圏** (strict 3-group) を考える。Cat を【例 1.2.1】の方法で**モノイダル圏**と見做す。定義 1.37 から、**2-圏**としての同値

$$\text{Str2Cat} \cong \text{Cat-Cat}$$

が成り立つ。さらに Cat-Cat は直積に関して**モノイダル圏**になる。

#### 定義 1.45: 厳密な 3-圏

**厳密な 2-圏**が成す 2-圏 Cat-Cat を**モノイダル圏**と見做す。このとき **Cat-Cat-豊稜圏**のことを**厳密な 3-圏** (strict 3-category) と呼ぶ。

### 1.6.2 2-crossed module と厳密な 3-群

#### 定義 1.46: 厳密な 3-群

厳密な 3-圏  $\mathcal{G}$  であって、ただ 1 つの対象を持ち、1-射、2-射、3-射が厳密に可逆であるものを**厳密な 3-群** (strict 3-group) と呼ぶ。

### 定義 1.47: 2-交差加群

**2-交差加群** (2-crossed module) とは, 以下のデータからなる :

- 群の正規複体  $G_3 \xrightarrow{\partial_2} G_2 \xrightarrow{\partial_1} G_1$
- 群の左作用  $\alpha_1: G_1 \longrightarrow \text{Aut}(G_2)$ ,  $\alpha_2: G_1 \longrightarrow \text{Aut}(G_3)$
- **Peiffer lifting** と呼ばれる写像  $\{-, -\}: G_2 \times G_2 \longrightarrow G_3$

これらは以下の条件を充たす :

**(2CM1)**  $\partial_1, \partial_2$  は  $G_1$ -同変

**(2CM2)**  $\forall g_2, h_2 \in G_2$  に対して

$$\partial_2\{g_2, h_2\} = \alpha_1(g_2)(h_2)g_2h_2^{-1}g_2^{-1}$$

**(2CM3)**  $\forall g_3, h_3 \in G_3$  に対して

$$\{\partial_2g_3, \partial_2h_3\} = [h_3, g_3]$$

**(2CM4)**  $\forall g_2 \in G_2, g_3 \in G_3$  に対して

$$\{g_2, \partial_2g_3\}\{\partial_2g_3, g_2\} = \alpha_2(\partial_1(g_2))(g_3)g_3^{-1}$$

**(2CM5)**  $\forall g_2, h_2, k_2 \in G_2$  に対して

$$\begin{aligned}\{g_2, h_2k_2\} &= \{g_2, h_2\}\{\partial_2\{g_2, k_2\}, g_2h_2g_2^{-1}\}\{g_2, k_2\} \\ \{g_2h_2, k_2\} &= \alpha_2(\partial_1(g_2))(\{h_2, k_2\})\{g_2, h_2k_2h_2^{-1}\}\end{aligned}$$

**(2CM6)**  $\forall g_1 \in G_1, \forall g_2, h_2 \in G_2$  に対して

$$\alpha_2(g_1)(\{g_2, h_2\}) = \{\alpha_1(g_1)(g_2), \alpha_1(g_1)(h_2)\}$$