



# Correction 22-23 s1 2 | Poba Stat

2026-01-07

**F. B**  
Universite de Montpellier  
2025  
*M1*

## Contents

I.	Exercice 1 .....	3
I.1.	.....	3
I.2.	.....	3
I.3.	.....	3
I.4.	.....	4
II.	.....	5
III.	.....	5
IV.	.....	5

## I. Exercice 1

- 1000kg
- $m = 75\text{kg}$
- $\sigma = 4\text{kg}$
- dépasse pas  $10^{-6} = \text{risque tolere}$

### I.1.

$$X \sim N(75, 4)$$

$Y_n$  représente le poids de  $n$  personnes :

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

D'après les propriétés de la loi Normale (la somme de variables normales indépendantes est une variable normale) :

- Espérance =  $E(Y_n) = n \times E(X_i) = n \times 75 = 75n$
- Variance =  $V(Y_n) = n \times V(X_i) = n \times 4^2 = 16n$
- Ecart Type =  $\sqrt{16n} = 4\sqrt{n}$

Donc

$$Y_n \sim N(75n, 16n)$$

### I.2.

On regarde le tableau et pour  $10^{-6}$  on a 4.7534.

Donc on cherche :

$$P(T > t) \leq 4.75$$

$$1 - P(T < t) \leq 4.75$$

$$P(T < t) \geq 4.75$$

On cherche  $t \geq 4.75$

### I.3.

Le "risque de surcharge" correspond à la probabilité que le poids total  $Y_n$  dépasse la charge maximale de 1000 kg. On veut que :

$$P(Y_n > 1000) \leq 10^{-6}$$

On centre et réduit la variable  $Y_n$  pour utiliser la loi normale standard  $T$  :

$$P\left(\frac{Y_n - 75n}{4\sqrt{n}} > \frac{1000 - 75n}{4\sqrt{n}}\right) \leq 10^{-6}$$

Qui revient d'écrire

$$P\left(T > \frac{1000 - 75n}{4\sqrt{n}}\right) \leq 10^{-6}$$

Or d'après la question 2 on peut écrire

$$\frac{1000 - 75n}{4\sqrt{n}} \geq 4.75$$

C'est ça la condition finale

I.4.

$$x = \sqrt{n}$$

$$\frac{1000 - 75n}{4\sqrt{n}} \geq 4.75$$

$$\frac{1000 - 75x^2}{4x} \geq 4.75$$

$$1000 - 75x^2 \geq 4.75 \times 4x$$

$$1000 - 75x^2 \geq 19x$$

$$75x^2 + 19x - 1000 \leq 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \times a \times c$$

$$\Delta = (19)^2 - (4 \times 75 \times -1000)$$

$$\Delta = 300361x^2$$

$$\Delta \approx 548$$

$$\text{comme } \sqrt{\Delta} > 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-19 + 548}{2 \times 75}$$

$$x_2 = \frac{-19 - 548}{2 \times 75}$$

$$x_1 = 3.52$$

$$x_2 = -3.78$$

Donc on cherche  $x \leq 3.52$ , or  $x = \sqrt{n}$ , donc on cherche  $n \leq 3.52^2 \leq 12.39$ . Comme  $n$  doit être un nombre entier de personnes, on arrondit à l'entier inférieur. On peut autoriser au maximum 12 personnes dans l'ascenseur.

## II.

Pour tester la moyenne d'une population inconnue à partir d'un échantillon aléatoire  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ , la statistique la plus naturelle est la Moyenne Empirique de l'échantillon. On la note  $\bar{X}$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- Esperence =  $E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \times (\mu \times n) = \mu$
- Variance =  $V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) = \frac{1}{n^2} (n \times \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$

Car toutes les observations ont la même variance  $\sigma^2$  et toutes les observations  $X_i$  viennent de la même population, elles ont la même moyenne  $\mu$  ( $E(X_i) = \mu$ ).

## III.

Les tests statistiques paramétriques permettent de comparer la moyenne d'un échantillon à une valeur théorique.

## IV.

L'erreur de première espèce est définie comme la probabilité de rejeter  $H_0$  alors qu'elle est vraie.