

AshaMitra — Live Engine Rulebook

The exact rules the app runs to decide ● Green / ● Yellow / ● Red — generated from `asha_engine.json` for clinical sign-off.

Engine asha_cdss_engine_v2

Version 2.3.0-draft

6 modules

117 rules

Deterministic

Red-lock

⚠ **59 rules are DRAFT (clinical_sign_off_pending).** They are live in the app but **not clinically validated** — each must be reviewed and approved by the AIH&PH / WB Health Secretariat clinical committee. Look for the **DRAFT · SIGN-OFF** tag.

How the engine decides

Deterministic, offline, no LLM in the decision. Evaluation order: **hard_stop** → **combination_rules** → **numeric_rules** → **risk_score**; first hard-stop locks **RED** (never downgraded); fallback **GREEN**.

Answer model (graded)

Worker answer	Meaning	Effect
হ্যাঁ / yes	danger sign present	fires the rule (usually RED)
খুব কম / অনেক / একবার (severe)	severe degree	fires the rule, same as yes
মাঝে মাঝে / কিছুটা / একটু (mild)	intermittent / partial	at least YELLOW
না / no	absent	does not fire
নিশ্চিত না / unsure	worker not certain	blocks GREEN → at least YELLOW

Patient-profile adaptive layer (escalation only — never downgrades)

Using the beneficiary profile + prior visits: newborn < 7 days and infant < 3 months escalate any YELLOW → RED; maternal age < 18 or > 35, a prior RED outcome, or ≥ 2 missed ANC escalate GREEN → YELLOW. With no patient selected (urgent walk-in) the engine applies no profile escalation and the rule-based band stands.

Bands → referral

Band	Action	Referral
GREEN	Home care. Routine follow-up.	None
YELLOW	Refer to PHC within 24 h.	PHC within 24 h
RED	Call 108. Refer FRU/SNCU/DH immediately.	FRU / SNCU / DH immediately

1. 🧒 Newborn Checkup (0–28 days)

নবজাতক চেকআপ (০-২৮ দিন) Module **newborn** 10 questions · 24 rules · **12 draft**

ID	প্রশ্ন (BN)	Question (EN)	Answers
n1	শিশু বুকের দুধ খেতে পারছে না?	Is the baby unable to breastfeed?	হ্যাঁ · না
n2	শিশুর শরীরে জ্বর আছে?	Does the baby have fever?	হ্যাঁ · না
n3	শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বা কষ্টকর?	Is breathing fast or difficult?	হ্যাঁ · না
n4	নাভি লাল, ফোলা বা পুঁজ আছে?	Is the navel red, swollen, or has pus?	হ্যাঁ · না
n5	শিশু অনেক কম নড়ছে বা নিশ্চৈতন্য?	Is the baby lethargic or not moving?	হ্যাঁ · না
n6	ত্বক হলুদ বা নীলাভ দেখাচ্ছে?	Does the skin look yellow or bluish?	হ্যাঁ · না
n7	শিশুর খিঁচুনি বা অস্বাভাবিক নড়াচড়া হয়েছে?	Has the baby had convulsions or abnormal movements?	হ্যাঁ · না
n8	শিশুর শরীর ঠান্ডা লাগছে বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম গরম?	Is the baby cold to touch / colder than normal (hypothermia)?	হ্যাঁ · না
n9	ত্বকে অনেক ফুসকুড়ি/পুঁজভরা ফোঁসা, বা কান থেকে পুঁজ পড়ছে?	Many skin pustules / pus-filled blisters, or pus draining from ear?	হ্যাঁ · না
n10	মাথার নরম অংশ (তালু) ফুলে উঠছে?	Is the soft spot on the head (fontanelle) bulging?	হ্যাঁ · না

NB-001

RED

HARD-STOP

→ **SNCU / FRU immediately**

IF "Is the baby unable to breastfeed?" = **Yes**

ACTION PSBI hard-stop. Refer SNCU/FRU immediately.

PSBI হার্ড-স্টপ। এখনই SNCU/FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Possible neonatal sepsis

DANGER SIGNS Poor feeding

NB-002

RED

HARD-STOP

→ **SNCU / FRU immediately**

IF "Does the baby have fever?" = **Yes**

ACTION PSBI hard-stop. Any fever in newborn is a danger sign.

PSBI হার্ড-স্টপ। যেকোনো জ্বর নবজাতকের জন্য বিপদচিহ্ন।

SUSPECTED Neonatal fever / sepsis

DANGER SIGNS Fever

NB-003

RED

HARD-STOP

→ **SNCU / FRU immediately**

IF "Is breathing fast or difficult?" = **Yes**

ACTION PSBI hard-stop. Count RR — $\geq 60/\text{min}$ = severe.

PSBI হার্ড-স্টপ। শ্বাসের হার গণনা করুন — $\geq 60/\text{মিনিট}$ = গুরুতর।

SUSPECTED Respiratory distress

DANGER SIGNS Breathing difficulty

NB-004 **RED** **HARD-STOP**

→ FRU / DH immediately

IF "Is the navel red, swollen, or has pus?" = **Yes****ACTION** Omphalitis can progress to sepsis within hours.

ওম্ফালাইটিস কয়েক ঘণ্টায় সেপসিসে পরিণত হতে পারে।

SUSPECTED Omphalitis**DANGER SIGNS** Umbilical infection**NB-005** **RED** **HARD-STOP**

→ SNCU / FRU immediately

IF "Is the baby lethargic or not moving?" = **Yes****ACTION** PSBI hard-stop. Lethargy = severe systemic illness.

PSBI হার্ড-স্টপ। নিস্তেজতা = গুরুতর সিস্টেমিক অসুস্থতা।

SUSPECTED Possible neonatal sepsis**DANGER SIGNS** Lethargy**NB-006** **RED** **HARD-STOP**

→ SNCU / FRU immediately

IF "Does the skin look yellow or bluish?" = **Yes****ACTION** Cyanosis or jaundice within 24 h = refer SNCU immediately.

সায়ানোসিস বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জন্ডিস = এখনই SNCU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Jaundice / Cyanosis**DANGER SIGNS** Skin colour change**NB-007** **RED** **HARD-STOP**

→ SNCU / FRU immediately

IF "Has the baby had convulsions or abnormal movements?" = **Yes****ACTION** PSBI hard-stop. Convulsions = serious neurological danger sign. Refer SNCU immediately.

PSBI হার্ড-স্টপ। খিঁচুনি = গুরুতর নিউরোলজিক বিপদচিহ্ন। এখনই SNCU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Neonatal seizures · Possible sepsis / meningitis**DANGER SIGNS** Convulsions**NB-008** **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ SNCU / FRU immediately

IF "Is the baby cold to touch / colder than normal (hypothermia)?" = **Yes****ACTION** PSBI hard-stop. Keep warm (skin-to-skin/kangaroo care), cover head. Refer SNCU/FRU immediately. Hypothermia is a major neonatal killer.PSBI হার্ড-স্টপ। শরীর গরম রাখুন (ত্বক-থেকে-ত্বক/ক্যাঙ্গারু কেয়ার), মাথা ঢেকে রাখুন। এখনই SNCU/FRU-তে রেফার করুন।
হাইপোথার্মিয়া নবজাতকের বড় ঝুঁকি।**SUSPECTED** Neonatal hypothermia**DANGER SIGNS** Hypothermia · Cold to touch**NB-010** **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH immediately

IF "Many skin pustules / pus-filled blisters, or pus draining from ear?" = **Yes****ACTION** Many pustules/pus-filled blisters or ear pus = PSBI local bacterial infection. Refer FRU/DH immediately.

অনেক ফুসকুড়ি/পুঁজভরা ফোঁসা বা কানে পুঁজ = PSBI স্থানীয় ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Local bacterial infection (PSBI)**DANGER SIGNS** Skin pustules · Ear discharge

NB-011 **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ SNCU / FRU immediately

IF "Is the soft spot on the head (fontanelle) bulging?" = **Yes****ACTION** Bulging fontanelle = possible meningitis. Refer SNCU/FRU immediately.

মাথার তালু ফুলে থাকা = মেনিনজাইটিসের সম্ভাবনা। এখনই SNCU/FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Meningitis**DANGER SIGNS** Bulging fontanelle**NB-COMB-001** **RED** **COMBINATION****IF** "Does the baby have fever?" = **Yes** **AND** "Is breathing fast or difficult?" = **Yes****ACTION** Fever + breathing difficulty = severe PSBI. Refer immediately.

জ্বর + শ্বাসকষ্ট = গুরুতর PSBI। এখনই রেফার করুন।

SUSPECTED Severe PSBI**DANGER SIGNS** Fever · Breathing difficulty**NB-COMB-002** **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** "Does the skin look yellow or bluish?" = **Yes** **AND** "Is the baby unable to breastfeed?" = **Yes****ACTION** Jaundice + poor feeding = kernicterus risk. Refer SNCU immediately.

জন্ডিস + দুধ খাচ্ছে না = কানিকটেরাসের ঝুঁকি। এখনই SNCU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Severe jaundice / kernicterus risk**DANGER SIGNS** Jaundice · Poor feeding**NB-COMB-003** **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** "Is the baby lethargic or not moving?" = **Yes** **AND** "Is breathing fast or difficult?" = **Yes****ACTION** Lethargy + breathing difficulty = severe sepsis. Refer SNCU immediately.

নিশ্বেজতা + শ্বাসকষ্ট = গুরুতর সেপসিস। এখনই SNCU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Severe neonatal sepsis**DANGER SIGNS** Lethargy · Breathing difficulty**NB-COMB-004** **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** "Is the navel red, swollen, or has pus?" = **Yes** **AND** "Does the baby have fever?" = **Yes****ACTION** Umbilical infection + fever = systemic sepsis risk. Give first dose amoxicillin, refer SNCU.

নাভি সংক্রমণ + জ্বর = সিস্টেমিক সেপসিসের ঝুঁকি। প্রথম ডোজ amoxicillin দিয়ে SNCU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Omphalitis with systemic sepsis**DANGER SIGNS** Umbilical infection · Fever**NB-COMB-005** **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** "Is the baby unable to breastfeed?" = **Yes** **AND** "Does the baby have fever?" = **Yes****ACTION** Not feeding + fever = PSBI confirmed. First dose amoxicillin + IM gentamicin, refer SNCU.

দুধ না খাওয়া + জ্বর = PSBI নিশ্চিত। প্রথম ডোজ amoxicillin + IM gentamicin, এখনই SNCU।

SUSPECTED Possible serious bacterial infection (PSBI)**DANGER SIGNS** Poor feeding · Fever

NB-VITAL-001 **RED** **MEASUREMENT****IF** spo2 < 90**ACTION** SpO2 < 90% — critical hypoxia.

SpO2 < 90% — অক্সিজেন স্যাচুরেশন বিপজ্জনক।

DANGER SIGNS Low SpO2**NB-VITAL-002** **RED** **MEASUREMENT****IF** respiratory_rate ≥ 60**ACTION** RR ≥ 60/min — severe tachypnoea.

শ্বাসের হার ≥ ৬০/মিনিট — গুরুতর।

DANGER SIGNS Fast breathing**NB-VITAL-003** **RED** **MEASUREMENT****IF** temperature_c ≥ 37.5**ACTION** Temp ≥ 37.5°C — danger sign in newborn.

জ্বর ≥ ৩৭.৫°C — নবজাতকের জন্য বিপদচিহ্ন।

DANGER SIGNS Fever**NB-VITAL-004** **RED** **MEASUREMENT****IF** weight_kg < 1.5**ACTION** Weight < 1.5 kg — VLBW. Start KMC, refer SNCU immediately.

ওজন < ১.৫ কেজি — খুব কম ওজন (VLBW)। কান্সার মাদার কেয়ার শুরু করুন, এখনই SNCU-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Low birth weight**NB-VITAL-005** **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** temperature_c < 35.5**ACTION** Temp < 35.5°C — hypothermia. Start kangaroo mother care, refer SNCU.

তাপমাত্রা < ৩৫.৫°C — হাইপোথার্মিয়া। কান্সার মাদার কেয়ার শুরু করুন, SNCU-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Hypothermia**NB-VITAL-006** **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** heart_rate > 180**ACTION** HR > 180/min — severe tachycardia. Refer SNCU.

হৃদস্পন্দন > ১৮০/মিনিট — গুরুতর ট্যাকিকার্ডিয়া। SNCU-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Tachycardia**NB-VITAL-007** **YELLOW** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** weight_kg between [1.8–2.5]**ACTION** Weight 1.8–2.5 kg — LBW. KMC, breastfeed every 2 h.

ওজন ১.৮–২.৫ কেজি — কম ওজন (LBW)। কান্সার কেয়ার, প্রতি ২ ঘণ্টায় বুকের দুধ।

DANGER SIGNS Low birth weight

NB-VITAL-008**RED****MEASUREMENT****DRAFT · SIGN-OFF****IF** `weight_kg` < **1.8****ACTION** Weight < 1.8 kg — HBNC referral threshold. KMC + expressed breast milk + refer SNCU.

ওজন < ১.৮ কেজি — HBNC থ্রেশহোল্ড: কাস্টার মাদার কেয়ার + ব্যক্তি স্তন্যদুগ্ধ + SNCU-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Very low birth weight**NB-VITAL-009****YELLOW****MEASUREMENT****DRAFT · SIGN-OFF****IF** `temperature_c` between **[35.5–36.4]****ACTION** Temp 35.5–36.4°C — cold stress. KMC, warm the room, recheck in 1 hour.

তাপমাত্রা ৩৫.৫–৩৬.৪°C — কোল্ড স্ট্রেস। কাস্টার মাদার কেয়ার, ঘর গরম রাখুন, ১ ঘণ্টা পর পুনরায় মাপুন।

DANGER SIGNS Cold stress**RISK-SCORE BANDS** GREEN 0–2 · YELLOW 3–5 · RED 6–100

2. 🧒 Child Health Check (2 months–5 years)

শিশু স্বাস্থ্য যাচাই (২ মাস–৫ বছর) Module **child** 12 questions · 25 rules · **13 draft**

ID	প্রশ্ন (BN)	Question (EN)	Answers
c1	পাঁচ দিনের বেশি জ্বর চলছে?	Has fever lasted more than 5 days?	হ্যাঁ · না
c2	কাশি বা শ্বাসকষ্ট আছে?	Is there cough or breathing difficulty?	হ্যাঁ · না
c3	ডায়রিয়া বা বারবার বমি হচ্ছে?	Is there diarrhoea or repeated vomiting?	হ্যাঁ · না
c4	শিশু খেতে একদম অস্বীকার করছে?	Is the child completely refusing to eat?	হ্যাঁ · না
c5	পানিশূন্যতার লক্ষণ (চোখ গর্তে, ঠোঁট শুকনো)?	Signs of dehydration — sunken eyes, dry lips?	হ্যাঁ · না
c6	ওজন বয়সের তুলনায় অনেক কম?	Is weight much less than expected for age?	হ্যাঁ · না
c7	শিশুর খিঁচুনি হয়েছে বা হচ্ছে?	Has the child had convulsions or fits?	হ্যাঁ · না
c8	শিশু অস্বাভাবিকভাবে ঘুমন্ত, নিস্তেজ বা অজ্ঞান?	Is the child abnormally sleepy, lethargic, or unconscious?	হ্যাঁ · না
c9	যা-ই খাচ্ছে সব বমি করে ফেলছে?	Does the child vomit everything?	হ্যাঁ · না
c10	ঘাড় শক্ত, আলোয় কষ্ট, বা জ্বরসহ প্রচণ্ড মাথাব্যথা?	Stiff neck, light sensitivity, or severe headache with fever?	হ্যাঁ · না
c11	পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে?	Is there blood in the stool (dysentery)?	হ্যাঁ · না
c12	হাতের তালু বা চোখের পাতা খুব ফ্যাকাশে?	Are the palms or inner eyelids very pale (anaemia)?	হ্যাঁ · না

CH-001 **RED** **HARD-STOP**

→ **PHC / DH same day**

IF "Has fever lasted more than 5 days?" = **Yes**

ACTION Refer PHC/DH same day. Rule out malaria, typhoid, dengue.

একই দিনে PHC/DH-তে রেফার করুন। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গু বাদ দিন।

SUSPECTED Prolonged fever — malaria / typhoid / dengue

DANGER SIGNS Fever > 5 days

CH-005 **RED** **HARD-STOP**

→ **FRU immediately**

IF "Signs of dehydration — sunken eyes, dry lips?" = **Yes**

ACTION Severe dehydration. Start ORS. Refer FRU for IV fluids.

গুরুতর পানিশূন্যতা = RED। এখনই ORS শুরু করুন। IV তরলের জন্য FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Severe dehydration

DANGER SIGNS Sunken eyes · Dry lips

CH-007 **RED** **HARD-STOP**

→ **FRU / DH immediately**

IF "Has the child had convulsions or fits?" = **Yes**

ACTION Convulsions = IMNCI general danger sign. Place child on side, put nothing in mouth, refer FRU immediately.

খিঁচুনি = IMNCI সাধারণ বিপদচিহ্ন। শিশুকে কাত করে শোয়ান, কিছু মুখে দেবেন না, এখনই FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Seizure · Meningitis / cerebral malaria

DANGER SIGNS Convulsions

CH-008**RED****HARD-STOP**

→ FRU / DH immediately

IF "Is the child abnormally sleepy, lethargic, or unconscious?" = **Yes****ACTION** Lethargy or unconsciousness = IMNCI general danger sign. Refer FRU immediately.

নিশ্বেজতা বা অজ্ঞানতা = IMNCI সাধারণ বিপদচিহ্ন। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Severe systemic illness · Shock / sepsis**DANGER SIGNS** Lethargy · Unconscious**CH-009****RED****HARD-STOP****DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH immediately

IF "Does the child vomit everything?" = **Yes****ACTION** Vomiting everything = IMNCI general danger sign. Cannot keep anything down — refer FRU/DH immediately.

সব বমি করে ফেলা = IMNCI সাধারণ বিপদচিহ্ন। মুখে কিছু রাখতে পারছে না — এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Unable to retain feeds · Possible serious illness**DANGER SIGNS** Vomits everything**CH-010****RED****HARD-STOP****DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH immediately

IF "Stiff neck, light sensitivity, or severe headache with fever?" = **Yes****ACTION** Stiff neck/severe headache with fever = possible meningitis/encephalitis. Call 108, refer FRU/DH immediately.

ঘাড় শক্ত/জ্বরসহ প্রচণ্ড মাথাব্যথা = মেনিনজাইটিস/এনসেফালাইটিসের সম্ভাবনা। ১০৮ কল করুন, এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Meningitis · Encephalitis**DANGER SIGNS** Neck stiffness · Severe headache with fever**CH-COMB-001****RED****COMBINATION****IF** "Is there cough or breathing difficulty?" = **Yes AND** "Signs of dehydration — sunken eyes, dry lips?" = **Yes****ACTION** Breathing difficulty + dehydration = critical. Refer FRU immediately.

শ্বাসকষ্ট + পানিশূন্যতা = গুরুতর। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Severe pneumonia with dehydration**DANGER SIGNS** Breathing difficulty · Dehydration**CH-COMB-002****RED****COMBINATION****DRAFT · SIGN-OFF****IF** "Has fever lasted more than 5 days?" = **Yes AND** "Is there cough or breathing difficulty?" = **Yes****ACTION** Fever > 5 days + cough = possible pneumonia or malaria. Refer PHC today.

জ্বর > ৫ দিন + কাশি = সম্ভাব্য নিউমোনিয়া বা ম্যালেরিয়া। আজই PHC-তে নিয়ে যান।

SUSPECTED Pneumonia · Malaria**DANGER SIGNS** Prolonged fever · Cough**CH-COMB-003****RED****COMBINATION****DRAFT · SIGN-OFF****IF** "Is there diarrhoea or repeated vomiting?" = **Yes AND** "Is the child completely refusing to eat?" = **Yes****ACTION** Diarrhoea + refusal to eat = severe dehydration risk. Start ORS, refer FRU.

ডায়রিয়া + খেতে অস্বীকার = গুরুতর পানিশূন্যতার ঝুঁকি। ORS শুরু করুন, FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Severe dehydration with feeding refusal**DANGER SIGNS** Diarrhoea · Feeding refusal

CH-COMB-004 **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF “Is there diarrhoea or repeated vomiting?” = **Yes** **AND** “Signs of dehydration — sunken eyes, dry lips?” = **Yes**

ACTION Diarrhoea + dehydration signs = IMNCI Plan C. Refer FRU immediately for IV fluids, continue ORS en route.

ডায়রিয়া + পানিশূন্যতার লক্ষণ = IMNCI Plan C। এখনই IV তরলের জন্য FRU-তে রেফার করুন, ORS পথে দিতে থাকুন।

SUSPECTED Severe dehydration (IMNCI Plan C)

DANGER SIGNS Diarrhoea · Dehydration

CH-VITAL-001 **RED** **MEASUREMENT**

IF **spo2** < **90**

ACTION SpO2 < 90% — critical hypoxia.

SpO2 < 90% — গুরুতর হাইপক্সিয়া।

DANGER SIGNS Low SpO2

CH-VITAL-002 **RED** **MEASUREMENT**

IF **muac_cm** < **11.5**

ACTION MUAC < 11.5 cm = SAM. Refer NRC.

MUAC < ১১.৫ সেমি = SAM। NRC-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Severe wasting

CH-VITAL-003 **YELLOW** **MEASUREMENT**

IF **muac_cm** between [**11.5–12.5**]

ACTION MUAC 11.5–12.5 cm = MAM. Refer ICDS.

MUAC ১১.৫–১২.৫ সেমি = MAM। ICDS-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Moderate wasting

CH-VITAL-004 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF **respiratory_rate** ≥ **50**

ACTION RR ≥ 50/min (2 mo–1 y) = severe pneumonia. Refer FRU.

শ্বাসের হার ≥ ৫০/মিনিট (২ মাস–১ বছর) = গুরুতর নিউমোনিয়া।

DANGER SIGNS Tachypnoea

CH-VITAL-005a **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF **temperature_c** ≥ **40**

ACTION Temp ≥ 40°C = hyperpyrexia. Refer FRU, test for malaria.

তাপমাত্রা ≥ ৪০°C = হাইপারপায়রেক্সিয়া। FRU-তে রেফার করুন, ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করুন।

DANGER SIGNS Very high fever (≥40°C)

CH-VITAL-005b **YELLOW** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF **temperature_c** between [**39–40**]

ACTION Temp 39–40°C = high fever. Refer PHC, give paracetamol.

তাপমাত্রা ৩৯–৪০°C = উচ্চ জ্বর। PHC-তে রেফার করুন, প্যারাসিটামল দিন।

DANGER SIGNS High fever (39–40°C)

CH-VITAL-006 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF `weight_for_age_z` < -3

ACTION WFA Z-score < -3 = severe underweight. Refer NRC.

WFA Z-স্কোর < -৩ = গুরুতর কম ওজন। NRC-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Severe underweight

CH-VITAL-007 **YELLOW** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF `respiratory_rate` ≥ 40

ACTION RR ≥ 40/min (child 1–5 y) = possible pneumonia. Refer PHC within 24 h. Chest indrawing = RED.

শ্বাসের হার ≥ ৪০/মিনিট (১–৫ বছর শিশু) = সম্ভাব্য নিউমোনিয়া। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC-তে নিয়ে যান। বুকে ইন্ড্রয়িং থাকলে = RED।

DANGER SIGNS Fast breathing (older child)

CH-VITAL-008 **YELLOW** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF `spo2` between [90–94]

ACTION SpO2 90–94% = moderate hypoxia. Refer PHC, prepare oxygen.

SpO2 ৯০–৯৪% = মাঝারি হাইপক্সিয়া। PHC-তে রেফার করুন, অক্সিজেন প্রস্তুত রাখুন।

DANGER SIGNS Moderate hypoxia

CH-002 **YELLOW** **SCORED**

→ PHC within 24 h

IF “Is there cough or breathing difficulty?” = **Yes**

ACTION Count RR. Chest indrawing = RED. Refer PHC within 24 h.

শ্বাসের হার গণনা করুন। বুকে ইন্ড্রয়িং = RED।

SUSPECTED Pneumonia

DANGER SIGNS Cough / breathing difficulty

CH-003 **YELLOW** **SCORED**

→ PHC within 24 h

IF “Is there diarrhoea or repeated vomiting?” = **Yes**

ACTION Assess dehydration. Start ORS. Refer PHC within 24 h.

পানিশূন্যতা মূল্যায়ন করুন। ORS শুরু করুন।

SUSPECTED Diarrhoea / vomiting

DANGER SIGNS Diarrhoea · Vomiting

CH-004 **YELLOW** **SCORED**

→ PHC within 24 h

IF “Is the child completely refusing to eat?” = **Yes**

ACTION Assess illness cause. Refer PHC within 24 h.

অসুস্থতার কারণ মূল্যায়ন করুন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC।

SUSPECTED Feeding refusal

DANGER SIGNS Not eating

CH-006 **YELLOW** **SCORED**

→ ICDS / NRC if SAM

IF “Is weight much less than expected for age?” = **Yes**

ACTION Measure MUAC. < 11.5 cm = SAM → RED, refer NRC.

MUAC পরিমাপ করুন। < ১১.৫ সেমি = SAM → RED।

SUSPECTED Malnutrition

DANGER SIGNS Low weight for age

CH-011**YELLOW****SCORED****DRAFT · SIGN-OFF****→ PHC within 24 h****IF** "Is there blood in the stool (dysentery)?" = **Yes****ACTION** Blood in stool = dysentery, needs antibiotics. Refer PHC within 24 h. With dehydration/lethargy = FRU.

পায়খানায় রক্ত = ডিসেন্ট্রি, অ্যান্টিবায়োটিক দরকার। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC। পানিশূন্যতা/নিশ্বেজতা থাকলে = FRU।

SUSPECTED Dysentery**DANGER SIGNS** Blood in stool**CH-012****YELLOW****SCORED****DRAFT · SIGN-OFF****→ PHC for Hb check****IF** "Are the palms or inner eyelids very pale (anaemia)?" = **Yes****ACTION** Pallor = anaemia. Refer PHC for Hb. Severe pallor = FRU (possible transfusion).

ফ্যাকাশে = রক্তাল্পতা। Hb পরীক্ষার জন্য PHC-তে রেফার করুন। গুরুতর ফ্যাকাশে = FRU (সম্ভাব্য রক্ত সঞ্চালন)।

SUSPECTED Anaemia**DANGER SIGNS** Pallor**RISK-SCORE BANDS** GREEN 0–2 · YELLOW 3–5 · RED 6–100

3. 🗣️ Pregnant Mother Checkup (ANC)

গর্ভবতী মায়ের চেকআপ Module pregnancy 13 questions · 33 rules · 20 draft

ID	প্রশ্ন (BN)	Question (EN)	Answers
p1	রক্তচাপ বেশি?	Is blood pressure high?	হ্যাঁ · না
p2	পা বা মুখ ফুলে যাচ্ছে?	Is there swelling of legs or face?	হ্যাঁ · না
p3	রক্তপাত বা তীব্র পেট ব্যথা?	Is there bleeding or severe abdominal pain?	হ্যাঁ · না
p4	শিশুর নড়াচড়া কমে গেছে?	Has the baby's movement reduced?	হ্যাঁ · না
p5	তিন মাসের বেশি ANC চেকআপ বাদ গেছে?	Has ANC checkup been missed for 3+ months?	হ্যাঁ · না
p6	চোখে ঝাপসা দেখছেন?	Is there blurred vision?	হ্যাঁ · না
p7	গর্ভাবস্থায় খিঁচুনি বা ফিট হয়েছে?	Has there been a convulsion or fit during pregnancy?	হ্যাঁ · না
p8	খুব ফ্যাকাশে, দুর্বল, বা সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে যাচ্ছেন?	Very pale, weak, or breathless on slight exertion (severe anaemia)?	হ্যাঁ · না
p9	জ্বর, বিশেষ করে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে?	Fever, especially with chills/rigors?	হ্যাঁ · না
p10	যোনিপথে হঠাৎ জল ভেঙেছে বা ক্রমাগত জল বরছে?	Sudden gush or continuous leaking of fluid (PROM)?	হ্যাঁ · না
p11	মাথা ব্যথা হচ্ছে?	Is there a headache?	হ্যাঁ · না
p11d	মাথা ব্যথা কি খুব তীব্র, ২ দিনের বেশি, বা বাড়ছে?	Is the headache very severe, lasting >2 days, or worsening?	হ্যাঁ · না
p12	মাথা ঘোরা বা দুর্বল লাগছে?	Is there dizziness or weakness?	হ্যাঁ · না

ANC-001 **RED** **HARD-STOP**

→ FRU / DH immediately

IF "Is blood pressure high?" = **Yes**

ACTION Pre-eclampsia hard-stop. Lay on left side. Refer FRU/DH immediately.

প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া হার্ড-স্টপ। বাম কাতে শোয়ান।

SUSPECTED Pre-eclampsia / Eclampsia

DANGER SIGNS High BP · Headache

ANC-003 **RED** **HARD-STOP**

→ FRU / DH immediately

IF "Is there bleeding or severe abdominal pain?" = **Yes**

ACTION APH hard-stop. Do not do vaginal examination. Refer FRU/DH immediately.

APH হার্ড-স্টপ। যোনি পরীক্ষা করবেন না।

SUSPECTED Antepartum haemorrhage

DANGER SIGNS Vaginal bleeding · Severe abdominal pain

ANC-004 **RED** **HARD-STOP**

→ FRU / DH same day

IF "Has the baby's movement reduced?" = **Yes**

ACTION Refer FRU/DH same day for fetal monitoring.

ভ্রূণের নড়াচড়া পর্যবেক্ষণের জন্য একই দিনে FRU/DH-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Reduced fetal movement

DANGER SIGNS Baby not moving

ANC-006 **RED** **HARD-STOP**

→ FRU / DH immediately

IF "Is there blurred vision?" = **Yes****ACTION** Eclampsia prodrome hard-stop. Refer FRU/DH immediately.

এক্সাম্পসিয়া প্রোড্রোম হার্ড-স্টপ।

SUSPECTED Imminent eclampsia**DANGER SIGNS** Blurred vision · Dizziness**ANC-007** **RED** **HARD-STOP**

→ FRU / DH immediately

IF "Has there been a convulsion or fit during pregnancy?" = **Yes****ACTION** Eclampsia hard-stop. Convulsion = life-threatening. Left lateral position, keep airway clear, prepare MgSO₄, refer FRU immediately.এক্সাম্পসিয়া হার্ড-স্টপ। খিঁচুনি = জীবনসংকটাপন্ন। বাম কাতে শোয়ান, শ্বাসনালী খোলা রাখুন, MgSO₄ প্রস্তুত করুন, এখনই FRU-তে রেফার করুন।**SUSPECTED** Eclampsia**DANGER SIGNS** Convulsion**ANC-008** **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH

IF "Very pale, weak, or breathless on slight exertion (severe anaemia)?" = **Yes****ACTION** Severe anaemia is a leading maternal killer. Severe pallor/breathlessness = refer FRU/DH for Hb + transfusion planning.

গুরুতর রক্তাল্পতা মাতৃমৃত্যুর বড় কারণ। গুরুতর ফ্যাকাশে/হাঁপানি = Hb পরীক্ষা ও রক্ত সঞ্চালনের পরিকল্পনার জন্য FRU/DH-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Severe anaemia in pregnancy**DANGER SIGNS** Severe pallor · Breathlessness on exertion**ANC-009** **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH immediately

IF "Fever, especially with chills/rigors?" = **Yes****ACTION** High fever/rigors in pregnancy = sepsis/malaria/chorioamnionitis risk. Refer FRU/DH immediately.

গর্ভাবস্থায় উচ্চ জ্বর/কাঁপুনি = সেপসিস/ম্যালেরিয়া/ক্রিয়োঅ্যামনিওনাইটিসের ঝুঁকি। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Maternal sepsis · Malaria in pregnancy · Chorioamnionitis**DANGER SIGNS** Fever with rigors**ANC-010** **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH

IF "Sudden gush or continuous leaking of fluid (PROM)?" = **Yes****ACTION** Sudden gush/continuous leaking = PROM, infection/preterm-labour risk. No vaginal exam, keep a clean pad, refer FRU/DH.

হঠাৎ জল ভাঙা/ক্রমাগত লিকেজ = PROM, সংক্রমণ/প্রিটার্ম প্রসবের ঝুঁকি। যোনি পরীক্ষা করবেন না, পরিষ্কার প্যাড রাখুন, FRU/DH-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Premature rupture of membranes**DANGER SIGNS** Leaking liquor**ANC-COMB-001** **RED** **COMBINATION****IF** "Is blood pressure high?" = **Yes** **AND** "Is there swelling of legs or face?" = **Yes****ACTION** High BP + oedema = pre-eclampsia. Refer FRU immediately.

উচ্চ BP + ফোলা = প্রি-এক্সাম্পসিয়া। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Pre-eclampsia**DANGER SIGNS** High BP · Oedema

ANC-COMB-002 **RED** **COMBINATION**

IF "Is there blurred vision?" = **Yes** AND "Is there swelling of legs or face?" = **Yes**

ACTION Blurred vision + oedema = imminent eclampsia.

ঝাপসা দৃষ্টি + ফোলা = আসন্ন এক্সাম্পসিয়া।

SUSPECTED Imminent eclampsia

DANGER SIGNS Blurred vision · Oedema

ANC-COMB-003 **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF "Is there bleeding or severe abdominal pain?" = **Yes** AND "Has the baby's movement reduced?" = **Yes**

ACTION Bleeding + reduced fetal movement = placental emergency. Refer FRU immediately.

রক্তপাত + শিশুর নড়াচড়া কমা = প্ল্যাসেন্টা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Placental abruption · IUGR

DANGER SIGNS Vaginal bleeding · Reduced fetal movement

ANC-COMB-004 **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF "Is blood pressure high?" = **Yes** AND "Is there blurred vision?" = **Yes**

ACTION High BP + blurred vision = severe pre-eclampsia. Prepare MgSO₄, refer FRU.

উচ্চ BP + ঝাপসা দৃষ্টি = গুরুতর প্রি-এক্সাম্পসিয়া। MgSO₄ প্রস্তুত করুন, এখনই FRU।

SUSPECTED Severe pre-eclampsia

DANGER SIGNS High BP · Blurred vision

ANC-COMB-005 **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF "Is there a headache?" = **Yes** AND "Is the headache very severe, lasting >2 days, or worsening?" = **Yes**

ACTION Severe or persistent headache = pre-eclampsia danger sign. Refer FRU/DH immediately.

তীব্র বা ক্রমাগত মাথা ব্যথা = প্রি-এক্সাম্পসিয়ার বিপদচিহ্ন। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Severe/persistent headache — pre-eclampsia

DANGER SIGNS Severe headache

ANC-COMB-006 **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF "Is there a headache?" = **Yes** AND "Is there swelling of legs or face?" = **Yes**

ACTION Headache + swelling = pre-eclampsia. Refer FRU immediately.

মাথা ব্যথা + ফোলা = প্রি-এক্সাম্পসিয়া। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Pre-eclampsia

DANGER SIGNS Headache · Oedema

ANC-VITAL-001 **RED** **MEASUREMENT**

IF `systolic_bp` ≥ 140

ACTION Systolic BP ≥ 140 mmHg — pre-eclampsia.

সিস্টোলিক BP ≥ 140 mmHg — প্রি-এক্সাম্পসিয়া।

DANGER SIGNS High BP

ANC-VITAL-002 **RED** **MEASUREMENT**

IF `diastolic_bp` ≥ 90

ACTION Diastolic BP ≥ 90 mmHg — pre-eclampsia.

ডায়াস্টোলিক BP ≥ 90 mmHg — প্রি-এক্সাম্পসিয়া।

DANGER SIGNS High BP

ANC-VITAL-003 **RED** **MEASUREMENT**

IF `haemoglobin` < 7

ACTION Hb < 7 g/dL — severe anaemia.

Hb < 7 g/dL — গুরুতর রক্তাল্পতা।

DANGER SIGNS Severe anaemia

ANC-VITAL-004 **YELLOW** **MEASUREMENT**

IF `haemoglobin` between **[7-10]**

ACTION Hb 7-10 g/dL — moderate anaemia. Increase IFA.

Hb 7-10 g/dL — মাঝারি রক্তাল্পতা। IFA বাড়ান।

DANGER SIGNS Moderate anaemia

ANC-VITAL-005 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF `systolic_bp` ≥ 160

ACTION Systolic BP ≥ 160 mmHg — severe hypertension. Prepare MgSO₄, refer FRU.

সিস্টোলিক BP ≥ 160 mmHg — গুরুতর হাইপারটেনশন। MgSO₄ প্রস্তুত করুন, এখনই FRU।

DANGER SIGNS Severe hypertension

ANC-VITAL-006 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF `urine_protein_plus` ≥ 2

ACTION Urine protein $\geq 2+$ = pre-eclampsia. Refer FRU.

প্রস্রাবে প্রোটিন 2+ বা বেশি = প্রি-এক্সাম্পসিয়া। FRU-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Proteinuria

ANC-VITAL-007 **YELLOW** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF `fundal_height_weeks_diff` > 4

ACTION Fundal height >4 weeks discrepancy = IUGR or polyhydramnios suspicion.

ফান্ডাল উচ্চতা ৪ সপ্তাহের বেশি গ্যাপ = IUGR বা পলিহাইড্রামনিয়াসের সন্দেহ।

DANGER SIGNS Abnormal fundal height

ANC-VITAL-008 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF `gestational_age_weeks` < 37

ACTION Labour pain or leaking before 37 weeks = preterm labour. Refer FRU without cervical examination if pains/leaking present.

৩৭ সপ্তাহের আগে প্রসব ব্যথা বা পানি ভাঙা = প্রিটার্ম লেবার। জরায়ুমুখ পরীক্ষা না করে এখনই FRU-তে রেফার করুন (যদি ব্যথা/লিকেজ থাকে)।

DANGER SIGNS Preterm labour

ANC-VITAL-009 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** labour_hours > 12**ACTION** Labour pain > 12 h = obstructed labour risk. Refer FRU/DH immediately.

প্রসব ব্যথা > ১২ ঘণ্টা = অবস্ট্রাকটেড লেবার ঝুঁকি। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Prolonged labour**ANC-VITAL-010** **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** leaking_hours_no_labour > 12**ACTION** Leaking > 12 h without labour = PROM with chorioamnionitis risk. Refer FRU now.

প্রসব ব্যথা ছাড়া ১২ ঘণ্টার বেশি লিকেজ = PROM-এ ক্রিয়োঅ্যামনিওনাইটিসের ঝুঁকি। এখনই FRU।

DANGER SIGNS Prolonged PROM**ANC-VITAL-011** **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** tsh_miu > 10**ACTION** TSH > 10 mIU/L = overt hypothyroidism. Start Levothyroxine 50 µg/day now, repeat TSH after 6 weeks. Critical for fetal brain development.

TSH > ১০ mIU/L = ওভার্ট হাইপোথাইরয়েডিজম। Levothyroxine ৫০ µg/দিন এখনই শুরু করুন, ৬ সপ্তাহ পর পুনরায় TSH। দ্রুপ মস্তিষ্ক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ।

DANGER SIGNS Overt hypothyroidism**ANC-VITAL-012** **YELLOW** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** tsh_miu between [2.5-10]**ACTION** TSH 2.5-10 mIU/L = subclinical hypothyroidism. Start Levothyroxine 25 µg/day, repeat TSH in 6 weeks. Target <2.5 (T1) or <3 (T2/T3).

TSH ২.৫-১০ mIU/L = সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম। Levothyroxine ২৫ µg/দিন শুরু করুন, ৬ সপ্তাহ পর TSH পুনরায়। লক্ষ্য < ২.৫ (১ম ট্রাইমেস্টার) বা < ৩ (২য়/৩য়)।

DANGER SIGNS Subclinical hypothyroidism**ANC-VITAL-013** **YELLOW** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** ogtt_2hr_mg_dl ≥ 140**ACTION** 75g OGTT 2-h PG ≥ 140 mg/dL = GDM (WHO/India criteria). Start Medical Nutrition Therapy, insulin if needed. Screen at 24-28 weeks.

৭৫g OGTT ২-ঘণ্টা PG ≥ ১৪০ mg/dL = GDM (WHO/ভারত মাপকাঠি)। Medical Nutrition Therapy শুরু করুন, প্রয়োজনে ইনসুলিন। ২৪-২৮ সপ্তাহে স্ক্রিন করুন।

DANGER SIGNS Gestational diabetes mellitus**ANC-VITAL-014** **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF****IF** fhr_bpm < 120**ACTION** FHR < 120 bpm = fetal distress. Position mother left lateral, refer FRU/DH immediately.

দ্রুপের হৃদস্পন্দন < ১২০ bpm = দ্রুপ ডিসট্রেস। মাকে বাম কাতে শোয়ান, এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Foetal bradycardia

ANC-VITAL-015**RED****MEASUREMENT****DRAFT · SIGN-OFF****IF** fhr_bpm > 160**ACTION** FHR > 160 bpm = fetal distress (maternal fever or chorioamnionitis). Refer FRU now.

স্রাবের হৃদস্পন্দন > ১৬০ bpm = স্রাব ডিসট্রেস (ম্যাটর্নাল জ্বর বা ক্রিয়োঅ্যামনিওনাইটিস)। এখনই FRU।

DANGER SIGNS Foetal tachycardia**ANC-002****YELLOW****SCORED**→ **PHC within 24 h****IF** "Is there swelling of legs or face?" = **Yes****ACTION** Isolated leg oedema. Refer PHC within 24 h for BP and urine protein.

বিচ্ছিন্ন পা ফোলা = YELLOW। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC।

SUSPECTED Oedema**DANGER SIGNS** Leg swelling**ANC-005****YELLOW****SCORED**→ **PHC within 7 days****IF** "Has ANC checkup been missed for 3+ months?" = **Yes****ACTION** Schedule ANC visit at PHC within 7 days. Check MCP card.

৭ দিনের মধ্যে PHC-তে ANC ভিজিট নির্ধারণ করুন।

SUSPECTED Missed ANC**DANGER SIGNS** No ANC visit in 3+ months**ANC-011****YELLOW****SCORED****DRAFT · SIGN-OFF**→ **PHC within 24 h****IF** "Is there a headache?" = **Yes****ACTION** Headache — refer PHC within 24 h to check BP. If severe/persistent, or with swelling/blurred vision = FRU now.

মাথা ব্যথা — রক্তচাপ মাপতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC-তে যান। তীব্র/ক্রমাগত হলে, বা ফোলা/ঝাপসা দৃষ্টির সাথে = এখনই FRU।

SUSPECTED Headache (assess for pre-eclampsia)**DANGER SIGNS** Headache**ANC-012****YELLOW****SCORED****DRAFT · SIGN-OFF**→ **PHC within 24 h****IF** "Is there dizziness or weakness?" = **Yes****ACTION** Dizziness/weakness — refer PHC for Hb + BP check (anaemia or low BP).

মাথা ঘোরা/দুর্বলতা — রক্তাল্পতা বা নিম্ন রক্তচাপের জন্য PHC-তে Hb ও BP পরীক্ষা করান।

SUSPECTED Dizziness (anaemia / hypotension)**DANGER SIGNS** Dizziness**RISK-SCORE BANDS** GREEN 0–2 · YELLOW 3–5 · RED 6–100

4. 🧑🏻 Postpartum Checkup (0–42 days)

প্রসব-পরবর্তী চেকআপ (০-৪২ দিন) Module **delivery_pnc** 9 questions · 21 rules · **9 draft**

ID	প্রশ্ন (BN)	Question (EN)	Answers
pp1	অতিরিক্ত রক্তপাত বা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব?	Is there excessive bleeding or foul-smelling discharge?	হ্যাঁ · না
pp2	জ্বর বা ঠান্ডা লাগছে?	Is there fever or chills?	হ্যাঁ · না
pp3	স্তনে ব্যথা, ফোলা বা লাল দাগ?	Is there breast pain, swelling, or red marks?	হ্যাঁ · না
pp4	পেটে তীব্র ব্যথা বা সেলাইয়ে সমস্যা?	Is there severe abdominal pain or suture problem?	হ্যাঁ · না
pp5	প্রস্রাবে জ্বালা বা কষ্ট হচ্ছে?	Is there burning or difficulty urinating?	হ্যাঁ · না
pp6	খুব দুর্বল বা মাথা ঘোরা হচ্ছে?	Is there extreme weakness or dizziness?	হ্যাঁ · না
pp7	প্রসবের পর ঝিঁচুনি বা ফিট হয়েছে?	Has there been a convulsion or fit after delivery?	হ্যাঁ · না
pp8	শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?	Is there difficulty breathing?	হ্যাঁ · না
pp9	মন খুব খারাপ, কান্না, ঘুম/খাওয়া কমে যাওয়া, বা বাচ্চার প্রতি আগ্রহ নেই?	Persistent low mood, crying, sleep/appetite loss, or no interest in the baby?	হ্যাঁ · না

PNC-001 **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH immediately

IF "Is there excessive bleeding or foul-smelling discharge?" = **Yes**

ACTION PPH hard-stop. Refer FRU/DH immediately. Bimanual uterine compression if trained.

PPH হার্ড-স্টপ। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন। বাইম্যানুয়াল জরায়ু সংকোচন প্রয়োগ করুন।

SUSPECTED Postpartum haemorrhage · Puerperal sepsis

DANGER SIGNS Excessive bleeding · Foul discharge

PNC-007 **RED** **HARD-STOP**

→ FRU / DH immediately

IF "Has there been a convulsion or fit after delivery?" = **Yes**

ACTION Postpartum eclampsia hard-stop. Convulsion = life-threatening. Left lateral, keep airway clear, prepare MgSO₄, refer FRU immediately.

প্রসব-পরবর্তী এক্সাম্পসিয়া হার্ড-স্টপ। ঝিঁচুনি = জীবনসংকটাপন্ন। বাম কাতে শোয়ান, শ্বাসনালী খোলা রাখুন, MgSO₄ প্রস্তুত করুন, এখনই FRU।

SUSPECTED Postpartum eclampsia

DANGER SIGNS Convulsion

PNC-008 **RED** **HARD-STOP**

→ FRU / DH immediately

IF "Is there difficulty breathing?" = **Yes**

ACTION Difficulty breathing = danger sign (pulmonary embolism, severe anaemia, cardiac, or sepsis). Refer FRU immediately.

শ্বাসকষ্ট = বিপদচিহ্ন (পালমোনারি এম্বলিজম, গুরুতর রক্তান্ধতা, হৃদযন্ত্র বা সেপসিস)। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Pulmonary embolism · Cardiac failure · Severe anaemia / sepsis

DANGER SIGNS Difficulty breathing

PNC-COMB-001 **RED** **COMBINATION**

IF "Is there excessive bleeding or foul-smelling discharge?" = **Yes** AND "Is there fever or chills?" = **Yes**

ACTION Bleeding + fever = puerperal sepsis. Refer FRU immediately.

রক্তপাত + জ্বর = পিউরপেরাল সেপসিস। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Puerperal sepsis

DANGER SIGNS Bleeding · Fever

PNC-COMB-002 **RED** **COMBINATION**

IF "Is there severe abdominal pain or suture problem?" = **Yes** AND "Is there fever or chills?" = **Yes**

ACTION Abdominal pain + fever = peritonitis. Refer FRU immediately.

পেট ব্যথা + জ্বর = পেরিটোনাইটিস। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Peritonitis

DANGER SIGNS Abdominal pain · Fever

PNC-COMB-003 **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF "Is there excessive bleeding or foul-smelling discharge?" = **Yes** AND "Is there extreme weakness or dizziness?" = **Yes**

ACTION Bleeding + weakness = hypovolaemic shock. Lay head down, refer FRU immediately.

রক্তপাত + দুর্বলতা = হাইপোভোলেমিক শক। মাথা নিচু করে শোয়ান, এখনই FRU।

SUSPECTED Hypovolaemic shock

DANGER SIGNS Bleeding · Weakness

PNC-COMB-004 **RED** **COMBINATION** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF "Is there breast pain, swelling, or red marks?" = **Yes** AND "Is there fever or chills?" = **Yes**

ACTION Breast pain + fever = breast abscess or mastitis. Refer PHC for antibiotics.

স্তনে ব্যথা + জ্বর = ব্রেস্ট অ্যাবসেস বা ম্যাস্টাইটিস সংক্রমণ। PHC-তে অ্যান্টিবায়োটিক।

SUSPECTED Breast abscess

DANGER SIGNS Breast pain · Fever

PNC-VITAL-001 **RED** **MEASUREMENT**

IF temperature_c ≥ 38

ACTION Temp $\geq 38^{\circ}\text{C}$ postpartum = puerperal sepsis. Refer FRU.

জ্বর $\geq 38^{\circ}\text{C}$ প্রসবের পর = পিউরপেরাল সেপসিস।

DANGER SIGNS High fever postpartum

PNC-VITAL-002 **RED** **MEASUREMENT**

IF haemoglobin < 7

ACTION Hb < 7 g/dL — refer FRU for transfusion.

Hb < ৭ g/dL — রক্ত সঞ্চালনের জন্য FRU-তে রেফার করুন।

DANGER SIGNS Severe anaemia postpartum

PNC-VITAL-003 **YELLOW** **MEASUREMENT**

IF haemoglobin between [7-10]

ACTION Hb 7-10 g/dL — moderate anaemia. Increase IFA.

Hb ৭-১০ g/dL — মাঝারি রক্তাধীনতা। IFA বাড়ান।

DANGER SIGNS Moderate anaemia postpartum

PNC-VITAL-004 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF **systolic_bp** ≥ 140

ACTION Postpartum systolic BP ≥ 140 = postpartum pre-eclampsia. Prepare MgSO₄.

প্রসবের পর সিস্টোলিক BP ≥ 140 = পোস্টপার্টাম প্রি-এক্লাম্পসিয়া। MgSO₄ প্রস্তুত করুন।

DANGER SIGNS Postpartum hypertension

PNC-VITAL-005 **YELLOW** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF **heart_rate** > 110

ACTION HR > 110 /min = sepsis or anaemia risk. Refer PHC for evaluation.

হৃদস্পন্দন > 110 /মিনিট = সেপসিস বা রক্তাভ্রতার ঝুঁকি। PHC-তে মূল্যায়ন।

DANGER SIGNS Tachycardia

PNC-VITAL-006 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF **pads_soaked_per_30min** ≥ 2

ACTION ≥ 2 pads soaked in 30 min = PPH. Uterine massage, call 108.

৩০ মিনিটে ≥ 2 প্যাড ভিজ়ে যাওয়া = PPH। জরায়ু মালিশ করুন, ১০৮ কল করুন।

DANGER SIGNS Postpartum haemorrhage

PNC-VITAL-007 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF **pads_per_day** > 5

ACTION More than 5 pads per day (HBNC threshold) = excessive bleeding. PPH/sepsis risk — refer FRU now.

দিনে ৫ এর বেশি প্যাড (HBNC থ্রেশহোল্ড) = অতিরিক্ত রক্তপাত। PPH/সেপসিসের ঝুঁকি — এখনই FRU।

DANGER SIGNS Excessive postpartum bleeding

PNC-VITAL-008 **RED** **MEASUREMENT** **DRAFT · SIGN-OFF**

IF **temperature_c** ≥ 38.9

ACTION Temp $\geq 38.9^\circ\text{C}$ / 102°F postpartum = severe puerperal sepsis. First dose antibiotic, refer FRU now.

তাপমাত্রা $\geq 38.9^\circ\text{C}$ / 102°F প্রসবের পর = গুরুতর পিউরপেরাল সেপসিস। প্রথম ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক, এখনই FRU।

DANGER SIGNS Severe postpartum sepsis

PNC-002 **YELLOW** **SCORED**

→ PHC within 24 h

IF “Is there fever or chills?” = **Yes**

ACTION Puerperal sepsis risk. Isolated fever day 1–2 = YELLOW. Refer PHC within 24 h.

পিউরপেরাল সেপসিস ঝুঁকি। বিচ্ছিন্ন জ্বর দিন ১–২ = YELLOW।

SUSPECTED Puerperal fever

DANGER SIGNS Fever · Chills

PNC-003 **YELLOW** **SCORED**

→ PHC within 24 h

IF “Is there breast pain, swelling, or red marks?” = **Yes**

ACTION Mastitis: continue breastfeeding, warm compress, refer PHC within 24 h for antibiotics.

ম্যাস্টিটিস: বুকের দুধ চালিয়ে যান, গরম সঁক দিন, অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য PHC।

SUSPECTED Mastitis

DANGER SIGNS Breast pain · Swelling

PNC-004 **YELLOW** **SCORED**

→ **PHC within 24 h**

IF "Is there severe abdominal pain or suture problem?" = **Yes**

ACTION Wound infection = YELLOW. Refer PHC within 24 h.

ক্ষত সংক্রমণ = YELLOW। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC।

SUSPECTED Wound infection

DANGER SIGNS Abdominal pain · Suture problem

PNC-005 **YELLOW** **SCORED**

→ **PHC within 24 h**

IF "Is there burning or difficulty urinating?" = **Yes**

ACTION UTI: refer PHC within 24 h for urine culture and antibiotics.

UTI: প্রস্রাব কালচার ও অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC।

SUSPECTED UTI

DANGER SIGNS Burning urination

PNC-006 **YELLOW** **SCORED**

→ **PHC for Hb check**

IF "Is there extreme weakness or dizziness?" = **Yes**

ACTION Assess pallor. Severe pallor = anaemia. Refer PHC for Hb check.

ফ্যাকাশে ভাব মূল্যায়ন করুন। গুরুতর ফ্যাকাশে = রক্তাল্পতা → PHC-তে Hb পরীক্ষা।

SUSPECTED Anaemia

DANGER SIGNS Weakness · Dizziness

PNC-009 **YELLOW** **SCORED** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ **PHC / MO counselling**

IF "Persistent low mood, crying, sleep/appetite loss, or no interest in the baby?" = **Yes**

ACTION Postpartum depression screen. Counsel, involve family, refer PHC/MO. Any thought of self-harm or harming the baby = urgent referral.

প্রসব-পরবর্তী বিষণ্ণতার স্ক্রিন। পরামর্শ দিন, পরিবারকে যুক্ত করুন, PHC/MO-তে রেফার করুন। নিজের বা বাচ্চার ক্ষতির চিন্তা থাকলে = জরুরি রেফারেল।

SUSPECTED Postpartum depression

DANGER SIGNS Low mood · Anhedonia

RISK-SCORE BANDS GREEN 0-2 · YELLOW 3-5 · RED 6-100

5. Immunization — UIP National Schedule

টিকা মিস / ইমিউনাইজেশন Module immunisation 6 questions · 6 rules · 1 draft

ID	প্রশ্ন (BN)	Question (EN)	Answers
im1	শিশুর বয়স কত মাস?	What is the child's age in months?	০-৬ মাস · ৬-১২ মাস · ১-৫ বছর
im2	কোন টিকা মিস হয়েছে?	Which vaccine was missed?	BCG/OPV · DPT/Pentavalent · Measles/MR
im3	কতদিন আগে টিকা দেওয়ার কথা ছিল?	How many days ago was the vaccine due?	১ সপ্তাহ · ১ মাস · ৩ মাসের বেশি
im4	শিশুর কি কোনো অসুস্থতা আছে এখন?	Does the child have any illness now?	হ্যাঁ · না
im5	১-৫ বছর বয়সী শিশুর বুস্টার ডোজ মিস হয়েছে?	Has the booster dose been missed for child aged 1–5 years?	হ্যাঁ · না
im6	আগের টিকার পর কি গুরুতর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?	Was there a severe reaction after a previous vaccine dose (AEFI)?	হ্যাঁ · না

IMM-001

YELLOW

SCORED

→ Nearest immunisation session within 7 days

IF “What is the child's age in months?” in ০-৬ মাস / ৬-১২ মাস

ACTION Schedule catch-up within 7 days. Do not restart series. Includes PCV, Rotavirus (RVV) and fIPV per current UIP.

৭ দিনের মধ্যে নিকটতম সেশন সাইটে ক্যাচ-আপ নির্ধারণ করুন। সিরিজ পুনরায় শুরু করবেন না। বর্তমান UIP অনুযায়ী PCV, রোটাইভাইরাস (RVV) ও fIPV অন্তর্ভুক্ত।

SUSPECTED Missed primary vaccines

DANGER SIGNS Unimmunised infant

IMM-002

YELLOW

SCORED

→ Nearest immunisation session within 7 days

IF “Which vaccine was missed?” in BCG/OPV / DPT/Pentavalent / Measles/MR

ACTION Schedule catch-up within 7 days.

৭ দিনের মধ্যে ক্যাচ-আপ নির্ধারণ করুন।

SUSPECTED Missed vaccine

DANGER SIGNS Vaccine gap

IMM-003

YELLOW

SCORED

→ Next immunisation session

IF “Has the booster dose been missed for child aged 1–5 years?” = Yes

ACTION DPT booster 16–24 m. OPV booster 16–24 m. MR-2 16–24 m. Schedule catch-up.

DPT বুস্টার ১৬-২৪ মাসে। OPV বুস্টার ১৬-২৪ মাসে। MR-2 ১৬-২৪ মাসে।

SUSPECTED Missed booster

DANGER SIGNS Booster overdue

IMM-004

YELLOW

SCORED

→ Reschedule within 7 days of recovery

IF “Does the child have any illness now?” = Yes

ACTION Mild illness = vaccinate. Moderate/severe = defer until recovered.

হালকা অসুস্থতা = নির্ধারিত সময়ে টিকা দিন। মাঝারি/গুরুতর = সুস্থ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করুন।

SUSPECTED Illness at vaccination

DANGER SIGNS Current illness

IMM-005**YELLOW****SCORED**→ **PHC catch-up session****IF** “How many days ago was the vaccine due?” = **৩ মাসের বেশি****ACTION** Catch-up immunisation. Do not restart series. Flag on ANMOL.

ক্যাচ-আপ ইমিউনাইজেশন। সিরিজ পুনরায় শুরু করবেন না। ANMOL-এ ফ্ল্যাগ করুন।

SUSPECTED Long vaccine gap**DANGER SIGNS** Vaccine overdue > 3 months**IMM-006****YELLOW****SCORED****DRAFT · SIGN-OFF**→ **Refer MO before next dose****IF** “Was there a severe reaction after a previous vaccine dose (AEFI)?” = **Yes****ACTION** Severe reaction after a previous dose (AEFI). Refer to MO before the next dose — do not auto-schedule.

আগের ডোজে গুরুতর প্রতিক্রিয়া (AEFI)। পরের ডোজের আগে MO-কে দেখান — স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করবেন না।

SUSPECTED AEFI history**DANGER SIGNS** Prior severe vaccine reaction**RISK-SCORE BANDS** GREEN 0–0 · YELLOW 1–100 · RED —

6. 🚒 Emergency — Global Hard-Stop Engine

জরুরি অবস্থা যাচাই Module **emergency** 8 questions · 8 rules · **4 draft**

ID	প্রশ্ন (BN)	Question (EN)	Answers
e1	অতিরিক্ত রক্তপাত হচ্ছে?	Is there excessive bleeding?	হ্যাঁ · না
e2	খিঁচুনি বা অজ্ঞান হয়েছে?	Has there been convulsion or loss of consciousness?	হ্যাঁ · না
e3	শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে?	Is there severe difficulty breathing?	হ্যাঁ · না
e4	রোগী সাড়া দিচ্ছে না বা জ্ঞান নেই?	Is the patient unresponsive or unconscious?	হ্যাঁ · না
e5	সাপে কামড়েছে, বিষাক্ত পোকা বা পশুর কামড়?	Snakebite, venomous sting, or animal bite?	হ্যাঁ · না
e6	বিষ/কীটনাশক/অতিরিক্ত ওষুধ খেয়েছে বা খাওয়ানো হয়েছে?	Poison, pesticide, or overdose ingested?	হ্যাঁ · না
e7	ঠান্ডা-ঘামে ভেজা, খুব দুর্বল নাড়ি, অত্যন্ত নিস্তেজ (শকের লক্ষণ)?	Cold clammy skin, very weak pulse, extreme listlessness (shock)?	হ্যাঁ · না
e8	গুরুতর আঘাত, বড় ক্ষত থেকে রক্তপাত, বা মারাত্মক পোড়া?	Major injury, bleeding from a large wound, or severe burn?	হ্যাঁ · না

EM-001

RED

HARD-STOP

→ FRU / DH ≤ 30 min

IF "Is there excessive bleeding?" = **Yes**

ACTION Hard-stop. Call 108. Refer FRU/DH ≤ 30 min. Uterine compression if postpartum.

হার্ড-স্টপ। এখনই ১০৮ কল করুন। FRU/DH-তে ≤ ৩০ মিনিটে রেফার করুন। প্রসব-পরবর্তী হলে জরায়ু সংকোচন প্রয়োগ করুন।

SUSPECTED Haemorrhage

DANGER SIGNS Excessive bleeding

EM-002

RED

HARD-STOP

→ FRU / DH immediately

IF "Has there been convulsion or loss of consciousness?" = **Yes**

ACTION Hard-stop. Lay on left side, protect airway. Call 108. Refer FRU/DH immediately.

হার্ড-স্টপ। বাম কাতে শোয়ান, শ্বাসনালী রক্ষা করুন। ১০৮ কল করুন। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

SUSPECTED Eclampsia / Seizure

DANGER SIGNS Convulsion · Unconscious

EM-003

RED

HARD-STOP

→ FRU / DH ≤ 30 min

IF "Is there severe difficulty breathing?" = **Yes**

ACTION Hard-stop. Call 108. Keep airway clear. If newborn: stimulate, clear airway.

হার্ড-স্টপ। ১০৮ কল করুন। শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখুন। নবজাতক হলে: উদ্দীপনা দিন।

SUSPECTED Respiratory failure

DANGER SIGNS Severe breathing difficulty

EM-004

RED

HARD-STOP

→ FRU / DH ≤ 30 min

IF "Is the patient unresponsive or unconscious?" = **Yes**

ACTION Hard-stop. Call 108. Check airway, breathing, circulation. Recovery position.

হার্ড-স্টপ। এখনই ১০৮ কল করুন। শ্বাসনালী, শ্বাস, সঞ্চালন পরীক্ষা করুন। রিকভারি পজিশনে রাখুন।

SUSPECTED Unconsciousness

DANGER SIGNS Unresponsive

EM-006 **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH ≤ 30 min

IF "Snakebite, venomous sting, or animal bite?" = **Yes**

ACTION Hard-stop. Immobilise the limb (splint), keep below heart level, remove tight items. Do NOT cut/suck/tourniquet. Call 108, FRU/DH ≤30 min (anti-snake-venom). Animal bite: wound wash 15 min + ARV/RIG.

হার্ড-স্টপ। অঙ্গ স্থির রাখুন (স্পলিন্ট), হৃদয়ের নিচে রাখুন, টাইট জিনিস খুলুন। কাটবেন/চুষবেন/বাঁধবেন না। ১০৮ কল করুন, FRU/DH ≤ ৩০ মিনিট (অ্যান্টি-স্নেক-ভেনম)। পশুর কামড় হলে ১৫ মিনিট ক্ষত ধুয়ে ARV/RIG।

SUSPECTED Envenomation · Rabies risk

DANGER SIGNS Snakebite · Animal bite

EM-007 **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH ≤ 30 min

IF "Poison, pesticide, or overdose ingested?" = **Yes**

ACTION Hard-stop. Do NOT induce vomiting. Bring the container/label. Protect airway, left-lateral if drowsy. Call 108, FRU/DH ≤30 min.

হার্ড-স্টপ। বমি করাবেন না। কৌটা/লেবেল সঙ্গে নিন। শ্বাসনালী রক্ষা করুন, অজ্ঞান হলে বাম কাতে শোয়ান। ১০৮ কল করুন, FRU/DH ≤ ৩০ মিনিট।

SUSPECTED Poisoning / pesticide ingestion

DANGER SIGNS Ingested poison/overdose

EM-008 **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH ≤ 30 min

IF "Cold clammy skin, very weak pulse, extreme listlessness (shock)?" = **Yes**

ACTION Hard-stop. Lay flat, keep warm, raise legs, nothing by mouth. Call 108, FRU/DH ≤30 min.

হার্ড-স্টপ। সমতল শোয়ান, গরম রাখুন, পা উঁচু করুন, মুখে কিছু দেবেন না। ১০৮ কল করুন, FRU/DH ≤ ৩০ মিনিট।

SUSPECTED Shock / circulatory collapse

DANGER SIGNS Cold clammy skin · Weak pulse

EM-009 **RED** **HARD-STOP** **DRAFT · SIGN-OFF**

→ FRU / DH ≤ 30 min

IF "Major injury, bleeding from a large wound, or severe burn?" = **Yes**

ACTION Hard-stop. Direct pressure on bleeding; for burns cool with clean water, cover, apply nothing. Immobilise fractures. Call 108, FRU/DH ≤30 min.

হার্ড-স্টপ। রক্তপাতে সরাসরি চাপ দিন; পোড়ায় পরিষ্কার জল দিয়ে ঠান্ডা করুন, ঢেকে দিন, কিছু লাগাবেন না। ভাঙা হাড় স্থির রাখুন। ১০৮ কল করুন, FRU/DH ≤ ৩০ মিনিট।

SUSPECTED Major trauma · Severe burn

DANGER SIGNS Major injury · Severe bleeding · Burn

RISK-SCORE BANDS GREEN 0-0 · YELLOW — · RED 1-100

Generated from asha_engine.json (engine 2.3.0-draft). Bands: ● home care · ● PHC within 24 h · ● FRU/SNCU/DH immediately, call 108. A fired RED can never be downgraded. DRAFT rules await AIH&PH / Secretariat clinical sign-off.