(19) 中华人民共和国国家知识产权局





(12) 发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102228540 A (43)申请公布日 2011.11.02

- (21)申请号 201110164082. X
- (22)申请日 2011.06.18
- (71)申请人 潘同荣地址 237400 安徽省六安市霍邱县城关镇泽沟村 168 号
- (72) 发明人 潘同荣 潘光全
- (74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理 有限公司 34112

代理人 方琦

(51) Int. CI.

A61K 36/739 (2006.01) *A61P* 17/02 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗烧烫伤的外用药水

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗烧烫伤的外用药液,其制备时各组成原料的重量配比为:活血藤8-12克、大黄8-12克、黄连8-12克、紫草8-12克、地榆8-12克、金银花8-12克、虎杖8-12克、三七4-6g、红花4-6g、白芷4-6g、儿茶4-6g,白酒950-1050g。本发明药液具有清热凉血,活血通瘀,消炎止痛,止血生肌的作用,100%治愈,愈后无疤痕。

- 1. 一种治疗烧烫伤的外用药液,其特征在于:其制备时各组成原料的重量配比为:活血藤 8 12 克、大黄 8 12 克、黄连 8 12 克、紫草 8 12 克、地榆 8 12 克、金银花 8 12 克、虎杖 8 12 克、三七 4-6g、红花 4-6g、白芷 4-6g、儿茶 4-6g,白酒 950-1050g。
- 2. 根据权利要求 1 所述的治疗烧烫伤的外用药液,其特征在于:其制备时各组成原料的重量配比为:活血藤 10 克、大黄 10 克、黄连 10 克、紫草 10 克、地榆 10 克、金银花 10 克、虎杖 10 克、三七 5、红花 5g、白芷 5g、儿茶 5g, 80 度白酒 1000g。
- 3. 一种权利要求 1 或 2 所述的治疗烧烫伤的外用药液的制备方法, 其特征在于包括以下步骤:
 - (1)将配方原料的中药材清洗干净,并晒干;
 - (2)将晒干后的原料药材,按配方比例称量准确;
 - (3)将大黄、黄连、三七破碎成粗粉;
 - (4)将配方中的其它中药材和上述粗粉混合均匀后,装入容器中;
 - (5) 按配方比例,将80度白酒加入到装有中药材的容器中,密封,浸泡30-40天;
 - (6)将浸泡好的药酒,从容器中倒出滤去药渣,再次过滤,收集澄清滤液;
- (7) 向滤液中加入蒸馏水,调节药酒的度数到 75 度,即得到本发明的治疗烧烫伤的外用药液;
 - (8)将调配好的外用药液分装备用。

一种治疗烧烫伤的外用药水

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及外用药水领域,具体涉及一种治疗烧烫伤外用药水。

背景技术

[0003] 现有的治疗烧伤、烫伤的外用药,一般止痛慢,疗效时间长,且治愈后皮肤会留下疤痕。

发明内容

[0004] 本发明公开了一种治疗烧烫伤外用药水,本发明药水具有清热凉血,活血通瘀,消炎止痛,止血生肌的作用。

[0005] 为实现上述目的本发明采用如下技术方案:

[0006] 所述的治疗烧烫伤的外用药水,其特征在于:其制备时各组成原料的重量配比为:活血藤 10 克、大黄 10 克、黄连 10 克、紫草 10 克、地榆 10 克、金银花 10 克、虎杖 10 克、三七 5、红花 5g、白芷 5g、儿茶 5g,80 度白酒 1000g。

[0007] 本发明的治疗烧烫伤的外用药液的制备方法,包括以下步骤:

- (1)将配方原料的中药材清洗干净,并晒干;
- (2)将晒干后的原料药材,按配方比例称量准确;
- (3)将大黄、黄连、三七破碎成粗粉;
- (4)将配方中的其它中药材和上述粗粉混合均匀后,装入容器中;
- (5) 按配方比例,将80度白酒加入到装有中药材的容器中,密封,浸泡30-40天;
- (6) 将浸泡好的药酒,从容器中倒出滤去药渣,再次过滤,收集澄清滤液;
- (7) 向滤液中加入蒸馏水,调节药酒的度数到 75 度,即得到本发明的治疗烧烫伤的外用药液;
 - (8) 将调配好的外用药液分装备用。

[0008] 用法及用量:将烧伤面消毒,用药水涂抹在烧伤面上,每4-6小时涂抹一次。

[0009] 本发明的有益效果:

利用本发明药液涂抹在烧伤面上,止疼快,本发明药液具有清热凉血,活血通瘀,消炎止痛,止血生肌的作用,100%治愈,愈后无疤痕。

具体实施方式

[0010] 一种治疗烧烫伤的外用药液,其制备时各组成原料的重量配比为:活血藤 10 克、

大黄 10 克、黄连 10 克、紫草 10 克、地榆 10 克、金银花 10 克、虎杖 10 克、三七 5、红花 5g、白芷 5g、儿茶 5g, 80 度白酒 1000g。

[0011] 本发明的治疗烧烫伤的外用药液的制备方法,包括以下步骤:

- (1)将配方原料的中药材清洗干净,并晒干;
- (2)将晒干后的原料药材,按配方比例称量准确;
- (3)将大黄、黄连、三七破碎成粗粉;
- (4)将配方中的其它中药材和上述粗粉混合均匀后,装入容器中;
- (5)按配方比例,将80度白酒加入到装有中药材的容器中,密封,浸泡30-40天;
- (6)将浸泡好的药酒,从容器中倒出滤去药渣,再次过滤,收集澄清滤液;
- (7) 向滤液中加入蒸馏水,调节药液的度数到 75 度,即得到本发明的治疗烧烫伤的外用药液;
 - (8)将调配好的外用药液分装备用。

[0012] 典型病例

病例一:赫某,20年前宋店乡田塘村村民因失火烧伤面积60%,深II度,用本发明的药,按本发明的用药方法涂抹20天后烫伤痊愈,治愈后创口基本无疤痕。

[0013] 病例二:霍邱城关泽沟小学教师郝某,2006年5月24日不慎面部烧伤,面积9%,深II度,涂抹本发明药水7天后,烧面伤痊愈,无疤痕。

[0014] 病例三:霍邱城关镇北七里严某,2007年8月16日,不幸被汽油烧伤头面部及上肢,面积12%,深II度,涂抹本发明药水9天后,烧面伤痊愈,无疤痕。

[0015] 病例四:2009年6月25日,寿县三觉一司机,不幸被开水烫伤面部及前胸,面积13%,深II度,涂抹本发明药水10天后,烧面伤痊愈,无疤痕。