



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103520305 A

(43) 申请公布日 2014. 01. 22

(21) 申请号 201310458684. 5

(22) 申请日 2013. 10. 05

(71) 申请人 孙建合

地址 221700 江苏省徐州市丰县常店镇旧街
38 号

(72) 发明人 孙建合

(51) Int. Cl.

A61K 36/714 (2006. 01)

A61K 36/83 (2006. 01)

A61P 17/00 (2006. 01)

A61P 31/10 (2006. 01)

A61K 33/04 (2006. 01)

A61K 31/045 (2006. 01)

A61K 33/36 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

治疗癣病的药物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗癣病的药物,该药物由以下重量的原料组成:称取川乌 10 克,草乌 10 克,斑蝥 10 克,狼毒 10 克,雄黄 10 克,红花 10 克,冰片 10 克,硫磺 10 克。该药物的使用方法是:将以上药物烘干研磨成细粉末,相互混合均匀,用香油 100 克调配成糊状敷患处,敷后用纱布包紧 24 小时,用药后,患处流黄水,发现痒肿,停药后会自然消失,癣病患者 24 小时换药一次。该治疗癣病的药物,经过临床使用论证,患者使用 5 ~ 10 次,对治疗片癣、钱癣和干癣疗效较好,并减少患者的痛苦,且又易于接受、标本兼治、使用简单方便、见效快、费用低、药物易得、易制备等优点,无任何毒副作用,保证了患者用药的安全。

1. 一种治疗癣病的药物,其特征是:该药物由以下重量的原料组成:称取川乌 10 克,草乌 10 克,斑蝥 10 克,狼毒 10 克,雄黄 10 克,红花 10 克,冰片 10 克,硫磺 10 克;将以上药物烘干研磨成粉末,相互混合均匀,用香油 100 克调配成糊状敷患处,敷后用纱布包紧 24 小时。

治疗癣病的药物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,特别是涉及一种治疗癣病的药物。

背景技术

[0002] 癣有广义、狭义之分。广义者是指皮肤增厚,伴有鳞屑或有渗液的皮肤病。如牛皮癣、奶癣等。本节所叙为狭义之癣,系指发生在表皮、毛发、指(趾)甲的浅部真菌病。如鹅掌风、秃疮、紫白癜甩等,虽未以癣命名,但属西医浅部真菌病的范畴。《诸病源候论·癣候》云:“癣病之状,皮肉隐疹如钱文,渐渐增大,或圆或斜,痒痛,有匡郭。因其发生部位的不同,而名称各异。临床上常见的癣病有:发于头部的白秃疮、肥疮,发于手部的鹅掌风,发于足部的脚湿气等。癣病具有长期性、广泛性、传染性的特征,它一直是皮肤病防治工作的重点。

[0003] 癣(tinea)是霉菌引起传染性皮肤病,可分浅部霉菌病和深部霉菌病,如肛周皮肤癣属于浅部霉菌病。它多由股癣蔓延至肛门、会阴、臀部所致。夏季多发,冬季少见,中医学记载的阴癣、圆癣、疥疮风、紫白癜风等类似于本病。

[0004] 由于生活、起居不慎,外感湿、热、虫、毒,或相互接触传染,感染浅部真菌,诸邪相合,郁于腠理;淫于皮肤所致。发于上部者,多兼风邪,而发为白秃疮、肥疮、鹅掌风等;发于下部者,多为湿盛,而发为脚湿气等。风热偏盛者,则多表现为发落起疹、瘙痒脱屑;湿热盛者,则多渗液流滋、瘙痒结痂;郁热化燥,气血失和,肌肤失养,则皮肤肥厚、燥裂、瘙痒。

[0005] 中医学诊断,癣是由外受风毒,凝聚皮肤,甚则皮肤不能濡润;或由于风寒外袭,营卫失调;或风热侵入毛窍,郁久血燥;或冲任失调,营血亏耗,血虚生风化燥等致皮肤失养;或被风湿所侵,留于腠理;或久居湿地,水浆浸渍,湿邪外浸,郁于皮肤;或因汗衣湿漏,淹渐肌肤,复受日晒,暑湿浸渍毛窍,而成本病。

[0006] 现代医学认为,癣是由霉菌所致,而霉菌种类繁多,绝大多数不会致病,其中一小部分为条件致病菌,可存在于人的皮肤、粘膜、肠道等处。正常情况下,各菌群间相互影响,相互制约,平衡代谢。但由于长期使用抗生素可造成体内菌群失调,当人体皮肤破损,抵抗力下降时,致病性霉菌则大量繁殖,侵入皮肤,皮下组织而引起癣的发生。本病多是接触接触传染,如通过衣物、用具或自身手足癣传染致病。环境条件亦有影响,如在温热季节和潮湿地区,肛门皮肤受轻微损伤,容易发病。

[0007] 癣是较顽固的疾病,极容易复发,对很多药都敏感,但治疗结束后一定时间内仍可复发。目前治疗癣病的外用药物多选用丙烯胺类、唑类或其他种类抗真菌药剂或药膏(如兰美抒外用膏、达克宁、美克、派瑞松等),此类药品大多属于抑菌药,疗程长,脚气症状频繁复发,而且还可能产生局部皮肤发生红斑、瘙痒、刺痛以及皮疹等不良反应。口服抑菌药有兰美抒(特比奈芬)、斯皮仁诺(伊曲康唑)、大扶康(氟康唑)等,虽然疗效较好,但同样存在疗程长,复发频繁;口服杀菌药有特比奈芬(如兰美抒口服片),效果明显,疗程短,复发率有所降低。但这些口服药物副作用较大、禁忌症较多,如肝功能不良者忌用、不宜过多、过长时间使用等。目前,在医药行业中,用于治疗癣病的药物品种繁多,当时便可缓解症状,但是很难达到彻底除根,标本兼治的目的。

发明内容

[0008] 本发明的目的在于提供一种治疗癣病的药物, 对治疗片癣, 钱癣, 干癣能得到很好的效果。该药物组方科学合理, 对各种类型的癣病疗效显著, 无任何毒副作用而且愈后不易复发。

[0009] 本发明的成分和配比:

川乌 10 克, 草乌 10 克, 斑蝥 10 克, 狼毒 10 克, 雄黄 10 克, 红花 10 克, 冰片 10 克, 硫磺 10 克, 香油 100 克。

[0010] 本发明的药理为:

川乌, 辛、苦, 热; 有大毒。归心、肝、肾、脾经。祛风除湿, 温经止痛。用于风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛。用于治疗风寒湿痹、关节疼痛等病症。一般炮制后内服。生川乌酊外用能刺激皮肤, 继而产生麻木感, 故外用作某些神经痛及风湿的镇痛剂。

[0011] 草乌, 味苦辛, 大热, 有大毒。入肝、脾、肺经。搜风胜湿, 散寒止痛, 开痰, 消肿。治风寒湿痹, 中风瘫痪, 破伤风, 头风, 脘腹冷痛, 痰癖, 气块, 冷痢, 喉痹, 痈疽, 疔疮, 瘰癧。

[0012] 斑蝥, 味辛; 性温; 有毒。入大肠、小肠、肝、肾经。攻毒蚀疮; 逐瘀散结。主痈疽; 瘰癧; 顽癣; 经闭; 症瘕; 癌肿。用于癰疽肿块, 积年顽癣, 瘰癧, 赘疣, 痈疽不溃, 恶疮死肌。

[0013] 狼毒, 味苦; 辛; 性平, 有大毒。归肺经。泻水逐饮; 破积杀虫。水肿腹胀; 痰食虫积; 心腹疼痛; 症瘕积聚; 结核; 疥癣。

[0014] 雄黄, 燥湿, 祛风, 杀虫, 解毒。治疥癣, 秃疮, 痈疽, 走马牙疳, 缠腰蛇丹, 破伤风, 蛇虫蟹伤, 腋臭, 臁疮, 哮喘, 喉痹, 惊痫, 痔瘻。

[0015] 红花, 性温, 味辛, 活血通经、散瘀止痛。经血不调, 产后腹痛, 症瘕, 外伤瘀血肿痛, 痈疽肿痛等症。

[0016] 冰片, 味辛、苦, 微寒; 归心、肝、肺经; 清香宣散, 具有开窍醒神, 清热散毒, 明目退翳的功效, 主治热病高热神昏, 中风痰厥惊痫, 暑湿蒙蔽清窍, 喉痹耳聋, 口疮齿肿, 疮痈疔痔, 目赤肿痛, 翳膜遮睛。

[0017] 硫磺, 酸, 热, 有毒。治阳痿, 虚寒泻痢, 大便冷秘; 外用治疥癣, 湿疹, 癰疮。

[0018] 香油, 清热润肺, 化痰止咳。本膳用梨, 味甘、微酸, 性凉, 有清热化痰, 生津润燥的作用, 能治支气管炎、肺热咳嗽。生姜, 能化痰止咳。

[0019] 其制作工艺及治疗方法为: 称取川乌 10 克, 草乌 10 克, 斑蝥 10 克, 狼毒 10 克, 雄黄 10 克, 红花 10 克, 冰片 10 克, 硫磺 10 克。该药物的使用方法是: 将以上药物烘干研磨成细粉末, 相互混合均匀, 用香油 100 克调配成糊状敷于患处, 敷后用纱布包紧 24 小时, 用药后, 患处流黄水, 发现痒肿, 停药后会自然消失。该药物不可用于会阴, 面部, 小儿慎用。癣病患者 24 小时换药一次, 一般使用 5 ~ 10 次即可治愈。本发明的药物对片癣、钱癣和干癣效果特别显著。

[0020] 本发明的有益效果是: 该治疗癣病的药物, 经过临床使用论证, 患者使用 5 ~ 10 次, 对治疗片癣、钱癣和干癣疗效较好, 并减少患者的痛苦, 且又易于接受、标本兼治、使用简单方便、见效快、费用低、药物易得、易制备等优点, 无任何毒副作用, 保证了患者用药的安全。

具体实施例

[0021] 下面结合实施例对本发明作进一步描述。

[0022] 其制作工艺及治疗方法为：称取川乌 10 克，草乌 10 克，斑蝥 10 克，狼毒 10 克，雄黄 10 克，红花 10 克，冰片 10 克，硫磺 10 克。该药物的使用方法是：将以上药物烘干研磨成粉末，相互混合均匀，用香油 100 克调配成糊状敷患处，敷后用纱布包紧 24 小时，用药后，患处流黄水，发现痒肿，停药后会自然消失。该药物不可用于会阴，面部，小儿慎用。癣病患者 24 小时涂抹一次，一般使用 5～10 次即可治愈。对片癣、钱癣和干癣效果特别显著。

[0023] 经过 2 年来对 100 例癣病病症的临床应用，取得了较好的疗效，其治愈率达 90%，显著率达 94%，总有效率达 98%。

[0024] 治疗方法：癣病患者 24 小时涂抹一次，一般使用 5～10 次即可治愈。

[0025] 疗效评定

治愈：皮损完全消退，临床症状消失，无不适症状；

显著：临床症状大部分消退，无不适症状；

有效：临床症状消退 50%，局部有瘙痒；

无效：临床症状消退不足 10% 或加重。

[0026] 典型病例：

病例 1. 赵某，女，31 岁，患者不明原因头部皮肤红色斑疹及脱屑，伴有明显瘙痒。病后曾在当地医院治疗，治疗效果不佳。诊断为片癣，使用本发明的药物 5 次后斑疹及脱屑消退，病情明显好转。

[0027] 病例 2. 文某，男，54 岁，患者腹部有几处黄豆大小的红色丘疱疹、斑疹，逐渐向周围扩展，伴有明显瘙痒。诊断为体癣，使用本发明的药物 7 次后，治愈。

[0028] 病例 3. 高某，男，38 岁，患者两大腿内侧皮肤斑疹，伴有明显瘙痒。诊断为钱癣，使用本发明的药物 10 次后，治愈。