

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910017883.6

[51] Int. Cl.

**A61K 36/66 (2006.01)**

**A61P 29/00 (2006.01)**

**A61K 31/045 (2006.01)**

**A61K 35/64 (2006.01)**

[43] 公开日 2010 年 2 月 17 日

[11] 公开号 CN 101647865A

[22] 申请日 2009.8.13

[21] 申请号 200910017883.6

[71] 申请人 布焕霞

地址 252300 山东省聊城市阳谷县科学技术局

[72] 发明人 布焕霞

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称

一种治疗跌打创伤的外用药物

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗皮肤创伤的外用药物，它是由三七 100、乳香 60、没药 60、土鳖虫 50、金银花 50、延胡索 60、毛茛 50、大驳骨 60、川芎 50、冰片 10 组成的。本发明的药物使用方便，价格便宜，治愈率高，能快速治愈创伤的药物。本发明的药物治疗跌打创伤有效率 100%，治愈率 100%。

1、一种治疗跌打创伤的外用药物，其特征在于：它是由下述重量份的中草药原料组成的：三七 60—100、乳香 30—60、没药 30—60、土鳖虫 30—60、金银花 20—60、延胡索 20—60、毛茛 20—60、大驳骨 30—60、川芎 20—60、冰片 10—30。

2、根据权利要求 1 所述的一种治疗跌打创伤的外用药物，其特征在于：它是由下述重量份的中草药原料组成的：三七 100、乳香 60、没药 60、土鳖虫 50、金银花 50、延胡索 60、毛茛 50、大驳骨 60、川芎 50、冰片 10。

## 一种治疗跌打创伤的外用药物

### 技术领域

本发明药物属纯中草药技术领域，具体的说是一种治疗跌打创伤的外用药物。

### 背景技术

跌打创伤多因工作中不慎重，走路不慎扭伤，或摔伤，或受到意外的损伤等，以致造成伤处瘀血肿痛，轻者影响工作，重者影响经济收入，目前，西医多采用抗生素抗菌消炎以防感染，如用青霉素抗菌消炎以防感染，或输液以消瘀血，用止痛药以止痛，如用安痛定，效果不理想，都不能迅速的达到消肿的目的。中医用东方活血膏《郑州康益德商贸有限公司》，云南白药膏，治疗效果也不理想，也不能迅速的达到消肿止痛的效果。

### 发明内容

本发明的目的是提供一种使用方便，价格便宜，治愈率高，能快速治愈跌打创伤的外用药物。

本发明的解决方案是基于祖国传统医学对创伤发病机理的认识以及治疗原则，参考现代药理研究，选用消肿定痛，行瘀止血、活血散瘀止痛类药物按中医理论组方配制而成，能达到行气活血，活血散瘀止痛，解毒之功效，使创伤处瘀血肿痛迅速恢复。

本发明的一种治疗跌打创伤的外用药物，其特征在于：它是由下述重量份的中药原料组成的：三七 60—100、乳香 30—60、没药 30—60、土鳖虫 30—60、金银花 20—60、延胡索 20—60、毛茛 20—60、大驳骨 30—60、川芎 20—60、冰片 10—30。

本发明的一种治疗跌打创伤的外用药物，其特征在于：它是由下述重量

份的中药原料组成的：三七 100、乳香 60、没药 60、土鳖虫 50、金银花 50、延胡索 60、毛茛 50、大驳骨 60、川芎 50、冰片 10。将上药加工炮制好混合均匀共粉碎过 300 目筛，收瓶备用。

主治：跌打创伤多因工作中不慎重，走路不慎扭伤，或摔伤，或受到意外的损伤等，以致造成伤处瘀血肿痛。

临床应用：临床主要应用于扭伤、摔伤、意外的损伤造成的伤处瘀血肿痛。

使用方法：首先用 3% 新洁尔灭或 75% 酒精消毒，取适量药粉用适量鸡蛋清调成稠糊状抹于患处，药的厚度约 1—3 厘米，用灭菌纱布包好，然后用胶布固定好，三天换一次药。

治疗疗程：3 天为一个疗程，轻者一个疗程可治愈，重者两个疗程可治愈。

治疗效果：有效率 100%，治愈率 100%。

中医理论认为，跌打创伤多因工作中不慎重，走路不慎扭伤，或摔伤，或受到意外的损伤等，以致造成伤处血出脉道，流于皮下肉里造成瘀血肿痛，治则应以行气活血、消肿定痛，活血散瘀止痛、解毒消炎。

本发明药物机理：三七化瘀止血，活血定痛；乳香活血行气止痛、消肿生肌，用于跌打损伤、瘀滞作痛；没药活血止痛、消肿生肌，用于跌打损伤、瘀血阻滞；土鳖虫破血逐瘀，续筋接骨，用于跌打损伤、瘀血肿痛；金银花清热解毒，疏散风热；延胡索活血、行气、止痛，本品能行血中气滞，气中血滞，用于跌打损伤瘀血肿痛，为止痛良药；毛茛行气止痛，祛风活血，用于伤后的疼痛，为止痛良药；活血祛瘀，续筋接骨，为治跌打损伤的专药、川芎活血行气，祛风止痛，用于跌打损伤的瘀血肿痛、冰片开窍醒神，清热止痛。（参考中药学、主编高学敏、人民卫生出版社；中医

方药学，广东中医学院编，广东人民出版社)。

按：方中三七、乳香、没药、土鳖虫、大驳骨活血祛瘀，消肿止痛为主，使血归脉道，瘀血祛，肿自消，疼痛自好；佐以延胡索、毛茛、川芎活血行气、止痛，取三药合用能行血中气滞，气中血滞功能，使瘀血迅速归脉道，以达到瘀祛肿消，疼止的效果；用金银花，冰片解毒消炎，以防感染，且冰片有渗透皮肤载药入里的直达瘀血肿痛处功效，使瘀血肿痛迅速消散，迅速治愈跌打损伤的瘀血肿痛。诸药合成，具有行气活血、消肿定痛，活血散瘀止痛、解毒消炎的功效。

应用本发明药物，治疗跌打损伤的瘀血肿痛疗效明显，使用方便，无毒副和刺激作用，有效率 100%，治愈率 100%。

### 具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步说明：

实施例：三七 100、乳香 60、没药 60、土鳖虫 50、金银花 50、延胡索 60、毛茛 50、大驳骨 60、川芎 50、冰片 10。将上药加工炮制好混合均匀共粉碎过 300 目筛，收瓶备用。

主治：跌打创伤多因工作中不慎重，走路不慎扭伤，或摔伤，或受到意外的损伤等，以致造成伤处瘀血肿痛。

临床应用：临床主要应用于扭伤、摔伤、意外的损伤造成的伤处瘀血肿痛。

使用方法：首先用 3% 新洁尔灭或 75% 酒精消毒，取适量药粉用适量鸡蛋清调成稠糊状抹于患处，药的厚度约 1—3 厘米，用灭菌纱布包好，然后用胶布固定好，三天换一次药。

治疗疗程：3 天为一个疗程，轻者一个疗程可治愈，重者两个疗程可治愈。

治疗效果：有效率 100%，治愈率 100%。

据统计 1999 年至 2005 年用本发明药物治疗跌打创伤，即脚面、脚关节、手腕关节扭伤瘀血肿痛 125 例、摔伤 146 例、意外的损伤 135 例都在一至两个疗程内均获治愈，取得了显著的效果。

举例：阳谷县城关镇南街秦福厚 2005 年 11 月 10 号来诊，自述大前天上午上房扫雪不慎摔下来，把脚脖子摔伤，吃三七伤药片和贴东方活血膏都不管，到现在肿一直不消，经拍片骨未伤。症见，脚脖子肿大，呈紫红色，皮未伤，手摸伤处有微热感，痛疼拒按，属脚脖子摔伤瘀血肿痛，嘱其停服一切药物，停用一切膏药，用 3%新洁尔灭消毒，急取适量药粉用适量鸡蛋清调成稠糊状抹于患处，药的厚度约 1—3 厘米，用灭菌纱布包好，然后用胶布固定好，三天换一次药。三天后来把药膏折掉，瘀血肿痛已好，走路已不痛，为巩固疗效，仍按上法再贴一贴，三天后又来把药膏折掉，瘀血肿痛已彻底好，走路已完全不痛。