[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

「21〕申请号 200810017546.2

[51] Int. Cl.

A61K 36/185 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01)

A61P 31/22 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

A61K 33/36 (2006.01)

A61K 33/28 (2006.01)

[43] 公开日 2009年8月26日

[11] 公开号 CN 101513433A

[22] 申请日 2008.2.18

[21] 申请号 200810017546.2

[71] 申请人 唐远福

地址 724205 陕西省汉中市勉县新街镇团庄

村四组

[72] 发明人 唐远福

权利要求书1页 说明书2页

[54] 发明名称

一种治疗带状疱疹的外用药膏

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗带状疱疹的外用药膏,其原料重量配比为:藤黄 45-55,雄黄 15-25,龙脑 8-12,水银 4-6,薄荷脑 8-12,凡士林 1000;按照上述量,先将凡士林逐渐加热至 100℃,10分钟后将其降温至 60℃,再将研成细末的雄黄、龙脑、薄荷脑混合于上述凡士林中,降温至 50℃,然后把藤黄和水银加入其中研磨至看不见汞珠为止,逐渐降温至 30℃后装瓶。本发明药膏对带状疱疹皮肤病在短时间内能够治愈,而且能一次性根治,疗效平稳,使用简便。对皮肤干燥、瘙痒、鹅掌风病患者也有显著的疗效,治愈力可达 98%以上;对尖锐湿疣,软下疳,梅毒等性病均有好的疗效。

- 1. 一种治疗带状疱疹的外用药膏,其特征是按下列重量配比的原料组成:藤黄 45-55,雄黄 15-25,龙脑 8-12,水银 4-6,薄荷脑 8-12,凡士林 1000;按照上述量,先将凡士林逐渐加热至 100℃,10 分钟后将其降温至 60℃,再将研成细末的雄黄、龙脑、薄荷脑混合于上述凡士林中,降温至 50℃,然后把藤黄和水银加入其中研磨至看不见汞珠为止,逐渐降温至 30℃后装瓶。
- 2. 如权利要求 1 所述的一种治疗带状疱疹的外用药膏, 其特征是按下列重量配比的原料组成:

藤黄 50, 雄黄 20, 龙脑 10, 水银 5, 薄荷脑 10, 凡士林 1000。

一种治疗带状疱疹的外用药膏

技术领域

本发明属于治疗皮肤病的药物,具体涉及一种治疗带状疱疹的外用药膏。

背景技术

带状疱疹是一种由病毒引起的常见的急性炎症性皮肤病,中医称之为"火丹"或"缠腰蛇"。长期以来,国内外对该病的治疗均无特效药。随着全球变暖和环境污染,带状疱疹皮肤病发病率增加,并且越来越难治愈。目前国内外最常见的治疗方法一是抗病毒治疗,二是中药外治。抗病毒治疗方法通常是通过注射和服用一些抗病毒的药物,解除体内的病毒,但用此法存在疗程长、费用高,且全身治疗的药物还存在副作用大的缺点,不易被患者接受;中药外治方法用药方便,费用低,但就目前已有药物来看,平均治愈时间比较长,有的治疗效果都还不是太好,复法率较高,不能根治。

发明内容

本发明的目的在于公开一种对带状疱疹皮肤病在短时间内能够治愈,而且能一次性根治的外用药膏。

实现上述目的的技术方案是:一种治疗带状疱疹外用药膏,其特征是按下列重量配比的原料组成:

藤黄 45-55, 雄黄 15-25, 龙脑 8-12, 水银 4-6, 薄荷脑 8-12, 凡士林 1000; 上述原料的优选重量配比为:

藤黄 50, 雄黄 20, 龙脑 10, 水银 5, 薄荷脑 10, 凡士林 1000。

制药方法: 按照上述量, 先将凡士林逐渐加热至 100℃, 10 分钟后将其降

温至 60℃,再将雄黄、龙脑、薄荷脑研成细末混合于上述凡士林中降温 50℃, 然后把藤黄和水银加入其中研磨至看不见汞珠为止,逐渐降温至 30℃后装瓶。

使用时,将上述药膏直接涂在疱疹的病灶上,10—15 分钟后皮肤上即感清凉,痛痒渐止,3—5 天后病灶退去,且不留任何斑痕。

本发明药膏对带状疱疹皮肤病在短时间内能够治愈,而且能一次性根治, 疗效平稳,使用简便。而且对皮肤干燥、疼痛、瘙痒、鹅掌风病患者有显著的 疗效,治愈力可达 98%以上; 对尖锐湿疣, 软下疳, 梅毒等性病均有好的疗效。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步说明。

实施例1:

取藤黄 45g, 雄黄 15g, 龙脑 8g, 水银 4g, 薄荷脑 8g, 凡士林 1000g。

按照上述量,先将凡士林逐渐加热至 100℃,10 分钟后将其降温至 60℃,再将研成细末的雄黄、龙脑、薄荷脑混合于上述凡士林中,降温至 50℃,然后把藤黄和水银加入其中研磨至看不见汞珠为止,逐渐降温至 30℃后装瓶。

实施例 2:

取藤黄 50g, 雄黄 20g, 龙脑 10g, 水银 5g, 薄荷脑 10g, 凡士林 1000g。 配制方法与实施例 1 相同。

实施例 3:

取藤黄 55g, 雄黄 25g, 龙脑 12g, 水银 6g, 薄荷脑 12g, 凡士林 1000g; 配制方法与实施例 1 相同。

患者用药期间忌食辛辣、酒类,忌用抗生素、激素、麻醉药剂。