



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102908525 A

(43) 申请公布日 2013.02.06

(21) 申请号 201210442575.X

A61K 35/60(2006.01)

(22) 申请日 2012.11.07

(71) 申请人 余福海

地址 526000 广东省肇庆市端州区肇庆大道
1 号月圆花园 12-203 室

申请人 陈怡

(72) 发明人 余福海 陈怡

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有
限公司 44100

代理人 华辉

(51) Int. Cl.

A61K 36/898(2006.01)

A61P 1/04(2006.01)

A61K 33/06(2006.01)

A61K 33/26(2006.01)

A61K 33/28(2006.01)

A61K 35/02(2006.01)

A61K 35/36(2006.01)

A61K 35/56(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种胃药及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种胃药及其制备方法。本发明的药物由象皮、珍珠、川贝、田七、白芨、鱼鼓、石螺壳、党参、炙甘草、白芍、龟板、鳖甲、黄肉、独脚甘、黄芪、枯矾、石脂、龙骨、牡蛎、朱砂按一定重量份配比制成。本发明的胃药价格低廉、副作用小、治疗效果显著且患者不易复发,制备方法简单易行,也可以自行配制。

1. 一种胃药,其特征在于,其由以下重量份的原料组成:象皮(8%~12%)、珍珠(3%~7%)、川贝(2%~5%)、田七(1%~3%)、白芨(1%~3%)、鱼鼓(1%~3%)、石螺壳(22.5%~26%)、党参(3%~6%)、炙甘草(2%~3%)、白芍(3%~6%)、龟板(2%~5%)、鳖甲(2%~3%)、莢肉(2%~4%)、独脚甘(4%~6%)、黄芪(8%~12%)、枯矾(2%~4%)、石脂(3%~10%)、龙骨(3%~6%)、牡蛎(3%~6%)、朱砂(2%~3%)。

2. 根据权利要求1所述的胃药,其特征在于,其由以下重量份的原料组成:象皮10%、珍珠5%、川贝2.5%、田七1%、白芨1.5%、鱼鼓2.5%、石螺壳22.5%、党参5%、炙甘草2.5%、白芍5%、龟板2.5%、鳖甲2.5%、莢肉2.5%、独脚甘5%、黄芪10%、枯矾2.5%、石脂5%、龙骨5%、牡蛎5%、朱砂2.5%。

3. 权利要求1~2任一所述的胃药的制备方法,其特征在于,包括以下几个步骤:

(1) 将所有原料药材通过目选去除霉烂变质成分和杂质,按其重量份称量;

(2) 将象皮焙干,并打成粉末;

(3) 将珍珠打成粉末;

(4) 将药材川贝、田七、白芨、鱼鼓、石螺壳、党参、炙甘草、白芍、龟板、鳖甲、莢肉、独脚甘、黄芪、枯矾、石脂、龙骨、牡蛎经过混合后,蒸煮、晒干、再蒸煮、再晒干,如此反复共经过三次蒸煮和三次晒干,然后均打成粉末;

(5) 将以上药材粉末全部混合后,再渗入朱砂充分混合而成。

4. 根据权利要求3所述的胃药的制备方法,其特征在于,所述的第(3)步骤中三次蒸煮的方法是:将水煮沸至100℃时,再投入需要蒸煮的药材,每次蒸煮时间为30分钟。

一种胃药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种药物及其制备方法,具体地,涉及一种胃药及其制备方法。

背景技术

[0002] 胃病是一种常见的多发病,但一直是人类无法彻底根除的顽症,目前市场上出现了各种各样的治疗胃病的药物,包括西药和中成药。西药疗效单一,价格昂贵,副作用大,有的患者会出现不良反应;市面上的中成药虽然能起到一定的治疗胃病的作用,但有的胃药的制备工艺繁琐,药效有限,不仅见效慢,且治疗后容易复发。

发明内容

[0003] 本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种价格低廉、副作用小、治疗效果显著且患者不易复发的胃药;还提供一种简单易行、甚至可以自行配制的胃药制备方法。

[0004] 本发明解决所述技术问题采用的技术方案是:

[0005] 一种胃药,其特征在于,其由以下重量份的原料组成:象皮(8%~12%)、珍珠(3%~7%)、川贝(2%~5%)、田七(1%~3%)、白芨(1%~3%)、鱼鼓(1%~3%)、石螺壳(23%~26%)、党参(3%~6%)、炙甘草(2%~3%)、白芍(3%~6%)、龟板(2%~5%)、鳖甲(2%~3%)、莢肉(2%~4%)、独脚甘(4%~6%)、黄芪(8%~12%)、枯矾(2%~4%)、石脂(3%~10%)、龙骨(3%~6%)、牡蛎(3%~6%)、朱砂(2%~3%)。

[0006] 所述的胃药,其特征在于,其由以下重量份的原料组成:象皮 10%、珍珠 5%、川贝 2.5%、田七 1%、白芨 1.5%、鱼鼓 2.5%、石螺壳 22.5%、党参 5%、炙甘草 2.5%、白芍 5%、龟板 2.5%、鳖甲 2.5%、莢肉 2.5%、独脚甘 5%、黄芪 10%、枯矾 2.5%、石脂 5%、龙骨 5%、牡蛎 5%、朱砂 2.5%。

[0007] 所述的胃药的制备方法,其特征在于,包括以下几个步骤:

[0008] (1)将所有原料药材通过目选去除霉烂变质成分和杂质,按其重量份称量;

[0009] (2)将象皮焙干,并打成粉末;

[0010] (3)将珍珠打成粉末;

[0011] (4)将药材川贝、田七、白芨、鱼鼓、石螺壳、党参、炙甘草、白芍、龟板、鳖甲、莢肉、独脚甘、黄芪、枯矾、石脂、龙骨、牡蛎经过混合后,蒸煮、晒干、再蒸煮、再晒干,如此反复共经过三次蒸煮和三次晒干,然后均打成粉末;

[0012] (5)将以上药材粉末全部混合后,再渗入朱砂充分混合而成。

[0013] 所述的胃药的制备方法,其特征在于,所述的第(3)步骤中三次蒸煮的方法是:将水煮沸至 100℃时,再投入需要蒸煮的药材,每次蒸煮时间为 30 分钟。

[0014] 本发明的技术方案是申请人经过多年的潜心研究和 30 多年的临床不断实践得出。服用时本药粉每次 1.5 克,与蜂蜜半茶匙混合吞服,服后饮用少量凉开水,不宜多饮水送。每天三次,餐后约 1 小时服用。3~4 周为 1 个疗程。小儿减半。本发明的技术方案可以达到以下有益效果:

[0015] 1、本发明的胃药治疗范围广，可以治疗绝大部分胃病，包括胃痛、胃酸、胃胀、胃溃疡、十二指肠溃疡、急慢性胃炎、胃窦炎、肠胃神经官能症、胃痉挛、胆汁反流性胃炎、上消化道少量出血、胃下垂等疾病都有明显的疗效。社会上患有胃病的患者，经过服用本药，均收到满意的效果，应用 3-4 周，症状达到痊愈，免除手术的痛苦，并且少有复发。

[0016] 2、本发明的胃药能消滞、行气、助消化、解郁、止痛、止血、生肌、保护胃黏膜、抑制胃酸分泌、促进溃疡面愈合。

[0017] 3、本发明的胃药对排黑便、胃痛、背痛、肝痛、虫痛、气痛、饥痛、饱痛、以及气顶、反胃、腹胀、饱滞、忧郁、心翳、烦恼、眩晕、疲倦、叹气、厌食、恶心、呕吐、水土不服、小儿肚痛哭闹等，治疗效果显著。

[0018] 4、本发明的胃药主要是中药成分，药性平和、无毒副作用。

[0019] 5、本发明的胃药制备方法简单易行，既可批量化生产，又可自行配制使用，大大降低了患者的治疗成本。

具体实施方式

[0020] 下面结合具体实施例对本发明作进一步的说明，但本发明不受下述实施例的限制。

[0021] 实施例 1

[0022] 本实施例的胃药按如下重量百分含量的原料配制组成：象皮 8%、珍珠 3%、川贝 5%、田七 3%、白芨 3%、鱼鼓 3%、石螺壳 23%、党参 3%、炙甘草 2%、白芍 3%、龟板 3%、鳖甲 2%、莢肉 2%、独脚甘 6%、黄芪 12%、枯矾 2%、石脂 6%、龙骨 6%、牡蛎 3%、朱砂 2%。

[0023] 其制备方法为：

[0024] (1) 将上述所有原料药材通过目选去除霉烂变质成分和杂质，按其重量份称量；

[0025] (2) 将象皮焙干，并打成粉末；

[0026] (3) 将珍珠打成粉末；

[0027] (4) 将药材川贝、田七、白芨、鱼鼓、石螺壳、党参、炙甘草、白芍、龟板、鳖甲、莢肉、独脚甘、黄芪、枯矾、石脂、龙骨、牡蛎经混合后，蒸煮、晒干、再蒸煮、再晒干，如此反复共经过三次蒸煮和三次晒干，最后将晒干后的药材分别打成粉末；

[0028] (5) 将以上药材粉末全部混合后，再渗入朱砂充分混合而成。

[0029] 本实施例的胃药服用方法是：取本药粉每次 1.5 克，与蜂蜜半茶匙混合吞服，服后饮用少量凉开水，不宜多饮水送。每天三次，餐后约 1 小时服用。3 ~ 4 周为 1 个疗程。小儿减半。

[0030] 实施例 2

[0031] 本实施例的胃药按如下重量百分含量的原料配制组成：象皮 12%、珍珠 5%、川贝 3%、田七 2%、白芨 1%、鱼鼓 1%、石螺壳 24%、党参 4%、炙甘草 3%、白芍 4%、龟板 5%、鳖甲 3%、莢肉 4%、独脚甘 4%、黄芪 8%、枯矾 2%、石脂 3%、龙骨 3%、牡蛎 6%、朱砂 3%。

[0032] 其制备方法同实施例 1。

[0033] 其服用方法同实施例 1。

[0034] 实施例 3

[0035] 本实施例的胃药按如下重量百分含量的原料配制组成：象皮 8%、珍珠 7%、川贝 2%、

田七 1%、白芨 1%、鱼鼓 1%、石螺壳 26%、党参 6%、炙甘草 2%、白芍 6%、龟板 2%、鳖甲 2%、莼肉 2%、独脚甘 4%、黄芪 8%、枯矾 4%、石脂 10%、龙骨 3%、牡蛎 3%、朱砂 2%。

[0036] 其制备方法是：按照实施例 2 的制备方法，其中，蒸煮方法是：将水煮沸至 100℃ 时，再投入需要蒸煮的药材，每次蒸煮时间为 30 分钟。

[0037] 其服用方法同实施例 1。

[0038] 实施例 4

[0039] 本实施例的胃药按如下重量百分含量的原料配制组成：象皮 10%、珍珠 5%、川贝 2.5%、田七 1%、白芨 1.5%、鱼鼓 2.5%、石螺壳 22.5%、党参 5%、炙甘草 2.5%、白芍 5%、龟板 2.5%、鳖甲 2.5%、莼肉 2.5%、独脚甘 5%、黄芪 10%、枯矾 2.5%、石脂 5%、龙骨 5%、牡蛎 5%、朱砂 2.5%。

[0040] 其制备方法同实施例 3。

[0041] 其服用方法同实施例 1。

[0042] 实施例 5

[0043] 谭秋养，男，60 岁，广东省新兴县稔村镇页村乡页村人。谭先生 40 年前患有十二指肠溃疡。阵发性上腹烧灼样痛，每于季节交替时出现。饥饿时，夜间发生，进食后可缓解，伴有反酸，烧心，排柏油样黑便。多次住院作保守治疗都无明显效果。1984 年，谭先生服用了本发明实施例 1 的胃药一个疗程后，以上不适症状逐渐缓解，再巩固治疗两个疗程后，不适症状完全消失。电话回访，至今无出现复发。

[0044] 实施例 6

[0045] 谭金五，女，45 岁，广东省新兴县稔村镇人。谭女士于 1997 年患有胃溃疡。上腹于季节交替时出现阵发性钝痛，饱食后加重，伴有反酸，嗝气，腹胀，恶心，呕吐，大便呈柏油样。患病几年来，一直在门诊作保守治疗，效果不显著。后经人介绍，服用了本发明实施例 1 的胃药一个月后，患者不适症状逐渐缓解，再服用一个月，患者不适症状完全消失。随访，患者未出现过复发。

[0046] 实施例 7

[0047] 姚鉴超，男，65 岁，广东省新兴县稔村镇新街人。姚先生三年前患有十二溃疡伴轻度萎缩。姚先生反复上腹疼痛，尤其餐前空腹时症状明显，时常夜间痛醒，心口常伴有刺痛，烧心，反酸的症状。多次在门诊系统治疗无明显效果。后在服用了本发明实施例 2 的胃药一个星期后，患者症状逐渐缓解，再坚持治疗两个疗程，患者不适症状完全消息。电话随访，患者至今无复发。

[0048] 实施例 8

[0049] 吴海燕，女，40 岁，广东省罗定市平塘镇上洞村人。吴女士 5 年前患有胃溃疡。自觉有些清瘦，吃饭无食欲，吐酸水。常在门诊吃药治疗，无明显效果。后因胃疼痛加重无法缓解，吴女士尝试着服用本发明实施例 2 的胃药一个星期后，患者疼痛缓解，继续服用两个月，患者以上不适症状消失。随访至今未出现复发。

[0050] 实施例 9

[0051] 陈梅英，女，50 岁，广东省云浮市人。三年前，陈女士患有胃溃疡。腹胀，呕吐，泛酸，嗝气。陈女士发病以来，一直在医院开药服，吃了药就不痛，不吃药就痛。这样反复了一年多。身体开始消瘦，贫血，无食欲。后经人介绍，服用了本发明实施例 3 的胃药一个疗程

后,不适症状缓解,继续治疗两个疗程,患者不适症状完全消失。随访未出现过复发。

[0052] 实施例 10

[0053] 姚贵彬,男,41 岁,广东省新兴县天堂镇石塘村人。姚先生十多年前是一个胃溃疡患者。在门诊作保守治疗已有两年多,没有明显效果。就在绝望之际,姚先生无意中服用了本发明实施例 3 的胃药一个疗程后,基本症状消失,又巩固了一个疗程后停药。随访,患者至今未出现复发。

[0054] 实施例 11

[0055] 陈阿波,男,45 岁,广东省罗定市金鸡大江村人。十多年前,陈先生患有胃溃疡病。起初患者自觉比以前消瘦了不少,吃饭没有食欲,吐酸水,以为只是轻微的胃病。平时工作较忙,就吃了些胃药,不能缓解,且胃疼加重。在门诊作保守治疗两年多,胃疼还是不能有效的缓解。后经服用了本发明实施例 4 的胃药一个疗程后,患者以上不适症状逐渐缓解,再治疗两个疗程,症状完全消失。患者自己再巩固治疗了一个疗程。随访至今,无复发。

[0056] 实施例 12

[0057] 江肇阳,男,50 岁,广东省肇庆市人。江先生十多年前患有十二指肠溃疡。在门诊作系统治疗,常服用“雷尼替丁”,“胃 u 胶囊”等胃药,效果不明显。1999 年,患者在悲观之际,得知本发明胃药的疗效。试着服用了实施例 4 的胃药一个月后,不适症状居然明显的缓解了。再服用两个月,不适症状完全消失。随访至今未出现复发。