



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102949448 A

(43) 申请公布日 2013.03.06

(21) 申请号 201110263125.X

(22) 申请日 2011.08.25

(71) 申请人 左新民

地址 156126 黑龙江省富锦市中央大街鑫鑫
熟食店

(72) 发明人 左新民

(51) Int. Cl.

A61K 36/56 (2006.01)

A61K 9/48 (2006.01)

A61P 19/08 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61K 33/26 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

续断散胶囊

(57) 摘要

一、续断散胶囊的药物组成：其中主要成分为通络止痛的马钱子、接骨，促使骨痂形成的自然铜。二、续断散胶囊的组成药物功能及成分分析。三、续断散胶囊的功能与主治。四、续断散胶囊的具体制作及服用方法。

1. 续断散胶囊的具体制作及服用方法：将炙马钱子用适量滑石粉文火炒存性碾轧为粉，自然铜醋炙（将自然铜火煅红透立即置入盛醋的碗内，如此三次即可）碾轧极细粉；最后，将炙马钱子粉和炙自然铜粉两味与其它饮片共为细粉，装入 0.5 胶囊即可。成人每次口服 6 粒，儿童减半，温开水送服，每日 3 次。需严格按剂量忌超量服用，因马钱子含土的宁，过量服用可致中毒：出现头痛、心慌、阵发性抽搐、强直性惊厥、吞咽困难等。

续断散胶囊

一、技术领域

[0001] 中药胶囊制剂。

二、背景技术

[0002] 将处方诸药粉成细粉装入 0.5 空心胶囊

三、发明内容

[0003] 一、“续断散胶囊”的药物组成：炙马钱子粉、制自然铜粉、骨碎补、续断、制乳香、制没药、土虫、怀牛膝、杜仲、桂枝各 100g

[0004] 二、“续断散胶囊”的组成药物功能及成分分析：a、马钱子 性味：苦、寒。有大毒。入肝、脾经。本品有祛风胜湿、活血消肿，通络止痛、接骨续伤等功能。现代研究：本品含生物碱，主要为番木鳖碱（土的宁）、马钱子碱等。药理：对中枢神经系统有兴奋作用，首先兴奋脊髓的反射机能，其次兴奋脊髓的呼吸中枢及血管运动中枢，能提高大脑皮层的感觉中枢机能。；b、自然铜 性味：辛，平。入肝经。本品具有散瘀止痛，接骨疗伤之作用。现代研究：本品成分含二硫化铁，还含铜、镍、砷、锑等杂质。药理：有促进骨质愈合作用，可使骨痂生长快，量多且较成熟。c、骨碎补 性味：苦，温。入肝肾经。本品有活血续伤之作用 c、续断 性味：苦、甘、辛，微温。入肝、肾经。本品有补肝肾，强筋骨；行血脉，续筋骨。为补肝肾疗折伤要药。d、土虫（上鳖虫） 性味：咸，寒；有小毒。入肝经，本品有破血逐瘀，续筋接骨之功能。e、没药 性味：苦、辛、平。入心、肝、脾经。本品有活血止痛，消肿生肌之功能，与乳香相须为用。现代研究：其主要成分含树脂、挥发油等。f、乳香 性味：辛、苦、温。入心、肝、脾经。本品有宣通经络，活血行气散滞，瘀消血活则痛止……故有活血止痛作用。现代研究：其主要成分含树脂，树胶，挥发油，乳香脂酸，乳香树脂烃等。药理：有镇痛作用。g、怀牛膝 性味：苦、甘、酸，平。入肝、肾经。本品具有活血祛瘀，补肝肾，强筋骨等作用。本品能引血下行，故为治疗下肢骨折之引经药。h、杜仲 性味：甘、温。入肝肾经。本品具有补肝肾，壮筋骨之作用。为腰椎骨折之引经药。i、桂枝 性味：辛、甘、温。入心、肺、膀胱经。本品发汗解肌，温通经脉，通阳化气。现代研究：本品含挥发油，主要成分为桂皮醛。药理：……有中枢镇静、镇痛作用等。本品为四肢骨折的引经药。

[0005] 纵观全方方药：骨碎补、续断、怀牛膝、杜仲皆为补肝肾之品：肝得补，以续筋骨折伤，“肾主骨”，肾得补骨得生，肾阳促使骨生；自然铜散瘀止痛、接骨疗伤，为骨折所必需之要药；马钱子不但活血消肿而且通络、止痛，接骨续伤，可以增强骨折愈合并有很强的止痛效果；桂枝、牛膝、杜仲各为引经药，将药力引领至伤处。全方诸药紧密配合，各司其责，起到了显著的见效迅速，快速愈合之效果。

[0006] 附，主要参考资料：《中药八百种详解》（河南科技出版社出版 侯士良主编 1994 年）

[0007] 三、“续断散胶囊”的功能与主治：

[0008] “续断散胶囊”具有活血化瘀、消肿止痛、接骨续筋作用；用以治疗：

- [0009] 1、一切未完全骨折、手术复位骨折，骨痂生成迅速。有效率 100%，治愈率 100%。
- [0010] 2、一切跌打损伤，有效率 100%，治愈率 100%。
- [0011] 家父应用 40 余年，经治愈各类骨折无数，病例已无法统计。
- [0012] 四、“续断散胶囊”组成成分为广为应用的常用中药药材易于采购；其制作方法简单易于操作，很适合中小型医院及门诊、个体诊所制作加工。
- [0013] 五、“续断散胶囊”的具体制作及服用方法：（第一页）
- [0014] 将炙马钱子用适量滑石粉文火炒存性碾轧为粉，自然铜醋炙（将自然铜火煅红透立即置入盛醋的碗内，如此三次即可）碾轧极细粉；最后，将炙马钱子粉和炙自然铜粉两味与其它饮片共为细粉，装入 0.5 胶囊即可。成人每次口服 6 粒，儿童减半，温开水送服，每日 3 次。需严格按剂量忌超量服用，因马钱子含土的宁，过量服用可致中毒：出现头痛、心慌、阵发性抽搐、强直性惊厥、吞咽困难等。
- [0015] 六、“续断散胶囊”的历史渊源：
- [0016] 家父左仁（1916-1983）师承于外祖父（吉林省民间中医）民间行医 40 余年，擅长中医外科、骨伤科，治疗骨折、跌打损伤、骨结核、骨髓炎等，上门求医者络绎不绝。特别是文化大革命运动时期。虽然那时父亲曾被禁止行医；但求医甚众，且大多持有乡政府的介绍信，村政府不得不破例放行，以至后来彻底取消禁令。
- [0017] 此制剂原为外祖父之秘方“续断散”，患者服用不便，笔者为第三代传人—左新民根据原方散剂改为胶囊制剂。