

## Derivation of Elastic Net

Derive  $\mathbf{w} = (X_b^T X_b + \lambda I)^{-1} X_b^T \mathbf{y}$

เรามี  $Cost = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda(l1_{ratio}) \sum_{j=0}^p |w_j| + 0.5\lambda((1 - l1_{ratio})) \sum_{j=0}^p w_j^2$

และเราต้องการหา  $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_p \end{bmatrix}$  ที่ทำให้  $Cost$  ต่ำที่สุด

จาก calculus เราทราบว่า  $Cost$  ต่ำสุดเมื่อ  $\nabla Cost = 0$  ดังนั้น

$$\nabla Cost = \begin{bmatrix} \frac{\partial Cost}{\partial w_0} \\ \frac{\partial Cost}{\partial w_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial Cost}{\partial w_d} \\ \vdots \\ \frac{\partial Cost}{\partial w_p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

พิจารณา  $\frac{\partial Cost}{\partial w_d} = 0$  เมื่อ  $d \in \{0, 1, \dots, p\}$  จะได้ว่า

$$\sum_{i=1}^n x_{i,d} \hat{y}_i + \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial |w_d|}{\partial w_d} + \lambda(1 - l1_{ratio}) w_d = \sum_{i=1}^n x_{i,d} y_i \quad (1)$$

ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูป matrix ได้ดังนี้

$$\begin{bmatrix} x_{1,d} & x_{2,d} & \cdots & x_{n,d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix} + \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial |w_d|}{\partial w_d} + \lambda(1 - l1_{ratio}) w_d = \begin{bmatrix} x_{1,d} & x_{2,d} & \cdots & x_{n,d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad (2)$$

จากสมการ

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial Cost}{\partial w_0} \\ \frac{\partial Cost}{\partial w_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial Cost}{\partial w_d} \\ \vdots \\ \frac{\partial Cost}{\partial w_p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่อไปนี้ได้

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_{1,1} & x_{2,1} & \cdots & x_{n,1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1,p} & x_{2,p} & \cdots & x_{n,p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix} + \lambda(l1_{ratio}) \begin{bmatrix} \frac{\partial |w_0|}{\partial |w_1|} \\ \frac{\partial |w_1|}{\partial |w_1|} \\ \vdots \\ \frac{\partial |w_p|}{\partial |w_p|} \end{bmatrix} + \lambda(1-l1_{ratio}) \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_{1,1} & x_{2,1} & \cdots & x_{n,1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1,p} & x_{2,p} & \cdots & x_{n,p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

โดยที่  $x_{i,0} = 1; i \in \{1, 2, \dots, n\}$

กำหนดให้

$$X_b = \begin{bmatrix} 1 & x_{1,1} & \cdots & x_{1,p} \\ 1 & x_{2,1} & \cdots & x_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n,1} & \cdots & x_{n,p} \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix}$$

นั่นคือ  $X_b^T \hat{\mathbf{y}} + \lambda \mathbf{w} = X_b^T \mathbf{y}$

$$\therefore \hat{\mathbf{y}} = X_b \mathbf{w} \quad (3)$$

จะได้

$$X_b^T X_b \mathbf{w} + \lambda(l1_{ratio}) \nabla \mathbf{w} + \lambda(1-l1_{ratio}) \mathbf{w} = X_b^T \mathbf{y}$$

Derive Equation 1

เนื่องจาก

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\partial w_d} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial (y_i - \hat{y}_i)^2}{\partial (y_i - \hat{y}_i)} \cdot \frac{\partial (y_i - \hat{y}_i)}{\partial \hat{y}_i} \cdot \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial w_d} \\
&= \sum_{i=1}^n 2(y_i - \hat{y}_i)(1)(-1) \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial w_d} \\
&= \sum_{i=1}^n -2(y_i - \hat{y}_i) \frac{\partial (w_0 + w_1 x_{i,1} + \dots + w_d x_{i,d} + \dots + w_p x_{i,p})}{\partial w_d} \\
&= \sum_{i=1}^n -2(y_i - \hat{y}_i) x_{i,d} \\
&= -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) x_{i,d} \\
&= -2 \sum_{i=1}^n x_{i,d} y_i + 2 \sum_{i=1}^n x_{i,d} \hat{y}_i
\end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \lambda(l1_{ratio}) \sum_{j=0}^p |w_j|}{\partial w_d} &= \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial \sum_{j=0}^p |w_j|}{\partial w_d} \\
&= \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial (|w_0| + |w_1| + \dots + |w_d| + \dots + |w_p|)}{\partial w_d} \\
&= \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial |w_d|}{\partial w_d}
\end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned}
\frac{\partial 0.5\lambda(1 - l1_{ratio}) \sum_{j=0}^p w_j^2}{\partial w_d} &= 0.5\lambda(1 - l1_{ratio}) \frac{\partial \sum_{j=0}^p w_j^2}{\partial w_d} \\
&= 0.5\lambda(1 - l1_{ratio}) \frac{\partial (w_0^2 + w_1^2 + \dots + w_d^2 + \dots + w_p^2)}{\partial w_d} \\
&= \lambda(1 - l1_{ratio}) \lambda w_d
\end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}
\frac{\partial Cost}{\partial w_d} &= \frac{\partial \left[ \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda(l1_{ratio}) \sum_{j=0}^p |w_j| + 0.5\lambda((1 - l1_{ratio})) \sum_{j=0}^p w_j^2 \right]}{\partial w_d} \\
0 &= \frac{\partial \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\partial w_d} + \frac{\partial \lambda(l1_{ratio}) \sum_{j=0}^p |w_j|}{\partial w_d} + \frac{\partial 0.5\lambda(1 - l1_{ratio}) \sum_{j=0}^p w_j^2}{\partial w_d} \\
0 &= -2 \sum_{i=1}^n x_{i,d} y_i + 2 \sum_{i=1}^n x_{i,d} \hat{y}_i + \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial |w_d|}{\partial w_d} + \lambda(1 - l1_{ratio}) w_d \\
0 &= - \sum_{i=1}^n x_{i,d} y_i + \sum_{i=1}^n x_{i,d} \hat{y}_i + \frac{\lambda(l1_{ratio})}{2} \frac{\partial |w_d|}{\partial w_d} + \frac{\lambda(1 - l1_{ratio})}{2} w_d \\
0 &= - \sum_{i=1}^n x_{i,d} y_i + \sum_{i=1}^n x_{i,d} \hat{y}_i + \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial |w_d|}{\partial w_d} + \lambda(1 - l1_{ratio}) w_d \\
\sum_{i=1}^n x_{i,d} \hat{y}_i + \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial |w_d|}{\partial w_d} + \lambda(1 - l1_{ratio}) w_d &= \sum_{i=1}^n x_{i,d} y_i
\end{aligned}$$

Derive Equation 2

พิจารณา  $\sum_{i=1}^n x_{i,d} \hat{y}_i$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_{i,d} \hat{y}_i &= x_{1,d} \hat{y}_1 + x_{2,d} \hat{y}_2 + \cdots + x_{n,d} \hat{y}_n \\ &= \begin{bmatrix} x_{1,d} & x_{2,d} & \cdots & x_{n,d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

พิจารณา  $\sum_{i=1}^n x_{i,d} y_i$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_{i,d} y_i &= x_{1,d} y_1 + x_{2,d} y_2 + \cdots + x_{n,d} y_n \\ &= \begin{bmatrix} x_{1,d} & x_{2,d} & \cdots & x_{n,d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ดังนั้น จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_{i,d} \hat{y}_i + \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial |w_d|}{\partial w_d} + \lambda(1 - l1_{ratio}) w_d &= \sum_{i=1}^n x_{i,d} y_i \\ \begin{bmatrix} x_{1,d} & x_{2,d} & \cdots & x_{n,d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix} + \lambda(l1_{ratio}) \frac{\partial |w_d|}{\partial w_d} + \lambda(1 - l1_{ratio}) w_d &= \begin{bmatrix} x_{1,d} & x_{2,d} & \cdots & x_{n,d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Derive Equation 3

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_0 + w_1x_{1,1} + \cdots + w_px_{1,p} \\ w_0 + w_1x_{2,1} + \cdots + w_px_{2,p} \\ \vdots \\ w_0 + w_1x_{n,1} + \cdots + w_px_{n,p} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & x_{1,1} & \cdots & x_{1,p} \\ 1 & x_{2,1} & \cdots & x_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n,1} & \cdots & x_{n,p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_p \end{bmatrix}$$

กำหนดให้  $\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix}$ ,  $X_b = \begin{bmatrix} 1 & x_{1,1} & \cdots & x_{1,p} \\ 1 & x_{2,1} & \cdots & x_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n,1} & \cdots & x_{n,p} \end{bmatrix}$ ,  $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_p \end{bmatrix}$

ดังนั้น จะได้ว่า

$$\hat{\mathbf{y}} = X_b \mathbf{w}$$