

1 Ciąg Funkcyjny

Ciąg funkcyjny, to ciąg funkcji $f_n(x)$ określonych na pewnym zbiorze A . Przykład:

$$f_n(x) = \frac{x}{n}$$

1.1 Zbieżność

Ciąg funkcyjny może na podzbiorze $E \subseteq D$ może być:

- zbieżny punktowo, czyli zbieżny dla każdego $x \in E$

$$\forall x \in E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

$$\forall x \in E f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

$$\forall x \in E \forall \epsilon > 0 \exists N \forall n \geq N |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

Lub; dla każdego $x \in E$, dla każdego marginesu, od pewnego punktu, odległość między f_n i f w punkcie jest mniejsza niż ϵ . Ponieważ w definicji ϵ zależy od x , to f może nie być ciągłą.

- zbieżny punktowo bezwzględnie, to znaczy zbieżny punktowo dla $|f_n(x)|$
- zbieżny jednostajnie, to znaczy $a_n = \sup_{x \in E} f_n(x)$ jest zbieżny

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in E |f(x) - f_n(x)| < \epsilon$$

Geometrycznie: w pasie o brzegach $y = f(x) \pm \epsilon$ leżą wszystkie krzywe $y = f_n(x)$. Zbieżność jednostajna implikuje punktową, oraz wymaga ciągłości f . Granica ciągu jednostajnie zbieżnego jest ciągłą.

- zbieżny jednostajnie bezwzględnie, to znaczy $a_n = \sup_{x \in E} |f_n(x)|$ jest zbieżny

Przykładem ciągu funkcyjnego, który jest zbieżny to $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$. Z kolei, na przykład; ciąg $f_n = x^n$ w przedziale $0 \leq x < 1$ nie jest zbieżny jednostajnie do (dowolnej) funkcji f , bo w pobliżu punktu $x = 1$ krzywe $y = x^n$ nie leżą dowolnie blisko prostej $y = 0$.

1.2 Szereg Funkcyjny

Niech $f_n(x)$ będzie ciągiem funkcji określonych na zbiorze E . Jeżeli dla każdego $x \in E$ szereg liczbowy $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ jest zbieżny, to funkcja $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ jest sumą szeregu funkcyjnego.

Jeżeli f_n jest zbieżnym ciągiem funkcji, to mówimy, że szereg tworzony przez ten ciąg jest zbieżny i ma sumę $f(x)$.

Jeżeli ciąg sum częściowych $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$ jest zbieżny jednostajnie, to mówimy, że szereg tworzony przez ten ciąg jest zbieżny jednostajnie. Suma szeregu jednostajnie zbieżnego jest ciągłą.

1.3 Twierdzenie Arzeli-Ascoli'ego

Jeżeli f_n jest ciągiem funkcji rzeczywistych określonych na przedziale zwartym, który jest wspólnie ograniczony i jednakowo ciągły, to zawiera on podciąg zbieżny jednostajnie.

1.4 Ciągłość granicy

Jeżeli ciąg $f_n(x)$ jest jednostajnie zbieżny w A i funkcje $f_n(x)$ są funkcjami ciągłymi w punkcie $x_0 \in A$, to funkcja graniczna $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ jest ciągłą w punkcie x_0 .

1.5 Ciągłość a całka

Jeśli f_n jest ciągiem funkcji ciągłych, to:

- Dla zbieżnego jednostajnie ciągłego ciągu $f_n(x)$:

$$\int_E f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)dx$$

- Dla zbieżnego jednostajnie ciągłego $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$:

$$\int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \sum_{k=1}^n f_k(x)dx$$

1.6 Kryteria zbieżności

1.6.1 Kryterium porównawcze Weierstrassa

Jeśli szereg liczbowy utworzony z ciągu a_n o wyrazach nieujemnych jest zbieżny oraz dla każdego $x \in E$ zachodzi nierówność $|f_n(x)| < a_n$, to szereg funkcyjny $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ jest bezwzględnie jednostajnie zbieżny na E .

1.6.2 Kryterium Dirichleta

Jeżeli $b_n \rightarrow 0$ i jeśli sumy częściowe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ są ograniczone, to $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ jest zbieżny.

1.6.3 Kryterium Abela

Niech $a_n(x)$ oraz $b_n(x)$ będą ciągami funkcyjnymi określonymi w zbiorze A . Jeśli ciąg a_n jest monotoniczny dla każdego x , oraz jest ciągiem wspólnie ograniczonym oraz szereg $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ jest jednostajnie zbieżny w A . Wtedy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ jest jednoznacznie zbieżny w A .

2 Szeregi potęgowe

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

2.1 Twierdzenie Cauchy'ego-Hadamarda

Dla szeregu potęgowego $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, niech $\lambda = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Wtedy promieniem zbieżności szeregu potęgowego jest $R = \frac{1}{\lambda}$. Za wyjątkiem $\lambda = 0$, gdzie $R = \infty$, oraz $\lambda = \infty$, gdzie $R = 0$. Szereg jest zbieżny dla $|z - z_0| < R$ i rozbieżny dla $|z - z_0| > R$. Zbieżność w punkcie $z = z_0$ zależy od ciągu a_n .

Jeśli granica $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ istnieje, to jest równa λ .

2.2 Wzór Eulera

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Możemy też ten wzór dalej rozwijać, wiedząc, że:

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

2.3 Szeregi Taylora

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$