

Termodynamika to nauka, która rozważa układy makroskopowe. W nich ilość cząstek rozważa się sumarycznie, a nie indywidualnie jak w mechanice.

$$N \sim 6.023 \cdot 10^{23}$$

1 Różniczki

Jeśli wiemy, że jakaś własność stanu X , jest funkcją stanu: $X = X(x_1, x_2, \dots, x_n)$, to możemy zapisać:

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial x_1} \right) dx_1 + \left(\frac{\partial X}{\partial x_2} \right) dx_2 + \dots + \left(\frac{\partial X}{\partial x_n} \right) dx_n$$

Dla formy różniczkowej:

$$dz(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

warunek zupełności to:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Jeśli jest on spełniony, to można powiedzieć, że $z(x, y)$ może być funkcją stanu.

Przykład 1.1

Na przykład, założmy, funkcję stanu: $z(x, y) = x^3 + y^2$. Wtedy:

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) dy = 3x^2 dx + 2y dy$$

Ponieważ;

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 0$$

to możemy powiedzieć, że $z(x, y)$ może być funkcją stanu.

2 Stany

- Izotermiczny - stała temperatura
 $dU = 0 \quad \partial W = -\partial Q$
- Izobaryczny - stałe ciśnienie
 $dp = 0, \quad dU = \partial Q, \quad \partial Q = dH$
- Izochoryczny - objętość jest stała
 $\partial W = 0, \quad dU = \partial Q, \quad dV = 0$
- Adiabaticzny - ciepło jest stałe
 $\partial Q = 0, \quad dU = \partial W$

Dla procesu quasi-statycznego, praca wykonana przez gaz przy zmianie objętości:


$$\partial W = -pdV$$

3 Zerowa zasada termodynamiki

W stanie równowagi termodynamicznej nie zachodzą żadne systematyczne zmiany parametrów. Nie zachodzą także żadne systematyczne przepływy wielkości termodynamicznych.

Bycie w stanie równowagi termodynamicznej jest tranzytywne. Jeśli stworzymy trzy zamknięte układy, obok siebie tak aby mogły przekazywać ciepło, to stan się w nich wyrówna prędzej czy później. Dojdzie do stanu równowagi termodynamicznej.

Rozróżniamy dwa rodzaje stanów równowagi. Pełna równowaga termodynamiczna, to prawdziwie pełna równowaga. Nic się nie zmienia ani przepływa. Druga, pozwala na drobne zmiany, w interesującej nas skali czasowej. Można też pominąć niektóre parametry oczywiście.



Rysunek 1: Układ układów w równowadze, które z czasem osiągną równowagę między sobą.

4 Pierwsza zasada termodynamiki

W układzie makroskopowym, energia wewnętrzna układu zostaje zachowana. W skalach mikroskopowych rozważamy energie kinetyczne i potencjalne wszystkich cząstek. Fenomenologicznie rozważamy sumę wszystkich energii w układzie (U). Istnieje wielkość U , która jest f stanu.

$$\partial W = \sum_k X_k dX_k$$

gdzie X_k są parametrami stanu.

Założmy, że $\Delta U = W$, czyli zmiana energii wewnętrznej jest równa pracy wykonanej nad układem. Wtedy, po wykonaniu pracy, w której wrócimy do stanu początkowego, mielibyśmy $W \neq 0 \Rightarrow \Delta U = 0$; oczywista sprzeczność. Stąd, mamy że:

$$dU = \partial W + \partial Q$$

Przykład 4.1

Wiemy, że $U = U(T, V)$, a nad układem można wykonać jedynie pracę objętościową (W_v).

Zatem, $W_v \Rightarrow \partial W = -pdV$. Z pierwszej zasady termodynamiki wiemy, że $dU = \partial W + \partial Q \Rightarrow dU = -pdV + \partial Q$. Możemy też rozisać postać dU :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right) dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right) dV$$

To możemy przekształcić do:

$$\partial Q = pdV + dU \Rightarrow \partial Q = pdV + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right) dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right) dV = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + p \right] dV$$

W tej formie dobrze widac, że Q nie jest funkcją stanu, ale zależy od zmian w objętości i temperaturze.

5 Temperatura i ciepło

Temperatura to parametr makroskopowy opisujący stan równowagi termodynamicznej. Jeżeli dwa układy są w stanie równowagi termodynamicznej to ich temperatury są równe. Jeśli połączymy dwa układy o różnych temperaturach to ich temperatury się wyrównają.

Pojemnością cieplną nazywamy ilość ciepła Q potrzebną do zmiany temperatury.

$$c_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_x$$

Z kolei, ciepło właściwe C_x definiujemy jako:

$$C_x = \frac{c_x}{m}$$

Dla pewnego stanu stałego ciśnienia ciśnienia, mamy:

$$c_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

Dla pewnego stanu stałej pojemności, mamy:

$$c_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

Przykład 5.1

Założmy, izobarę, czyli: $U = U(T, V)$. Na podstawie z 1 zasady termodynamiki, oraz definicji ciepła właściwego, chcemy znaleźć związek między tymi własnościami.

Z definicji ciepła właściwego, mamy:

$$c_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad c_P = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_P$$

Z 1 zasady termodynamiki można w tych warunkach wyprowadzić wzór na ∂Q .

$$\begin{aligned} \partial Q &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right] dV = c_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right] dV \\ &\quad \Downarrow : dT_P \\ \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_P &= c_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \\ c_P - c_V &= \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \end{aligned}$$

6 Gaz Doskonały

$$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{RT}{p}$$

gdzie p to ciśnienie, V to objętość, n to ilość moli gazu, R to stała gazowa, a T to temperatura.

Przykład 6.1

Dla gazu $V = V(p, T)$, $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right) dp + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right) dt$.

$$dV = -\frac{RT}{p^2} dp + \frac{R}{p} dT$$


Gaz doskonały spełnia:

- cząstki poruszają się chaotycznie
- cząstki to punkty materialne $V = 0$
- cząstki podlegają prawom Newtona
- poza momentami zderzeń, na cząstki nie działają siły
- zderzenia są sprężyste

zatem, powietrze w pojemniku spoczywającym o stałej objętości V jest doskonałe.

6.1 Prawa empiryczne

Jest to zbiór praw, dla gazu doskonałego w specyficznych warunkach, z reguły, ograniczenia warunków brzegowych.



6.2 Równanie adiabaty

Przykład 6.2

Wyprowadźmy równanie adiabaty dla gazu doskonałego.

$$pV = nRT \quad C_P - C_V = nR \quad dU = \partial W = -pdV \quad U = U(T)$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT = C_V dT = -pdV = -\frac{nRT}{V} dV \quad C_V \frac{dT}{T} = -\frac{nR dV}{V}$$

Całkujemy, aby wyeliminować dT i dV .

$$C_V \ln T = -nR \ln V + C = -(C_P - C_V) \ln V + C$$

Tutaj C to stała, naturalny efekt całkowania.

$$\ln T^{C_V} = \ln \bar{C} V^{-(C_P - C_V)}$$

$$T^{C_V} = \bar{C} V^{C_V - C_P} \Rightarrow T = \bar{C}^x V^{\frac{C_V - C_P}{C_V}}$$

$$T = \bar{C}^x V^{\frac{C_V - C_P}{C_V}} = \bar{C}^x V^{1 - \kappa}$$

$$nRT = \tilde{C} V^{1 - \kappa}$$

$$pV^\kappa = \tilde{C}$$

Stałe $\bar{C}$, $\bar{C}^x$, $\tilde{C}$ to po prostu różne stałe, wynikające z logarytmów. Zazwyczaj, te stałe są stałe dla **danej adiabaty**. To oznacza, że można przyrównać te stałe do siebie wraz z zmianą jakiegoś parametru (np. objętości).

Przykład 6.3

Zakładając środowisko adiabatyczne, trzeba wyprowadzić pracę przy zmianie objętości.

$$\frac{p_1}{V_1} \rightarrow \frac{p_2}{V_2} \quad W = ?$$

$$\partial W = -pdV \quad pV^\kappa = \tilde{C} \Rightarrow p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa \quad pV = nRT$$

$$p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa \quad W = \int \partial W = - \int_{V_1}^{V_2} p \cdot dV = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1^\kappa}{V^\kappa} \cdot dV = -p_1 V_1^\kappa \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V^\kappa} \cdot dV$$

$$W = -p_1 V_1^\kappa \left[\frac{V^{-\kappa+1}}{1-\kappa} \right]_{V_1}^{V_2} = \frac{p_1 V_1}{\kappa-1} \left(\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{1-\kappa} - 1 \right)$$

To jest jakaś postać, ale da się jeszcze uprościć ją.


$$\left. \begin{aligned} V = \frac{nRT}{p} &\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2 p_1}{T_1 p_2} \\ p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa &\Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa \end{aligned} \right\} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{1-\kappa} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa = \frac{T_2 p_1}{T_1 p_2} \cdot \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$W = \frac{p_1 V_1}{\kappa-1} \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) = \frac{p_1 V_1}{(\kappa-1)T_1} (T_2 - T_1) = \frac{nR}{\kappa-1} (T_2 - T_1)$$

6.3 Inne równania

- $W = p(V_1 - V_2) = nR(T_1 - T_2)$ - izobara
- $W = nRT \ln \frac{V_1}{V_2} = nRT \ln \frac{p_2}{p_1}$ - izoterma
- $W = 0$ - izochora

6.4 Doświadczenie Joule'a



Rysunek 2: Diagram eksperymentu Joule'a

Po usunięciu przegrody, temperatura gazu się nie zmienia. Stąd:

$$U \neq U(V)$$

U jest funkcją temperatury.

$$dU = n \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT = nC_V dT \quad U(T) = nC_V T$$

6.5 Rozkład Maxwella

Rozkład prawdopodobieństwa prędkości cząstek gazu doskonałego v w danej temperaturze to:

$$\rho(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{m_0 v^2}{2k_B T}}$$

Przykład 6.4


$$\langle f(v) \rangle = \int_0^\infty f(v) \rho(v) dv$$

$$\begin{aligned} \langle v^2 \rangle &= \int_0^\infty v^2 \rho(v) dv = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty v^4 e^{-\frac{m_0 v^2}{2k_B T}} dv = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{\frac{m_0}{2k_B T}}} = \\ &= \frac{3}{2} \pi^{\frac{3}{2}} \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{m_0}{2k_B T} \right)^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{2} \left(\frac{m_0}{2k_B T} \right)^{-\frac{2}{2}} = 3 \frac{k_B T}{m_0} \end{aligned}$$

6.6 Zasada ekwipartycji energii

Na każdy stopień swobody, średnia energia kinetyczna gazu wynosi $\frac{1}{2} k_B T$

7 Cykle termodynamiczne



Rysunek 3: Przykładowy cykl termodynamiczny

Przykład 7.1

- $A \rightarrow B$:
 $\partial W_{AB} = -pdV = 0$
 $W_{AB} = 0$

- $B \rightarrow C$:
 $\partial W_{BC} = -pdV$

$$W_{BC} = - \int p dV = - \int_{V_1}^{V_2} p(v) dV$$

Jeśli założymy, że $p(v)$ jest liniowa w $[V_1, V_2]$:


$$W_{BC} = - \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{p_2 - p_1}{V_2 - V_1} (V_2 - V) + p_1 \right) dV = - \left(p_1 (V_2 - V_1) + \frac{1}{2} (p_2 - p_1) (V_2 - V_1) \right)$$

- $A \rightarrow C$:
 $\partial W_{AC} = -p_1 dV$

$$W_{AC} = -p_1 \int_{V_1}^{V_2} dV = -p_1 (V_2 - V_1)$$

7.1 Cykl Carnota

Jest to cykl z czterema przejściami, symetrycznie, izoterma(T_1) - adiabata - izoterma(T_2) - adiabata. $T_2 > T_1$. W ramach cyklu wydzielane i pobierane jest ciepło.



Rysunek 4: Cykl Carnota

Z definicji:

$$\eta = \frac{\bar{W}}{Q_{AB}} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Z pierwszej zasady termodynamiki:


$$\bar{W} = Q_{AB} + Q_{CD}$$

Jak się okazuje, każdy kolejny cykl da się przybliżyć przez cykl Carnota, więc, poniższe jest aplikowalne, mniej więcej, dla każdego cyklu:

$$\oint \frac{\partial Q}{T} = \frac{1}{T_2} \int_B^C \partial Q + 0 + \frac{1}{T_1} \int_C^D \partial Q + 0 = \frac{Q_{AB}}{T_2} + \frac{Q_{CD}}{T_1} = 0$$

$$\Delta S = \int_A^B \frac{\partial Q}{T}$$

7.2 Cykl Otta




Rysunek 5: Cykl Otta

$$Q_{DA} = nC_V(T_A - T_D) > 0 \quad Q_{BC} = nC_V(T_C - T_B) > 0$$

$$\eta = 1 - \frac{T_B - T_C}{T_A - T_D} = 1 - r^{1-\kappa}$$

$$r = \frac{V_C}{V_D} > 1$$

7.3 Cykl Diesel'a



Rysunek 6: Cykl Diesel'a

$$r = \frac{V_D}{V_A} \quad k = \frac{V_B}{V_A}$$

$$Q_{CD} = nC_V(T_D - T_C) < 0 \quad Q_{AB} = nC_p(T_B - T_A) > 0$$

$$\eta = 1 - \frac{C_V(T_C - T_D)}{C_p(T_B - T_A)} = 1 - \frac{(T_C - T_D)}{\kappa(T_B - T_A)}$$

7.4 Samorzutne wyrównanie temperatur

Jest to proces nieodwracalny. W ramach niego, w czasie, po usunięciu izolatora, dochodzi do wyrównania temperatur między dwoma układami.

$$\begin{array}{c} n=1 \\ T_1 \\ V_1 \end{array} \parallel \begin{array}{c} n=1 \\ T_2 \\ V_2 \end{array} \xrightarrow{t} \begin{array}{c} n=1 \\ T_k \\ V_1 \end{array} \parallel \begin{array}{c} n=1 \\ T_k \\ V_2 \end{array}$$

$$U_p = C_V(T_1 + T_2) + 2E \quad U_k = C_V 2T_k + 2E$$

$$S_p = C_V \ln T_1 + R \ln V_1 + C_V \ln T_2 + R \ln V_2 + 2C$$

$$S_k = 2C_V \ln T_k + R \ln V_1 + R \ln V_2 + 2C$$

$$\Delta S = S_k - S_p = C_V \ln \left(\frac{T_k^2}{T_1 T_2} \right)$$

7.5 Odwracalne wyrównanie temperatur

$$\begin{array}{c} n=1 \\ T_1 \\ V_1 \end{array} \parallel \begin{array}{c} n=1 \\ T_2 \\ V_2 \end{array} \xrightarrow{\Delta V > 0} \begin{array}{c} n=1 \\ T_1 \\ V_1 \end{array} \parallel \begin{array}{c} n=1 \\ T_1 \\ V_1 \end{array} \xrightarrow{\Delta U > 0} \begin{array}{c} n=1 \\ T_k \\ V_1 \end{array} \parallel \begin{array}{c} n=1 \\ T_k \\ V_2 \end{array}$$

8 Entropia

Entropia to funkcja stanu, która się zmienia, gdy ciepło jest wymieniane między układem i jego otoczeniem:

$$dS = \frac{\partial Q}{T}$$

$$S = k_B \ln T$$

Od czego zależy S ?

- Liczba cząstek
- Struktura materiału
- Rozpad cząstek
- Namagnesowanie
- Wzrost prędkości cząstek

Przykład 8.1

Obliczmy entropię gazu doskonałego.

$$S = S(V, T) \quad dU = \partial Q + \partial W = \partial Q - p dV = nC_V dT \quad pV = nRT$$

$$\partial Q = p dV + nC_V dT \Rightarrow dS = \frac{p}{T} dV + \frac{nC_V}{T} dT = \frac{nR}{V} dV + \frac{nC_V}{T} dT$$

Mamy teraz postać różniczkową. Aby uzyskać postać funkcji, musimy zcałkować:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 dS = nR \ln \frac{V_2}{V_1} + nC_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$S(T, V) = \int dS = nR \ln(V) + nC_V \ln(T) + C(n)$$

Jeśli wykorzystamy wzór na C_V dla gazu doskonałego, możemy ten wzór jeszcze uprościć

$$C_V = \frac{\sigma}{2} R \Rightarrow S(V, T) = nR \ln(VT^{\frac{\sigma}{2}}) + C$$

8.1 Własności

- Addytywność: $A = B \cup C \rightarrow S_A = S_B + S_C$
- $dE = T dS$
- $\partial Q = T dS$

8.2 Entropia gazu doskonałego

$$S(V, T) = C_0(N) + Nk_B \ln(BT^{\frac{3}{2}})$$

Dla 1 atmosfery mamy:

$$n = \frac{N}{V} \quad \lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_B T}} \quad S = Nk \left[\frac{5}{2} - \ln(n\lambda^3) \right]$$

9 Entalpia

Entalpia to suma wewnętrznej energii systemu termodynamicznego.

$$H(S, p) = U + pV$$

Jest to funkcja stanu, zależna od entropii i ciśnienia.

10 Relacje Maxwella

Jest to zbiór relacji, które można wyprowadzić z definicji potencjałów termodynamicznych, przy pewnych założeniach. W ramach relacji, zakładamy proces odwracalny na gazie doskonałym, co tłumaczy się do:

$$\left. \begin{array}{l} \partial Q = T dS \\ \partial W = -p dV \end{array} \right\} \Rightarrow dU = \partial Q + \partial W = T dS - p dV$$

Przykład 10.1

Na podstawie definicji energii wewnętrznej układu U , możemy wyprowadzić pierwszą relację Maxwella.

$$U = U(S, V)$$

Ponieważ:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV = TdS - pdV$$

to możemy zauważyć że:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -p$$

Jeśli potem obliczymy pochodne mieszane, i założymy, że muszą być równe bo U jest "ładną funkcją":

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V &= \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S \\ \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_V &= -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \end{aligned} \right\} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$

Przykład 10.2

Na podstawie definicji entalpii, możemy wyprowadzić drugą relację Maxwella.

$$H = U + pV = H(S, p)$$

Rozwijając dH na podstawie definicji H :

$$dH = dU + d(pV) = \partial Q + \partial W + d(pV) = TdS - pdV + Vdp + pdV = TdS + Vdp$$

równocześnie, z definicji $H = H(s, p)$:

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p dS + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S dp$$

Teraz, podobnie jak w poprzednim przykładzie, możemy zauważyć, że:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S$$

i co za tym idzie, zakładając, że H to "ładna funkcja":

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$$

Przykład 10.3

Na podstawie energii swobodnej (Helmholtza) F , możemy wyprowadzić kolejną relację Maxwella.

$$F = U - TS = F(T, V)$$

Rozwijając z definicji dF :

$$dF = dU - SdT - TdS = TdS - pdV - SdT - TdS = -pdV - SdT$$

Na podstawie definicji, podobnie jak w poprzednich przykładach:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S \quad \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -p$$

I teraz, po podstawieniu i ponownym założeniu "ładnego" F :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

Przykład 10.4

Na podstawie entalpii swobodnej (Gibbsa) G , możemy wyprowadzić kolejną relację Maxwella

$$G = H - TS = G(T, p)$$

Rozwijając z definicji G :

$$\begin{aligned} dG = dH - SdT - TdS &= dU + d(pV) - SdT - TdS = \partial Q + \partial W + Vdp + pdV - SdT - TdS = \\ &= Vdp - SdT \end{aligned}$$

Dostajemy następujące relacje:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$$

które po założeniu "ładnego" G :

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

Relacje są prawdziwe, jeśli spełnione są założenia.

11 Zespół kanoniczny

Przykład 11.1

Dowód

$$U = \frac{\partial}{\partial \beta}(\beta F)_V \quad \beta = \frac{1}{T}$$

Najpierw, rozbijemy prawą część równania:

$$U = \frac{\partial}{\partial \beta}(\beta F)_V = F + \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V \beta = F + \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial \beta}\right)_V \beta$$

Jeśli rozwiniemy definicję F , oraz jej różniczkę, to dostaniemy uproszczenie:

$$F = U - TS \Rightarrow dF = dU - TdS - SdT = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV \Rightarrow \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S$$

Następnie z własności pochodnej możemy uprościć drugi czynnik:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \beta}\right)_V = \left(\frac{\partial \beta^{-1}}{\partial \beta}\right)_V = -\frac{1}{\beta^2} = -T^2$$

Co finalnie daje nam:

$$U = F + (-S)(-T^2)\beta = F + ST = U - TS + TS = U \quad \square$$

Przykład 11.2

Dowód

$$H = \frac{\partial}{\partial \beta}(BG)_p$$

Rozwijając równanie, uzyskamy znaną nam już postać:

$$H = \frac{\partial}{\partial \beta}(BG)_p = G + \beta \left(\frac{\partial G}{\partial \beta}\right)_p = G + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial \beta}\right)_p \beta$$

Jeśli rozwiniemy definicję G i jej różniczkę, to dostaniemy uproszczenie:

$$G = H - TS \Rightarrow dG = dH - TdS - SdT = -SdT + Vdp = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T dp \Rightarrow \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$$

Z poprzedniego przykładu już znamy drugie uproszczenie, stąd:

$$H = G + (-S)(-T^2)\beta = G + TS = H - TS + TS = H \quad \square$$

Przykład 11.3

Dowód

$$\left(\frac{\partial \mathcal{C}_V}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_V$$

Jeśli rozwiniemy definicję $\mathcal{C}_V$, to dostaniemy wyrażenie z S :

$$\mathcal{C}_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{T dS}{dT}\right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$$

Z definicji S , możemy wyrazić $\mathcal{C}_V$ przy pomocy F :

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \Rightarrow dS = - \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = - \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V \Rightarrow \mathcal{C}_V = -T \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V$$

Z definicji p , możemy prawą stronę równania zapisać też przy pomocy F :

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_V = - \frac{\partial^3 F}{\partial T^2 \partial V}$$

Na koniec, z definicji różniczki, możemy przyrównać obydwie strony:

$$\left(\frac{\partial \mathcal{C}_V}{\partial V}\right)_T = -T \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V = T \left(- \frac{\partial^3 F}{\partial T^2 \partial V}\right)_V = T \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_V \quad \square$$

Przykład 11.4

Dowód

$$\left(\frac{\partial \mathcal{C}_p}{\partial p}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_p$$

Jeśli rozwiniemy definicję G i jej różniczki, to będziemy mogli wyrazić V przez G :

$$G = H - TS \Rightarrow dG = dH - TdS - SdT = -SdT + Vdp = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T dp \Rightarrow \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$$

Teraz możemy wyrazić prawą stronę równania przez G :

$$-T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_p = -T \frac{\partial^2}{\partial T^2} V = -T \frac{\partial^2}{\partial T^2} \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T$$

Na koniec wystarczy tylko rozwinąć $\mathcal{C}_p \rightarrow \partial Q \rightarrow dS \rightarrow G$ i przyrównać obydwie strony równania:

$$\left(\frac{\partial \mathcal{C}_p}{\partial p}\right)_T = \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p = \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{T dS}{dT}\right)_p = -T \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_p = -T \frac{\partial^3 G}{\partial T^2 \partial p} \quad \square$$

12 Fizyka statystyczna

12.1 Rozkład Mikrokanoniczny

Dla układu izolowanego o energii E :

$$\Gamma = \Gamma(E), \quad S = S(\Gamma) = S(\Gamma(E)) = S(E)$$

Prawdopodobieństwo uzyskania stanu Q :

$$\mathbb{P}(Q) = \frac{1}{\Gamma}$$

W układzie izolowanym w stanie równowagi entropia jest maksymalna.

12.2 Temperatura statystyczna

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$

Przykład 12.1

Wyobraźmy sobie stan równowagi, między dwoma podukładami: $(E_1, T), (E_2, T)$.

$$E = E_1 + E_2 \quad S = S_1(E_1) + S_2(E_2)$$

Ze stanu równowagi, możemy określić, że:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E} \right) = 0$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E_1} \right) = \left(\frac{\partial S_1(E_1)}{\partial E_1} \right) + \left(\frac{\partial S_2(E_2)}{\partial E_1} \right) = 0$$

$$\frac{1}{T_1} + \left(\frac{\partial S_2(E_2)}{\partial E_1} \right) = 0$$

$$\frac{1}{T_1} + \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_2} \right) \left(\frac{\partial E_2}{\partial E_1} \right) = 0$$

$$\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} \left(\frac{\partial E_2}{\partial E_1} \right) = \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0 \Rightarrow T_1 = T_2$$

12.3 Trzecia zasada termodynamiki

Dla substancji tworzących idealne kryształy:

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0 \quad \lim_{T \rightarrow 0} \gamma = 1$$

Przykład 12.2

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0 \Rightarrow \lim_{T \rightarrow 0} \frac{TS}{T} = 0 \Rightarrow \lim_{T \rightarrow 0} \frac{S + T \frac{\partial S}{\partial T}}{1} = 0$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_X = 0 \Rightarrow \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_X = 0 \Rightarrow \lim_{T \rightarrow 0} C_X = 0$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_V = 0 \quad \lim_{T \rightarrow 0} C_p = 0$$

12.4 Druga zasada termodynamiki

Rozważmy układ, w pewnym otoczeniu.

$$dS = \frac{\partial Q}{T} \quad dS^{(o)} = \frac{\partial Q}{T^{(o)}}$$

$$dS = \frac{\partial Q}{T} = \frac{\partial Q}{T} + \frac{\partial Q}{T^{(o)}} - \frac{\partial Q}{T^{(o)}} = \frac{\partial Q}{T^{(o)}} + \left(\frac{\partial Q}{T} - \frac{\partial Q}{T^{(o)}} \right)$$

Stąd:

$$\Delta S = \Delta(\partial S)_{\text{tr}} + \Delta(\partial S)_{\text{cr}}$$

$$\Delta(\partial S)_{\text{tr}} = \int \frac{\partial Q}{T^{(o)}} \quad \Delta(\partial S)_{\text{cr}} = \int \left(\frac{\partial Q}{T} - \frac{\partial Q}{T^{(o)}} \right)$$

Wszystkie procesy fizyczne zachodzą w taki sposób, że:

$$\Delta S_{\text{cr}} \geq 0$$

12.5 Rozkład kanoniczny

W rozkładzie kanonicznym układ i otoczenie są izolowane, ale układ w otoczeniu nie jest izolowany. $T = \text{const}$, $N = \text{const}$

Dla stanów układu Γ_o i sumie wszystkich stanów Γ_c .

$$\mathbb{P}(Q) = \frac{\Gamma_o}{\Gamma_c} \quad \Gamma_o = \exp\left(\frac{S_o(Q)}{k_B}\right)$$

$$S_o(Q) = S_o(E_o) = S_o(E_c - E(Q)) = S_o(E_c) - \left(\frac{\partial S_o}{\partial E_c}\right) E(Q) + \dots$$

Ponieważ $E_c \approx E_o$, $S_o(Q) = S_o(E_c) - \left(\frac{\partial S_o}{\partial E_o}\right) E(Q) = S_o(E_c) - \frac{1}{T} E(Q)$

$$\mathbb{P}(Q) = A \exp\left[-\frac{E(Q)}{k_B T}\right]$$

Ponieważ $\mathbb{P}(Q)$ musi być unormowane, $\sum_Q \mathbb{P}(Q) = 1$:

$$\sum_Q A \exp\left[-\frac{E(Q)}{k_B T}\right] = 1 \quad A = \frac{1}{\sum_Q \exp\left[-\frac{E(Q)}{k_B T}\right]}$$

$$z = \sum_Q \exp\left(\frac{E(Q)}{k_B T}\right) \quad \mathbb{P}(Q) = \frac{1}{z} \exp\left[-\frac{E(Q)}{k_B T}\right]$$

Znajomość sumy stanów wystarcza, aby wyliczyć wszystkie parametry stanu.

12.6 Wielki rozkład kanoniczny

Możliwa jest wymiana cząstek, $T = \text{const}$.

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad z = \sum_N \sum_{Q_N} \mathbb{P}(Q_N, N)$$

$$\mathbb{P}(Q, N) = \frac{1}{z} \exp[-\beta(E(Q_N) - \mu N)]$$

13 Praca minimalna

$$W \geq \Delta U - T^{(o)} \Delta S$$

Proces	Parametry stałe	Minimalna praca	Warunek Równowagi	Minimum w równowadze
izoentropowy	S	$W \geq \Delta U$	$0 \geq \Delta U$	U
izoentropowo-choryczny	S, V	$\tilde{W} \geq \Delta U$	$0 \geq \Delta U$	U
izoentropowo-baryczny	S, p	$\tilde{W} \geq \Delta H$	$0 \geq \Delta H$	H
izotermiczny	T	$\tilde{W} \geq \Delta F$	$0 \geq \Delta F$	F
izotermiczno-choryczny	T, V	$\tilde{W} \geq \Delta F$	$0 \geq \Delta F$	F
izotermiczno-baryczny	T, p	$\tilde{W} \geq \Delta G$	$0 \geq \Delta G$	G

Tabela 1: Przegląd procesów termodynamicznych

Przykład 13.1

Z pierwszej i drugiej zasady termodynamiki:

$$\begin{aligned}\partial Q &= dU - \partial W \quad \Delta S - \int_A^B \frac{\partial Q}{T} \geq 0 \\ \Delta S - \int_A^B \frac{dU - \partial W}{T^{(o)}} &\geq 0 \quad T^{(o)} \Delta S - \int_A^B dU + \int_A^B \partial W \geq 0 \\ T^{(o)} \Delta S - \Delta U + \Delta W &\geq 0 \Rightarrow W \geq \Delta U - T^{(o)} \Delta S\end{aligned}$$

13.1 Procesy przy stałej entropii

$$\Delta S = 0 \quad W \geq \Delta U$$

13.1.1 Stałe ciśnienie

$$\begin{aligned}\Delta p &= 0 \quad W = -p\Delta V + \tilde{W} \\ \tilde{W} &\geq \Delta H\end{aligned}$$

13.1.2 Stała objętość

$$\begin{aligned}\Delta V &= 0 \quad W = \tilde{W} \\ \tilde{W} &\geq \Delta U\end{aligned}$$

13.2 Procesy przy stałej temperaturze

$$W \geq \Delta U - T\Delta S \Rightarrow W \geq \Delta F$$

13.2.1 Stała entropia

$$\Delta S = 0 \quad W = \tilde{W} \geq \Delta F$$

13.2.2 Stałe ciśnienie

$$\tilde{W} - p\Delta V \geq \Delta F \Rightarrow \tilde{W} \geq \Delta(F + pV) = \Delta G$$

14 Układy wielofazowe

Założmy, że mamy układ zamknięty, z substancjami o różnych stężeniach w różnych fazach.

$$\begin{aligned}\sum_i V_i &= \text{const} \quad \sum_i S_i = \text{const} \quad dU \leq 0 \\ dU &= \sum_i (T_i dS_i + p_i dV_i)\end{aligned}$$

Szukamy minimum funkcji energii U , przy powyższych warunkach:

$$\begin{aligned}F &= U - \lambda \left(\sum_i V_i - V \right) - \beta \left(\sum_i S_i - S \right) \\ dF &= dU - \lambda \sum_i dV_i - \beta \sum_i dS_i \quad dF = \sum_i T_i dS_i - \sum_i p_i dV_i - \lambda \sum_i dV_i - \beta \sum_i dS_i \\ dF &= \sum_i (T_i - \beta) dS_i - \sum_i (p_i + \lambda) dV_i\end{aligned}$$

$$dF = 0 \Rightarrow \forall_i (T_i - \beta = 0) \wedge (p_i + \lambda = 0)$$

Zatem, musi zachodzić równowaga cieplna:

$$T_1 = T_2 = \dots = T_n = \beta$$

oraz równowaga mechaniczna:

$$p_1 = p_2 = \dots = p_n = -\lambda$$

15 Potencjał chemiczny

Potencjał chemiczny zapisujemy jako μ .

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,n} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V} dn \rightarrow \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V}$$

$$dF = -SdT - pdV + \mu dn \rightarrow \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial n}\right)_{T,V}$$

$$dH = TdS + Vdp + \mu dn \rightarrow \mu = \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,p}$$

$$dG = Vdp - SdT + \mu dn \rightarrow \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P}$$

15.1 Wielki potencjał termodynamiczny

$$\Omega = F - \mu n$$

$$d\Omega = -SdT - pdV - nd\mu$$

15.2 Układy otwarte

Dla n moli, oraz μ potencjału chemicznego

$$U = Q + W + \Delta E_m \quad dU = \partial Q + \partial W + \partial E_m$$

$$\partial Q = TdS \quad \partial W = -pdV \quad \partial E_m = \mu dn$$

16 Równania Gibbsa-Durbena

Przykład 16.1

Dla 1 fazy:

$$G(T, p, n_1, \dots, n_\alpha)$$

Dla λ większego układu:

$$G(T, p, \lambda n_1, \dots, \lambda n_\alpha) = \lambda G(T, p, n_1, \dots, n_\alpha)$$

$$\frac{\partial G(T, p, \lambda n_1, \dots, \lambda n_\alpha)}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^{\alpha} \frac{\partial G}{\partial (\lambda n_i)} \frac{\partial (\lambda n_i)}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^{\alpha} \frac{\partial G(T, p, \lambda n_1, \dots, \lambda n_\alpha)}{\partial (\lambda n_i)} n_i$$

$$G(T, p, n_1, \dots, n_\alpha) = \sum_{i=1}^{\alpha} \frac{\partial G(T, p, n_1, \dots, n_\alpha)}{\partial n_i} n_i = \sum_{i=1}^{\alpha} n_i \mu_i$$

$$dG = \sum_i (n_i d\mu_i + \mu_i dn_i) = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i = 0$$

$$-SdT + Vdp = \sum_i n_i d\mu$$

$$\alpha + 2 - \beta = 0$$

17 Gaz van der Waalsa

Dla n moli opisanych przez $a, b > 0$:

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$