莫德納 COVID-19 疫苗接種須知

衛生福利部疾病管制署 2021 年 6 月 12 日

▮ 莫德納 COVID-19 疫苗 (mRNA-1273)

莫德納(Moderna)之 COVID-19 疫苗是 SARS-CoV-2 病毒棘蛋白之 mRNA 疫苗。本疫苗已通過美國、歐盟等先進國家及我國緊急授權使用,適用於 18 歲以上,接種 2 劑,並於臨床試驗中位數為 9 週的追蹤期間,證實可預防 94% 有症狀之感染 1。我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議兩劑接種間隔至少 4 週(28 天)。

■ 疫苗接種禁忌與接種前注意事項

◆ 接種禁忌:對於疫苗成分有嚴重過敏反應史,或先前接種本項疫苗劑次曾發生嚴重過敏反應 者,不予接種。

◆ 注意事項:

- 本疫苗不得與其他廠牌交替使用。若不慎接種了兩劑不同廠牌 COVID-19 疫苗時,不建議 再接種任何一種產品。
- 本疫苗不得與其他疫苗同時接種,與其他疫苗的接種間隔建議至少14天,如小於上述間隔,則各該疫苗亦無需再補種。
- 3. 發燒或正患有急性中重度疾病者,宜待病情穩定後再接種。
- 4.免疫功能低下者,包括接受免疫抑制劑治療的人,對疫苗的免疫反應可能減弱。(尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據)
- 5.目前缺乏孕婦接種 COVID-19 疫苗之臨床試驗及安全性資料,而臨床觀察性研究顯示孕婦感染 SARS-CoV-2 病毒可能較一般人容易併發重症。孕婦若為 COVID-19 之高職業暴露風險者或具慢性疾病而易導致重症者,可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後,評估是否接種。
- 6.若哺乳中的婦女為建議接種之風險對象(如醫事人員),應完成接種。目前對哺乳中的婦女接種 COVID-19 疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估,但一般認為並不會造成相關風險。接種 COVID-19 疫苗後,仍可持續哺乳。

■ 接種後注意事項及可能發生之反應

- 1.為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應,接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀 15 分鐘,離開後請自我密切觀察 15 分鐘,但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾,接種後仍請於接種單位或附近留觀至少 30 分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少 2 分鐘,並觀察是否仍有出血或血腫情形。
- 2.疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫,通常於數天內消失,其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心,這些症狀隨年齡層增加而減少,通常輕微並於數天內消失。接種疫苗後可能有發燒反應(≥38°C),一般約48小時可緩解。
- 3.如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀,應儘速就醫釐清病因,請您就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間,以做為診斷參考。若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件,可經由醫療端或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」(https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/3-aXITBq4ggn5Hg2dveHBg)。
- 4.依據各國疫苗上市後安全性監測,曾有報告極少數年輕族群在接種 mRNA 疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件,大多發生在接種後數天內。建議接種 mRNA 疫苗後,應注意如出現胸痛、喘或心悸等症狀,請立即就醫並說明疫苗接種史。
- 5.完成疫苗接種後,雖可降低罹患 COVID-19 的機率,但仍有可能感染 SARS-CoV-2,民眾仍需注重保健與各項防疫措施,以維護身體健康。

▮ 仿單所列之不良反應

頻率	症狀
極常見 (≥1/10)	接種部位疼痛、腫脹;疲倦;頭痛;肌肉痛;畏寒;關節痛; 發燒;淋巴結腫大;噁心;嘔吐
常見 (≥1/100~<1/10)	接種部位紅斑;蕁麻疹;泛紅
不常見(≥1/1,000~<1/100)	接種部位搔癢
罕見 (<1/1000)	顏面神經麻痺;臉部腫脹
目前尚不清楚	立即型過敏性反應; 過敏

卷老資訊

https://www.who.int/publications/m/item/moderna-covid-19-vaccine-(mrna-1273)

如果您願意加入『V-Watch 疫苗接種 - 健康回報』,請您掃描接種院所提供之 QR code,並於疾管家提醒您時回覆健康情形,以應用於疫苗安全性評估。感謝您的協助!

