

磁压力和磁张力

磁流体区别于普通流体的一个显著特征,是在磁流体中存在磁场和电流相互作用形成的洛仑

兹力, 而电流也可以从磁场得到 ($\mathbf{j} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B}$)。因此从牛顿方程看

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{j} \times \mathbf{B} - \nabla P,$$

其中单位体积的受力多出的项为

$$\mathbf{j} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = \nabla \cdot \left(-\frac{B^2 \mathbf{I}}{2\mu_0} + \frac{\mathbf{B}\mathbf{B}}{\mu_0} \right)$$

其中, 磁压力为 $\frac{B^2}{2\mu_0}$, 各向同性, 而磁张力大小为 $\frac{B^2}{\mu_0}$, 是沿磁力线方向产生的张力。

利用矢量公式

$$\nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}) = \mathbf{p} \times (\nabla \times \mathbf{q}) + \mathbf{q} \times (\nabla \times \mathbf{p}) + (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{q} + (\mathbf{q} \cdot \nabla) \mathbf{p}$$

还可以得到 $(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = -\nabla \frac{B^2}{2} + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}$, 则

$$\mathbf{j} \times \mathbf{B} = -\frac{1}{2\mu_0} \nabla B^2 + \frac{(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}}{\mu_0} = -\nabla \frac{B^2}{2\mu_0} + \mathbf{b}(\mathbf{b} \cdot \nabla \frac{B^2}{2\mu_0}) + \frac{B^2}{\mu_0} (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{b}$$

其中, 最右边第一项是各向同性的磁压力, 第二项在平行方向抵消磁压力梯度力 (因为 $\mathbf{j} \times \mathbf{B}$ 本来就没有平行磁场的分量), 第三项是磁张力引起, 与磁张力和曲率成正比, 是弯曲磁力线的恢复力, 指向曲率中心。

磁场的冻结和扩散

磁场的变化方程为

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \eta \mathbf{j}$$

其中, 我们在得到电场的广义欧姆定律的小量中, 只保留了电阻项。