Abbott

TÚCICLO TÚRITMO

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS (AOC)

CÓMO ACTÚAN	EFECTIVIDAD[1]		CUÁNDO INICIAR	MODO / FRECUENCIA DE USO	OPCIONES	BENEFICIOS ADICIONALES
	USO CORRECTO*	USO TÍPICO*				
Inhiben la ovulación	0,3	9	**En cualquier momento del mes:**  **>5 días desde el inicio de la menstruación, necesita método de respaldo por 7 días.**	Una píldora diaria a la misma hora. **21 píldoras:** descansa 7 días antes de iniciar el nuevo envase. **28 píldoras:** no descansa entre un envase y otro.	**Bellanew** 1,5mg Estradiol hemidrato / 2mg Dienogest	**Estrógeno bioidéntico al natural:** • Menor riesgo de eventos adversos.[2] • Menor impacto metabólico.[2] • Potente actividad antiandrogénica (mejoría de acné, hirsutismo, piel y cabello grasos).[3]
					Bellaface 2mg Dienogest /0,03mg Etinilestradiol	• Actividad antiandrogénica.[3] • Reducción de la intensidad y duración del sangrado menstrual.[4] • Mejoría de la dismenorrea.[5]
					Bellaface Suave 2mg Dienogest /20mg Etilestradiol	• Actividad antiandrogénica con menos carga hormonal.[6]
					Femelle Drospirenona 3mg/etinilestradiol 0,02 mg	• Mejoría de los síntomas del síndrome disfórico premenstrual (SDPM).[7] • Mejoría de la dismenorrea.[7] • Actividad antiandrogénica.[7] • Actividad antimineralocorticoide.[5]
					Yax Drospirenona 3,0mg / Etinilestradiol 0,003mg	**Propiedades antimineralocorticoides:** • Sin impacto sobre el peso corporal.[5] • Mejoría de la dismenorrea.[7]
					Yaxibelle Drospirenona 3,0mg/Etinilestradiol 0,002mg	• Mejoría de los síntomas del síndrome disfórico premenstrual (SDPM).[7] • Mejoría de la dismenorrea.[7] • Actividad antiandrogénica.[7] • Actividad antimineralocorticoide.[5]
					Gynorelle Clormadinona/ Acetato 2mg / Etinilestradiol 0,02 mg	• Efecto neuroendocrino que promueve sensación de bienestar.[8] • Mejoría del estado de ánimo, reducción de molestias emocionales y físicas.[8]
					Gynorelle 30 Clormadinona Acetato 2mg / Etinilestradiol 0,03 mg	• Efecto neuroendocrino que promueve sensación de bienestar.[8] • Mejoría del estado de ánimo, reducción de molestias emocionales y físicas.[8]
					Sinovul levonorgestrel 0,15mg /etinilestradiol0,03mg	• Regulación del ciclo.[5]

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL CUERPO MÉDICO

Abbott

TÚCICLO TÚRITMO

ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES COMBINADOS (AIC)

CÓMO ACTÚAN	EFECTIVIDAD[1]		CUÁNDO INICIAR	MODO / FRECUENCIA DE USO	OPCIONES	BENEFICIOS ADICIONALES
	USO CORRECTO*	USO TÍPICO*				
Inhiben la ovulación	00,5	3	**En cualquier momento del mes:** **>7 días** desde el inicio de la menstruación, necesita método de respaldo por 7 días.	Una inyección cada 4 semanas (30 días calendario)	**Nofertyl** Enantato de Noretisterona 50mg + **Valerato** de estradiol 5mg	• Buena tolerabilidad, regularización del ciclo, mejoría de la dismenorrea.[9] • Menor dolor con la aplicación por su vehículo (aceite de sésamo).[10]

ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA

CÓMO ACTÚAN	EFECTIVIDAD[1]	CUÁNDO INICIAR	MODO / FRECUENCIA DE USO	OPCIONES	BENEFICIOS ADICIONALES
Inhiben el pico de LH para impedir la ovulación	1	Lo más pronto posible después de tener relaciones sexuales sin protección **(hasta 72 horas)**	2 comprimidos de 0,75 mg en una sola toma	**Postday** Levonorgestrel 0.75 mg	• Lo ideal es encontrar un anticonceptivo de uso regular para que realmente sea anticoncepción de emergencia el uso dado.[1]

IMPLANTES SUBDÉRMICOS

CÓMO ACTÚAN	EFECTIVIDAD[1]		CUÁNDO INICIAR	MODO / FRECUENCIA DE USO	OPCIONES	BENEFICIOS ADICIONALES
	USO CORRECTO*	USO TÍPICO*				
Inhiben la ovulación Espesan el moco cervical	0,1	0,1	En cualquier momento del mes: **>7 días** desde el inicio de la menstruación, necesita método de respaldo por 7 días.	 Inserción del implante en el brazo de la usuaria cada 3, 4 o 5 años, dependiendo de la marca.	**Sinoimplant** (75mg Levonorgestrel por cada barra)	• Efectividad durante 4 años.[11] • Seguro en el período de lactancia.[11] • No requiere ninguna acción diaria o mensual por parte de la usuaria.[11]

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL CUERPO MÉDICO

Abbott

TÚCICLO TÚRITMO

ANILLO VAGINAL ANTICONCEPTIVO COMBINADO

CÓMO ACTÚAN	EFECTIVIDAD[1]		CUÁNDO INICIAR	MODO / FRECUENCIA DE USO	OPCIONES	BENEFICIOS ADICIONALES
	USO CORRECTO*	USO TÍPICO*				
Inhiben la ovulación	0,3	7	**En cualquier momento del mes:** **>5 días** desde el inicio de la menstruación, necesita método de respaldo por 7 días.	 La usuaria debe llevar el anillo puesto todo el tiempo durante 3 semanas, luego lo retira por una semana y se pone uno nuevo.	**Stania** Etonogestrel 11 mg / etinilestradiol 3,474 mg	• Mayor lubricación vaginal.[12] • Regularización del ciclo.[12]

ANTICONCEPTIVO ORAL DE SOLO PROGESTINA

CÓMO ACTÚAN	EFECTIVIDAD		CUÁNDO INICIAR	MODO / FRECUENCIA DE USO	OPCIONES	BENEFICIOS ADICIONALES
	USO CORRECTO*	USO TÍPICO*				
Inhiben la ovulación	0,3	9	**En cualquier momento del mes:** **>5 días** desde el inicio de la menstruación, necesita método de respaldo por 7 días.	Una píldora diaria a la misma hora. **28 píldoras:** no descansa entre un envase y otro.	**Gynets** Drospirenona 4mg	Efectos antiandrogénicos, antimineralocorticoides leves. Cuando no se puede usar estrógeno es viable su uso; en lactancia, postparto.[13]

REFERENCIAS:

1. Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la Organización Mundial de la Salud (OMS/SSR) y Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins/Centro para Programas de Comunicación (CCP), Knowledge SUCCESS. Planificación familiar: Un manual mundial para proveedores, Edición 2022. Baltimore y Ginebra: CCP y OMS; 2022. **2.** Alsina JC. After 50 years of ethinylestradiol, another oestrogen in combined oral contraceptives. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2010;15:1-3. **3.** Pérez E. Ethinylestradiol/Dienogest in Oral Contraception 2010. Drugs. 2010;70 (6):681-9. **4.** Mahapatra PC, Khandke D, Patil D. Ethinyl Estradiol + Dienogest. Indian Pract. 2019;72(11):29-31. **5.** Vásquez-Awad D, Palacios S, De Melo N, Gómez-Tabares G, Loret de Mola R. Anticonceptivos orales combinados (AOC). Guías latinoamericanas. Medicina (Bogotá). 2014;36(2):136-149. **6.** Palacio-Cardona J, Caicedo Borrero DM. Clinical behavior of a cohort of adult women with facial acne treated with combined oral contraceptive: ethinylestradiol 20 µg/dienogest 2 mg. Int J Womens Health. 2017;Volume 9:835-842. doi:10.2147/IJWH.S139289 **7.** Marr J, et al. Ethinyl estradiol 20 µ g/drospirenone 3 mg 24/4 oral contraceptive for the treatment of functional impairment in women with premenstrual dysphoric disorder. Int J Gynecol Obst 2011; 113: 103-7. **8.** Anthuber S. et al, Six-Month Evaluation of the Benefits of the Low-Dose Combined Oral Contraceptive Chlormadinone Acetate 2mg/Ethinylestradiol 0.03mg in Young Women, Results of the Prospective, Observational, Non-Interventional, Multicentre TeeNIS Study, Clin Drug Investig, 2010, 30 (4): 211-220. **9.** Von Kesseru E, Aydinlik S, Etchepareborda JJ. Multicentred, phase III clinical trial of norethisterone enanthate 50 mg plus estradiol valerate 5 mg as a monthly injectable contraceptive; final three-year report. Contraceptio. 1994;50(4):329-37. **10.** Saad Ali H. A Comprehensive Review in Parenteral Formulations. Acta Scientific Pharmaceutical Sciences 3.1 (2019):43-49. **11.** Shanghai Dahua Pharmaceutical Co. Sino-implant (II). Disponible en: https://bit.ly/2DI2zHr. **12.** Lete I, Cuesta MC, Marín JM, Guerra S. Efectos beneficiosos no anticonceptivos del anillo vaginal anticonceptivo. Rev. Iberoam. Fert Rep Hum. 2013;30:80-85. **13.** Melo N. R., Estrogen-free oral hormonal contraception: benefits of the progestin-only pill, Women's Health, 2010;6(5):721–735.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL CUERPO MÉDICO

Abbott

TÚCICLO TÚRITMO

TÚCICLO TÚRITMO

ESCANEA PARA VER LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DEL VADEMÉCUM DE LA LÍNEA DE SALUD FEMENINA ABBOTT

Bellanew® Bellaface® Bellaface® Suave FEMELLE20® CD Yax® Yaxibelle

Gynets® Gynorelle® 30 Gynorelle® Nofertyl® PostDay

Sinoimplant® Stania® Sinovul®

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL CUERPO MÉDICO