## Двудольные графы

- П Докажите, что в двудольном графе сумма степеней вершин одного цвета равна сумме степеней вершин другого цвета.
- $\boxed{2}$  а) Какое наибольшее число рёбер может быть в двудольном графе с k белыми и m чёрными вершинами?
  - б) Какое наибольшее количество рёбер может быть в двудольном графе с 2n вершинами? А с 2n+1?
- 3 Докажите, что если в двудольном графе степени всех вершин одинаковы, то вершин каждого цвета поровну.
- [4] 10 школьников решали 10 задач. Выяснилось, что каждый школьник решил ровно две задачи, и каждую задачу решило два школьника. Докажите, что можно так организовать рассказ решений, чтобы каждый школьник рассказал ровно одну из решенных им задач, и при этом все задачи были бы рассказаны.
- [5] **Теорема Кёнига**. Граф является двудольным тогда и только тогда, когда он не содержит цикла нечётной длины.
- [6] В каждой строке и в каждом столбце таблицы  $8 \times 8$  стоит ровно две фишки. Докажите, что их можно покрасить в чёрный и белый цвет так, чтобы в каждом столбце и в каждой строке стояли разноцветные фишки.
- [7]  $\Pi$ емма. Пусть G двудольный граф с черными и белыми вершинами.
  - а) Если в G есть замкнутый цикл, проходящий через каждую вершину ровно по одному разу, то вершин каждого цвета поровну.
  - б) Если в G есть путь, проходящий через каждую вершину ровно по одному разу, то что число белых вершин отличается от числа черных вершин не более чем на 1.
- 8 Замок в форме треугольника со стороной 50 метров разбит на 100 треугольных залов со сторонами 5 метров. В каждой стенке между залами есть дверь. Какое наибольшее число залов сможет обойти турист, не заходя ни в какой зал дважды?
- [9] а) В клетки доски  $8 \times 8$  записали числа  $1, 2, \ldots, 64$  в неизвестном порядке. Разрешается узнать сумму чисел в любой паре клеток с общей стороной. Всегда ли можно узнать расположение всех чисел?
  - б) Тот же вопрос для доски  $9 \times 9$ .
- 10 а) Найдется ли правильный треугольник с вершинами в узлах квадратной сетки?
  - б) Вершины графа это узлы клетчатой бумаги, ребра отрезки фиксированной длины L. Докажите, что получившийся граф двудольный.