Математика

Региональный разнобой

П Найдите наибольшее число m такое, что для любых положительных чисел a,b и c, сумма которых равна 1, выполнено неравенство

$$\sqrt{\frac{ab}{c+ab}} + \sqrt{\frac{bc}{a+bc}} + \sqrt{\frac{ca}{b+ca}} \geqslant m$$

- [2] Петя написал на доске десять натуральных чисел, среди которых нет двух равных. Известно, что из этих десяти чисел можно выбрать три числа, делящихся на 5. Также известно, что из написанных десяти чисел можно выбрать четыре числа, делящихся на 4. Может ли сумма всех написанных на доске чисел быть меньше 75?
- $\fbox{3}$ Дан квадратный трёхчлен P(x), не обязательно с целыми коэффициентами. Известно, что при некоторых целых a и b разность P(a)-P(b) является квадратом натурального числа. Докажите, что существует более миллиона таких пар целых чисел (c,d), что разность P(c)-P(d) также является квадратом натурального числа.
- 4 Последовательность чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2022}$ такова, что $a_n a_k \geqslant n^3 k^3$ для любых n и k таких, что $1 \leqslant n \leqslant 2022$ и $1 \leqslant k \leqslant 2022$. При этом $a_{1011} = 0$. Какие значения может принимать a_{2022} ?
- [5] Ненулевые числа x и y удовлетворяют неравенствам $x^2 x > y^2$ и $y^2 y > x^2$. Какой знак может иметь произведение xy?
- 6 Витя записал в тетрадь n различных натуральных чисел. Для каждой пары чисел из тетради он выписал на доску их наименьшее общее кратное. Могло ли при каком-то n>100 случиться так, что

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

чисел на доске являются (в некотором порядке) последовательными членами непостоянной арифметической прогрессии?

- [7] На доске написаны n различных целых чисел, любые два из них отличаются хотя бы на 10. Сумма квадратов трёх наибольших из них меньше трёх миллионов. Сумма квадратов трёх наименьших из них также меньше трёх миллионов. При каком наибольшем n это возможно?
- 8 Петя и Миша стартуют по круговой дорожке из одной точки в направлении против часовой стрелки. Оба бегут с постоянными скоростями, скорость Миши на 2% больше скорости Пети. Петя всё время бежит против часовой стрелки, а Миша может менять направление бега в любой момент, непосредственно перед которым он пробежал полкруга или больше в одном направлении. Покажите, что пока Петя бежит первый круг, Миша может трижды, не считая момента старта, поравняться (встретиться или догнать) с ним.

[9] Докажите, что для любых положительных x_1, x_2, \dots, x_9

$$\frac{x_1 - x_3}{x_1 x_3 + 2x_2 x_3 + x_2^2} + \frac{x_2 - x_4}{x_2 x_3 + 2x_3 x_4 + x_3^2} + \ldots + \frac{x_8 - x_1}{x_8 x_1 + 2x_9 x_1 + x_9^2} + \frac{x_9 - x_2}{x_9 x_2 + 2x_1 x_2 + x_1^2} \geqslant 0$$