[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: Мелена – это симптом, характерный для желудочного кровотечения
Ножницы подаются хирургу в виде закрытом, ручками к руке хирурга
Инструмент для остановки кровотечения зажимы Пеана и Кохера
Возможное осложнение при раке легкого легочное кровотечение
Показание к проведению плевральнойпункции экссудативный плеврит
Основная жалоба во втором периодеабсцесса легкого кашель с гнойной мокротой
Основная жалоба пациента при экссудативном плеврите Выраженная одышка
Перевязочный материал на грудной клеткезакрепляется повязкой спиральной
чистые раны заживают первичным натяжением
При оказании помощи пострадавшему стравмой ключицы целесообразноиспользовать повязку Дезо
К симптомам бешенства относится гидрофобия
К основному симптому сотрясенияголовного мозга относится ретроградная амнезия
Премедекация – это подготовка к наркозу и оперативномувмешательству с применениеммедикаментов
Местные клинические признакиотморожения II степени: на фоне багрово-цианотичной кожи - пузыри, содержащие серозную жидкость
Герниотомия – это хирургическая операцияпо поводу ущемлённой грыжи
При бинтовании области плечевого суставаприменяют повязку колосовидную
Эндогенный способ проникновенияинфекции в рану: гематогенный
Заболевание, которое может осложнитьсяабсцессом легкого пневмония
Асцит - это скопление жидкости в брюшной полости
В подготовку пациента к абдоминальнойпункции входит опорожнение мочевого пузыря
Пращевидная повязка применяется дляудержания перевязочного материала вобласти: носа
Наиболее используемые инструменты набольшом инсрументальном столеукладываются в первый ряд
К факторам риска развития атеросклерозасосудов нижних конечностей относится курение
«Светлый промежуток» является симптомом сдавления головного мозга

Свищем называется соединение органа с внешней средой
Первый период ожоговой болезни: Ожоговый шок
Второй период ожоговой болезни токсемия
третий период ожоговой болезни ожоговая септикотоксемия

Характерная черта термического ожога II степени отслойка эпидермиса

Подключичная артерия при кровотечении изнее прижимается к 1 ребру в надключичной ямке к
Кетгут хранят в сухой, темной комнате
Мокрота при абсцессе легкого гнойная
Мокрота «полным ртом» при бронхоэктатической болезни отходит утром
Результат спинномозговой пункции привнутримозговой гематоме: примесь крови
Стерильный стол накрывают на часов 6
Флебитом называют воспаление вены
Гематомой называют ограниченное скопление крови в мягкихтканях
Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение проникновениямикроорганизмов в рану и в организм вцелом
В операционный блок персонал долженвходить через санитарный пропускник
Основной задачей медицинской сестры приуходе за больным в гипсе является оценка кровоснабжения поврежденнойконечности

Перемежающаяся хромота – характерныйсимптом облитерирующего эндартериита
Транспортируют пострадавшего спереломом ребер и грудины в положении сидя
Окклюзионную повязку накладывают при открытом пневмотораксе
При определении патологического процесса«рожа» понимают инфекционную болезнь, острое серозноеили серозно-геморрагическое воспалениесобственно кожи и слизистых оболочек, вызванное b-гемолитическим стрептококкомА
Для профилактики и борьбы с отеком мозгаприменяют дегидратационную терапию
В первые часы после оперативноговмешательства больной должен находиться вположении лежа на спине, голова повернута на бок
Один из методов механической антисептики– это первичная хирургическая обработка раневойповерхности
Основная причина абсцесса легкого аспирация рвотными массами
При сухой гангрене ткани мумифицируются
Гипертонический раствор натрия хлоридаприменяется при дренировании гнойных полостей и ран
Флегмона – это разлитое воспаление клетчатки
Основной целью премедекации является: сведение до минимума послеоперационныхосложнений
Политравмой называется совокупность двух и более повреждений
Заболевание, при котором отмечается«сардоническая улыбка» столбняк
Противопоказания к операции при остромаппендиците отсутствуют
Алая кровь выделяется пульсирующейструей при повреждении артерий
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: При уходе за больными хроническимабсцессом легкого следует обеспечить плевательницей, обеспечитьдренажное положение
Фурункул — это воспаление волосяного фолликула
Наиболее важными лечебным мероприятиемпри газовой гангрене является вскрытие очага инфекции с некрэктомией иоксибаротерапией
Свободный газ в брюшной полостиопределяется при перфоративной язве желудка

Исходом отморожения 2 степени является эпителизация
Рентгенограмма во втором периоде абсцессалегкого выявляет полость с горизонтальным уровнем
Тактика среднего медработника при остромхолецистите: холод на живот, госпитализация
Гемартроз — это скопление крови в полости сустава
Если повязка после операции быстронамокает, медсестра должна вызвать врача
Сонная артерия при кровотечении из нееприжимается к поперечному отростку 6 шейного позвонка
Под контрактурой понимают стойкое ограничение движений в суставе
Длительно незаживающие дефекты кожи - это трофические язвы
Результатом правильного наложения жгутапри кровотечении является прекращение кровотечения, отсутствиепульса, бледность кожи
В операционный блок пациента ввозят накаталке через шлюз
Полное удаление органа эктомия
Основные жалобы пациента в первомпериоде абсцесса легкого боль в грудной клетке, высокая температурателя
Темная кровь выделяется из ранымедленной непрерывной струёй приповреждении вен
При химических ожогах глаз экстренноепромывание производится водой

При бинтовании области плечевого суставаприменяют повязку колосовидную
Операция, произведенная после полногообследования пациента в стационаре плановая
Для точной диагностики рака легкогопроводят бронхоскопию с биопсией
Пила Джигли относятся к инструментам разъединяющим ткани

К паренхиматозному кровотечениюотносится кровотечение из печени
Характерными признаками желудочногокровотечения являются рвота «кофейной гущей», дегтеобразныйстул
Лейкопластырные повязки относятся к клеевым
Атеросклероз сосудов конечностей приводитк гангрене
Физический метод окончательной остановкикровотечения электрокоагуляция
Абсолютный признак перелома костей костная крепитация
Похудание, боль в грудной клеткенаблюдаются при центральном раке легкого
Похудание, сухой упорный кашельнаблюдаются при центральном раке легкого
Преимущественной локализацией процессапри газовой гангрене является конечности
Индекс Альговера определяют соотношением ЧСС и систолического АД
Осложнение бронхоэктатической болезни легочное кровотечение
К типичному проявлению переломаоснования черепа относится кровотечение и истечение ликвора из носа иушей
На обожженную поверхность накладывают сухую асептическую повязку
Печеночная колика наблюдается при желчнокаменной болезни
Сотрясение головного мозга отличается отушиба мозга отсутствием очаговой симптоматики
Операционный зал и операционнаянаходятся в зоне режима стерильном
Антисептика — это комплекс мероприятийпо профилактике попадания инфекции в ран
При флегмоне мягких тканей в стадииразмягчения необходимо выполнить широкий разрез и дренирование
При нагноении раны на передней брюшнойстенке, после операции, повязка должнавыступать за края на сантиметров 6-8
Транспортировка пострадавшего ссотрясением головного мозгаосуществляется в положении с приподнятым головным концом
Причина спонтанного пневмоторакса Эмфизема легких
При парезе кишечника в период послеоперации пациенту назначается питание парентеральное
Для перелома основания черепа характеренсимптом «очков»
У пострадавшего - ожог II степени переднейповерхности обеих ног, следовательно, площадь ожога составляет 18%
Парапроктит — это воспаление околопрямокишечной клетчатки
Правильное положение иглы виглодержателе 1/3 иглы - к ушку, а 2/3 – к острию
Режущие хирургические инструментыподвергаются стерилизации холодным химическим способом спримененим растворов антисептиков
При гемотораксе отмечается скоплениекрови в полости плевральной
Очистительная клизма перед экстреннойоперацией не ставится
Транспортная иммобилизация при переломекостей таза осуществляется в положении «лягушки»
Наиболее часто применяемым способомостановки венозных кровотечений является тугая давящая повязка
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: Характерный признак термического ожогаIII-а степени некроз верхушки сосочкового слоя
Характерный признак рака пищевода дисфагия
Чистые раны заживаю первичным натяжением
Артериальный жгут накладывают максимумн 0,5-1 час.
Подходящий способ стерилизациионационного белья автоклавирование
Осложнение рака легкого экссудативный плеврит
Характер и локализация болей приперфоративной язве желудка «кинжальные» в эпигастрии
Искусственное отверстие, которое соединяетпереднюю брюшную стенку и

желудокназывается гастростома
Достоверный признак перитонита симптомы раздражения брюшины
К факторам риска развития атеросклерозаотносится высокий уровень холестерина
Предоперационный период начинается с поступления пациента в стационар
Некрозом называется омертвение тканей
Уход за трахеостомой включает очисткуканюли по мере загрязнения
Хирургический пинцет отличается отанатомического наличием на концахбраншей острых зубчиков
Абсолютным признаком перелома, выявляемым с помощью клиническогоисследования, является костная крепитация
Кровопотеря 30% ОЦК является средней степени тяжести
Первый этап любой хирургическойоперации, который обеспечиваетмаксимальную мобилизацию органа дляпроведения операции на нем оперативный доступ
Пункция брюшной полости называется абдоминальной
Для профилактики и лечения столбнякаиспользуют антитоксическую сыворотку
Если в ранний послеоперационный периодповязка, наложенная на рану, обильнопропитывается кровью, то медсестренеобходимо сообщить врачу
Операционный зал и операционнаянаходятся в зоне режима: стерильном
Основная жалоба пациента припневмотораксе с ильная боль в грудной клетке, одышка
Ведущим симптомом столбняка являются тонические судороги
К инфекциям, связанным с оказаниеммедицинской помощи (ИСМП), относят любое клинически распознаваемоеинфекционное заболевание или осложнениеу пациентов или медицинских работников, связанное с оказанием любых видовмедицинской помощи
геморрагический экссудат при плевральнойпункции наблюдается в случае плеврита нафоне рака легкого
Предраковым состоянием является полипоз толстой кишки
Ранняя первичная хирургическая обработкараны проводится в сроки в первые 24 часа
Вид санитарной обработки перед плановойоперацией: полная санитарная
Бритье кожи перед плановой операциейпроводится утром в день операции
Основными противошоковымимероприятиями при тяжелой травмеявляются обезболивание, остановка кровотечения, иммобилизация
Достоверная диагностика в онкологииобеспечивается исследованием Гистологическим
Предупредить тромбоз глубоких вен удается, если в послеоперационный период пациент Бинтует конечности эластичным бинтом
Наиболее эффективное лечение в начальной стадии рака легкого Оперативное вмешательство
Устранить повышенное газообразование в послеоперационный период возможно с помощью Назначения активированного угля и газоотводной трубки
Премедикация – это Подготовка к наркозу и оперативному вмешательству с применением медикаментов
Потеря сознания, тошнота, рвота, головокружение относятся к симптомам общемозговым
Эвентрация – это Выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку
Кровоостанавливающий зажим с зубчиками на концах Кохера
Операция, при которой полностью удаляется болезненный орган радикальная
Продолжительность послеоперационного период зависит от Срочности операции
При острой кровопотере наблюдается падение АД, тахикардия
Характерный признак рака прямой кишки патологические выделения из прямой кишки
Во время остановки носового кровотеченияпациента усаживают с опущенной головой вперед
Предварительную уборку операционнойпроизводят с применением дезраствора
Возможное осложнение при абсцесселегкого сепсис, легочное кровотечение
Зависимое сестринское вмешательство прилегочном кровотечении введение

кровоостанавливающихпрепаратов
При раке легкого мокрота может быть в виде «малинового желе»
К кровоостанавливающим препаратамотносятся дицинон, хлорид кальция
Транспортировка пациента из операционнойосуществляется младшим медицинским персоналом вприсутствии анестезиолога

Выберите дваправильных ответа.
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: Методы временногогемостаза
приартериальномкровотечении: наложение кровоостанавливающего жгута
пальцевое прижатие
Способы временногогемостаза привенозномкровотечении возвышенное положение конечности
давящая повязка
Подручное средстводля остановкиартериальногокровотечения: галстук
ремень
Признакиправильностиналожениякровоостанавливающего жгута остановка кровотечения
бледность кожных покровов
Виды местнойанестезии проводниковая
инфильтрационная
Хирургическаяобработка рукпроводится перед: накрытием стерильного стола
проведением ПХО раны
Симптомыинфицированияпослеоперационнойраны: Оте
гиперемия

Симптомы, характерные дляострой кишечнойнепроходимости схваткообразные боли
отсутствие стула и газов
Абсолютныепризнаки переломакости крепитация костных отломков
патологическая подвижность

Установитесоответствие между
Установите соответствие между термином и его значением
Установитесоответствие междувидом и названиеминструментов:
соответствие между видом и названием хирургических инструменто • Для разъединения тканей — ножницы прямые остроконечные
• Для защиты тканей — желобоватый зонд
• Расширяющие раны — зубчатые крючки
• Для захвата тканей — окончатые зажимы
Установите соответствие между термином и его значением

Установитеправильнуюпоследовательностьвыполнениятранспортировкипациента
воперационный блокиз отделения: • получить согласие
• идентифицировать пациента
• объяснить пациенту ход предстоящей манипуляции
• поставить каталку вплотную к кровати пациента
• помочь пациенту перелечь на каталку
• проследить за положением рук пациента
• укрыть пациента простыней
• транспортировать пациента в операционную
Установитеправильнуюпоследовательностьдействиймедицинской сестрыпри «остром животе» • успокоить пациента
• запретить пить, есть

• положить холод на живот
• измерить пульс, АД,ЧДД
• срочно сообщить врачу
• выполнять врачебные назначения
•
Установитеправильнуюпоследовательностьподготовки пациентак экстреннойоперации • идентифицировать пациента
• получить согласие на операцию
• освободить желудок через зонд
• провести частичную санитарную обработку
• побрить операционное поле
• освободить мочевой пузырь
• провести премедикацию
•
Установитеправильнуюпоследовательностьэтаповпредстерилизационной очисткихирургическогоинструментария: • мытье под проточной водой
• замачивание в моющем растворе при полном погружении
• мойка в моющем растворе при помощи ерша
• ополаскивание проточной водой
• ополаскивание дистиллированной водой
• сушка воздухом.
Инструкция: выберите один правильный ответ

01::Причина спонтанного пневмоторакса
{
=эмфизема легких
~экссудативный плеврит
~долевая пневмония
~сухой плеврит}

02::Основная жалоба пациента при пневмотораксе
{
=сильная боль в грудной клетке, одышка
~высокая температура тела
~кровохарканье
~приступ удушья}

03::Основная причина абсцесса легкого
{
=аспирация рвотными массами
~резкое переохлаждение
~ОРВИ
~острый бронхит}

04::Заболевание, которое может осложниться абсцессом легкого
{
=пневмония
~острый бронхит
~бронхиальная астма
~сухой плеврит}

05::Основные жалобы пациента в первом периоде абсцесса легкого

{
=боль в грудной клетке, высокая температура тела
~приступ удушья
~отсутствие аппетита
~кашель с гнойной мокротой }

06::Основная жалоба во втором периоде абсцесса легкого
{
=кашель с гнойной мокротой
~приступ удушья
~отсутствие аппетита
~боль в грудной клетке, высокая температура тела}

07::Мокрота при абсцессе легкого
{
=гнойная
~слизистая
~стекловидная
~«ржавая»}

08::Рентгенограмма во втором периоде абсцесса легкого выявляет
{
=полость с горизонтальным уровнем
~повышенную воздушность легких
~округлое затемнение с неровными краями
~затемнение доли легкого}

09::Возможное осложнение при абсцессе легкого
{
=сепсис, легочное кровотечение
~лихорадка, головная боль, кашель
~приступ бронхиальной астмы
~бронхит
}

10::Мокрота «полным ртом» при бронхоэктатической болезни отходит
{
=утром
~к вечеру
~днем
~ночью
}

11::Осложнение бронхоэктатической болезни
{
=легочное кровотечение
~приступ экспираторного удушья
~кашель с гнойной мокротой
~лихорадка
}

[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: 12::Показание к проведению плевральной пункции

{
=экссудативный плеврит
~сухой плеврит
~обструктивный бронхит
~очаговая пневмония
}

13::Основная жалоба пациента при экссудативном плеврите
{
=выраженная одышка
~приступы удушья
~боль в грудной клетке
~кровохарканье
}

14::Похудание, боль в грудной клетке наблюдаются при
{
=периферическом раке легкого
~остром бронхите
~бронхиальной астме
~центральном раке легкого
}

15::Похудание, сухой упорный кашель наблюдаются при
{
=центральном раке легкого
~бронхиальной астме
~периферическом раке легкого
~остром бронхите
}

16::Осложнение рака легкого:
{
=экссудативный плеврит
~хронический бронхит
~эмфизема легких
~бронхиальная астма
}

17::Для точной диагностики рака легкого проводят
{
=бронхоскопию с биопсией
~общий анализ мокроты
~общий анализ крови
~бактериологический анализ мокроты
}

18::Возможное осложнение при раке легкого
{
=легочное кровотечение
~лихорадка

~головная боль
~прибавка массы тела
}

19::Зависимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении
{
=введение кровоостанавливающих препаратов
~введение антиагрегантов
~ингаляции бронхолитика
~введение анальгетиков
}

20::К кровоостанавливающим препаратам относятся
{
=дицинон, хлорид кальция
~гепарин, ацетилсалициловая кислота
~димедрол, супрастин
~сульфат магния, дибазол
}

21::Наиболее эффективное лечение в начальной стадии рака легкого
{
=оперативное вмешательство
~химиотерапия
~лучевая терапия
~симптоматическое
}

22::Ведущим симптомом столбняка являются
=тонические судороги
~падения температуры
~параличи
~нарушения сознания
}

23::Абсолютный признак перелома костей:
{
=костная крепитация
~деформация сустава
~деформация мягких тканей
~отек
}

24::Операция, при которой полностью удаляется болезненный орган:
{
=радикальная
~диагностическая
~паллиативная
~экстренна
}

25::Длительно незаживающие дефекты кожи - это

{
=трофические язвы
~наружный свищ
~инфицированная рана
~рожистое воспаление
}

26::При оказании помощи пострадавшему с травмой ключицы целесообразно использовать
{
=повязку Дезо
~шину Крамера
~гипсовую лонгету
~колосовидную повязку
}

27::Искусственное отверстие, которое соединяет переднюю брюшную стенку и желудок называется
{
=гастростома
~цистостома
~колостома
~илеостома
}

28::Первый этап любой хирургической операции, который обеспечивает максимальную мобилизацию органа для проведения операции на нем:
{
=оперативный доступ
~оперативный прием
~оперативная техника
~методика операции
}

29::Полное удаление органа:
{
=эктомия
~резекция
~иссечение
~выскабливание
}

30::Основной задачей медицинской сестры при уходе за больным в гипсе является
{
=оценка кровоснабжения поврежденной конечности
~содержание пациента в тепле
~контроль соблюдения диеты
~расширение двигательного режима пациента
}

31::Физический метод окончательной остановки кровотечения:
{

=электрокоагуляция
~переливание плазмы
~протезирование сосуда
~наложение шва на сосуд
}

32::Свободный газ в брюшной полости определяется при
{
=перфоративной язве желудка
~аппендиците
~холецистите
~кишечной непроходимости
}

33::Эвентрация — это
{
=выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку
~воспаление брюшины
~ущемление кишечника в спайках
~выделение кишечного содержимого из раны
}

34::Асцит - это
{
=скопление жидкости в брюшной полости
~скопление воздуха в брюшной полости
~скопление жидкости в плевральной полости
~общий отек всего тела
}

35::Темная кровь выделяется из раны медленной непрерывной струёй при повреждении
{
=вен
~капилляров
~паренхиматозных органов
~артерий
}

36:: Наиболее важными лечебным мероприятием при газовой гангрене является
{
=вскрытие очага инфекции с некрэктомией и оксибаротерапией
~введение лечебных доз противостолбнячной сыворотки
~десенсибилизирующая и антибактериальная терапия
~обкалывание очагов поражения антибиотиками
}

37::Для профилактики и лечения столбняка используют
{
=антитоксическую сыворотку
~антимикробную сыворотку
~бактериофаг
~нормальную лошадиную сыворотку

}

38::К симптомам бешенства относится
{
=гидрофобия
~тошнота
~адинамия
~клаустрофобия
}

[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: 39::Артериальный жгут накладывают максимум на
{
=0,5-1 час.
~1,5-2 час.
~6-8 час.
~3-5 час.
}

40::Наиболее часто применяемым способом остановки венозных кровотечений является
{
=тугая давящая повязка
~наложение жгута
~тампонада раны
~закрутка
}

41::Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является
{
=прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи
~уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза
~прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза
~уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи
}

42::Транспортируют пострадавшего с переломом ребер и грудины в положении
{
=сидя
~лежа на боку
~лежа на спине
~лежа на животе
}

43::Транспортировка пострадавшего с сотрясением головного мозга осуществляется в положении
{
=с приподнятым головным концом
~горизонтальном
~с опущенным головным концом
~на боку
}

44::Для перелома основания черепа характерен симптом

{
=«очков»
~Кохера
~Розанова
~Кера
}

45::На обожженную поверхность накладывают
{
=сухую асептическую повязку
~повязку с раствором чайной соды
~повязку с синтомициновой эмульсией
~повязку с мазью Вишневского
}

46::Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на
{
=предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом
~уничтожение микробов в ране
~полное уничтожение микробов и их спор
~ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом
}

47::Стерильный стол накрывают на часов
{
=6
~24
~12
~4
}

48::Ранняя первичная хирургическая обработка раны проводится в сроки
{
=в первые 24 часа
~не позднее 6 часов
~на 1-2 сутки
~спустя 2 суток
}

49::Преимущественной локализацией процесса при газовой гангрене является
{
=конечности
~голова, шея
~туловище
~кишечник
}

50::Наиболее важными лечебным мероприятием при газовой гангрене является
{
=вскрытие очага инфекции с некрэктомией и оксибаротерапией
~введение лечебных доз противостолбнячной сыворотки
~десенсибилизирующая и антибактериальная терапия

~обкалывание очагов поражения антибиотиками
}

51::Флегмона – это
{
=разлитое воспаление клетчатки
~гнойное воспаление сальных желез
~гнойное воспаление потовых желез
~воспаление со скоплением гноя в суставе
}

52::При флегмоне мягких тканей в стадии размягчения необходимо
{
=выполнить широкий разрез и дренирование
~наложить согревающий компресс
~наложить мазевую повязку
~рекомендовать холодный компресс
}

53::К паренхиматозному кровотечению относится кровотечение из
{
=печени
~хронической язвы желудка
~варикозно-расширенных вен пищевода
~сосуда брыжейки тонкой кишки
}

54::Во время остановки носового кровотечения пациента
{
=усаживают с опущенной головой вперед
~укладывают горизонтально на спину
~усаживают с запрокинутой головой назад
~укладывают в положение Тренделенбурга
}

55::При сухой гангрене
{
=ткани мумифицируются
~условия для развития микроорганизмов хорошие
~у пастозных, тучных людей отекают конечности
~резко выражены симптомы интоксикации
}

56::Перемежающаяся хромота – характерный симптом
{
=облитерирующего эндартериита
~посттромбофлебитического синдрома
~остеомиелита
~тромбофлебита

}

57::Атеросклероз сосудов конечностей приводит к
{
=гангрене
~роже
~варикозному расширению вен
~асциту
}

58::Бритье кожи перед плановой операцией проводится
{
=утром в день операции
~за сутки перед операцией
~вечером накануне операции
~перед началом операции на операционном столе
}

59::Гемартроз — это скопление крови в полости
{
=сустава
~грудной
~брюшной
~черепа
}

60::Транспортная иммобилизация при переломе костейтаза осуществляется в положении
{
=«лягушки»
~на боку
~на животе
~в вынужденном
}

61::Чистые раны заживают
{
=первичным натяжением
~под струпом
~вторичным натяжением
~медленно
}

62::Пращевидная повязка применяется для удержания перевязочного материала в области:
{
=носа
~ушной раковины
~промежности
~подмышечной ямки
}

63::Перевязочный материал на грудной клеткезакрепляется повязкой
{

=спиральной
~колосовидной
~черепашьей
~возвращающейся
}

64::При бинтовании области плечевого суставаприменяют повязку
{
=колосовидную
~круговую
~спиральную
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: ~возвращающуюся
}

65::Алая кровь выделяется пульсирующей струей приповреждении
{
=артерий
~капилляров
~паренхиматозных органов
~вен
}

66::Подключичная артерия при кровотечении из нееприжимается к
{
=1 ребру в надключичной ямке
~углу нижней челюсти
~поперечному отростку 6 шейного позвонка
~височной кости
}

67::Сонная артерия при кровотечении из нееприжимается к
{
=поперечному отростку 6 шейного позвонка
~височной кости
~углу нижней челюсти
~к 1 ребру в надключичной ямке
}

68::Фурункул — это воспаление
{
=волосяного фолликула
~потовых желез
~сальных желез
~подкожной клетчатки
}

69::Заболевание, при котором отмечается «сардоническая улыбка»
{
=столбняк
~газовая гангрена
~бешенство
~сепсис

}

70::Некрозом называется
{
=омертвение тканей
~расширение вен конечности
~временная потеря тактильной чувствительности
~параличи конечностей
}

71::Свищем называется
{
=соединение органа с внешней средой
~повреждение костей
~омертвение тканей
~опухоль пищевода
}

72::Достоверный признак перитонита:
{
=симптомы раздражения брюшины
~задержка газов и кала
~рвота
~болезненность живота при пальпации
}

73::Характер и локализация болей при перфоративнойязве желудка:
{
=«кинжальные» в эпигастрии
~постоянные резкие боли в правом подреберье
~опоясывающие тупого характера
~постоянные, сильные в правой подвздошной области
}

74::К основному симптому сотрясения головного мозга относится
{
=ретроградная амнезия
~усиление рефлексов
~паралич конечностей
~нарушение функции тазовых органов
}

75::К типичному проявлению перелома основания черепа относится
{
=кровотечение и истечение ликвора из носа и ушей
~отек век
~подкожная эмфизема
~двоение в глазах
}

76::Пункция брюшной полости называется
{

=абдоминальной
~плевральной
~люмбальной
~стернальной
}

77::При острой кровопотере наблюдается
{
=падение АД, тахикардия
~повышение АД, тахикардия
~падение АД, брадикардия
~повышение АД, аритмия
}

78::Индекс Альговера определяют
{
=соотношением ЧСС и систолического АД
~соотношением систолического АД и ЧСС
~степенью изменения гематокрита
~температурой в прямой кишке
}

79::Кровопотеря 30% ОЦК является
{
=тяжелой
~легкой
~средней степени тяжести
~массивной
}

80::Под контрактурой понимают
{
=стойкое ограничение движений в суставе
~место соединения костных фрагментов
~кожная пластика
~хирургическая операция по замене поврежденного сустава
}

81::Характерная черта термического ожога II степени
{
=отслойка эпидермиса
~обратимая сосудистая реакция
~некроз верхушки сосочкового слоя
~некроз всей толщи кожи
}

82::При гемотораксе отмечается скопление крови в полости
{
=плевральной
~брюшной
~перикарда
~матки

}

83::Характерный признак рака прямой кишки
{
=патологические выделения из прямой кишки
~урчание в животе
~тошнота, рвота
~отсутствие аппетита
}

84::Характерный признак рака пищевода
{
=дисфагия
~чувство переполнения желудка
~метеоризм
~диарея
}

85::Сотрясение головного мозга отличается от ушиба мозга
{
=отсутствием очаговой симптоматики
~наличием «светлого промежутка»
~наличием повышенного АД
~нарушением сна
}

86::Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием
{
=гистологическим
~ультрозвуковым
~радиоизотопным
~рентгенологическим
}

87::Для профилактики и борьбы с отеком мозга применяют
{
=дегидратационную терапию
~оксигенотерапию
~физиотерпию
~баротерапию
}

88::Характерными признаками желудочного кровотечения являются
{
=рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул
~бледность, слабость
~головная боль, головокружение
~тахикардия, снижение АД
}

89::В подготовку пациента к абдоминальной пункции входит
{

=опорожнение мочевого пузыря
~промывание желудка
~очистительная клизма
~сифонная клизма
}

90::Печеночная колика наблюдается при
{
=желчнокаменной болезни
~панкреатите
~гастрите
~язвенной болезни
}

91::Флебитом называют
{
=воспаление вены
~омертвение мягких тканей
~повреждение нервных стволов
~ограниченное скопление крови в мягких тканях
}

92::Гематомой называют
{
=ограниченное скопление крови в мягких тканях
~повреждение нервных стволов
~омертвение мягких тканей
~воспаление вены
}

[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: 93::Окклюзионную повязку накладывают при
{
=открытом пневмотораксе
~спонтанном пневмотораксе
~закрытом переломе ребер
~ушибе грудной клетки
}

94::Антисептика — это комплекс мероприятий по
{
=борьбе с инфекцией в ране
~профилактике попадания инфекции в рану
~дезинфекции инструментов
~стерилизации инструментов
}

95::Эндогенный способ проникновения инфекции в рану:
{
=гематогенный
~капельный
~воздушный
~пылевой

}

96::Подходящий способ стерилизации операционного белья:
{
=автоклавирование
~проглаживание
~кипячение
~сухожаровой шкаф
}

97::Режущие хирургические инструменты подвергаются стерилизации
{
=холодным химическим способом с применением растворов антисептиков
~в автоклаве
~в сухожаровом шкафу
~в 1% растворе хлорамина
}

98::Операционный зал и операционная находятся в зоне режима:
{
=стерильном
~ограниченном
~общем
~доступном
}

99::Один из методов механической антисептики – это
{
=первичная хирургическая обработка раневой поверхности
~обработка первомуром
~коагуляция
~диатермия
}

100::Премедекация – это
{
=подготовка к наркозу и оперативному вмешательству с применением медикаментов
~назначение гипотензивных препаратов
~назначение мочегонных средств
~подготовка к полостному исследованию
}

101::Основной целью премедекации является:
{
=сведение до минимума послеоперационных осложнений
~предупреждение распространение инфекции
~выявление противопоказаний
~для улучшения самочувствия пациента
}

102::Ножницы подаются хирургу в виде
{

=закрытом, ручками к руке хирурга
~закрытом, браншами к руке хирурга
~открытом, ручками к руке хирурга
~открытом, браншами к руке хирурга
}

103::Предоперационный период начинается с
{
=принятия решения об операции
~поступления пациента в стационар
~готовности операционной бригады
~транспортировки пациента в операционную
}

104::Транспортировка пациента из операционной осуществляется
{
=младшим медицинским персоналом в присутствии анестезиолога
~хирургом вместе с операционной медсестрой
~дежурным врачом
~медицинской сестрой палаты интенсивной терапии
}

105::Если в ранний послеоперационный период повязка, наложенная на рану, обильно пропитывается кровью, то медсестре необходимо
{
=сообщить врачу
~наложить холод
~приступить к переливанию плазмы крови
~наблюдать за пациентом
}

106::В первые часы после оперативного вмешательства больной должен находиться в положении
{
=лежа на спине, голова повернута на бок
~лежа на животе
~лежа на правом боку с приведенными к животу ногами
~в положении Симса
}

107::Предупредить тромбоз глубоких вен удается, если в послеоперационный период пациент
{
=бинтует конечности эластичным бинтом
~долго пребывает в постели
~длительное время отдыхает, спит
~ограничивает количество приема жидкости
}

108::При нагноении раны на передней брюшной стенке, после операции, повязка должна выступать за края на сантиметров
{

=6-8
~12-14
~2-5
~10-12
}

109::Устранить повышенное газообразование в послеоперационный период возможно с помощью
{
=назначения активированного угля и газоотводной трубки
~очистительной клизмы
~приема атропина
~гипертонической клизмы
}

110::Вид санитарной обработки перед плановой операцией:
{

=полная санитарная
~не проводится
~частичная санитарная
~по желанию пациента
}

111::Инструмент для остановки кровотечения
{
=зажимы Пеана и Кохера
~лопатка Ревердена
~зубчато-лапчатый пинцет
~распатор Дуайена
}

112::Лейкопластырные повязки относятся к
{
=клеевым
~давящим
~жидким
~твердым
}

113::Продолжительность предоперационного периода зависит от
{
=срочности операции
~состояния больного
~метода обезболивания
~характера заболевания
}

114::Хирургический пинцет отличается от анатомического наличием на концах браншей
{
=острых зубчиков
~поперечных насечек

~лапок с зазубринами
~продольных насечек
}

115::Кровоостанавливающий зажим с зубчиками на концах:
{
=Кохера
~Пеана
~Бильрота
~«москит»
}

116::Операция, произведенная после полного обследования пациента в стационаре:
{
=плановая
~экстренная
~срочная
~диагностическая
}

117::Очистительная клизма перед экстренной операцией
{
=не ставится
~ставится за 6 часов до операции
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: ~ставится за 2 часа до операции
~ставится накануне операции вечером
}

118::Наиболее используемые инструменты на большом инструментальном столе укладываются в
{
=первый ряд
~второй ряд
~левый угол
~правый угол
}

119::Противопоказания к операции при остром аппендиците
{
=отсутствуют
~старческий возраст
~гипертоническая болезнь
~острая пневмония
}

120::Тактика среднего медработника при остром холецистите:
=холод на живот, госпитализация
~грелка на область печени
~промывание желудка
~желчегонные средства в амбулаторных условиях
}

121::Парапроктит — это
{
=воспаление околопрямокишечной клетчатки
~воспаление вен прямой кишки
~выпадение прямой кишки
~воспаление прямой кишки
}

122::Мелена – это симптом, характерный для
{
=желудочного кровотечения
~панкреатита
~холецистита
~аппендицита
}

123::Предраковым состоянием является
{
=полипоз толстой кишки
~послеоперационный рубец
~полипы кожи
~язва 12-ти перстной кишки.
}

124::Потеря сознания, тошнота, рвота, головокружение относятся к симптомам
{
=общемозговым
~менингеальным
~локальным
~стволовым
}

125::В операционный блок пациента ввозят на каталке через
{
=шлюз
~коридор
~санитарный пропускник
~предоперационную
}

126::В операционный блок персонал должен входить через
{
=санитарный пропускник
~предоперационную
~коридор
~шлюз
}

127::Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на
{
=полное или частичное восстановление функций, работоспособности, социальной и

бытовой адаптации, улучшение качества жизни
~выздоровление и трудоустройство
~оформление инвалидности
~социальный патронаж
}

128::Санаторно-курортное лечение включает медицинские мероприятия профилактические, лечебные и реабилитационные на основе
{
=природных лечебных ресурсов
~лекарственной терапии
~иглоукалывания
~гомеопатии
}

129::Реабилитация может быть
{
~медицинской
~психологической
~профессиональной
=все вышеперечисленное верно
}

130::Инвалиды 1 группы
{
~временно нетрудоспособны
=нетрудоспособны
~трудоспособны в щадящих условиях
~ограничений по трудоспособности нет
}

131::Противопоказанием к массажу является:
{
~пневмония
=тромбофлебит
~плоскостопие
~остеохондроз
}

131::Показание к применению массажа:
{
~острые лихорадочные состояния
=хронические заболевания органов пищеварения вне фазы обострения
~гнойные процессы любой локализации
~аневризма сосудов
}

132::В профилактику тромбофлебита глубоких вен не входит
{
~бинтование всей оперированной ноги или применение компрессионных чулок
~возвышенное положение ноги после операции
=прием препаратов железа

~адекватный водный рацион
}

133::Лечебная гимнастика при переломах назначается
{
~после снятия иммобилизации
=с первых дней иммобилизационного периода
~в восстановительном периоде
~на амбулаторно-поликлиническом этапе
}

134::Задачи лечебной физкультуры при хронических заболеваниях органов дыхания:
{
~общее укрепление и оздоровление организма
~профилактика дыхательной недостаточности
~улучшение гемодинамики
=верно все перечисленное
}

135::К противопоказаниям для назначения ЛФК больным с заболеваниями органов дыхания относятся все, кроме:
{
~астматического статуса
~повышения температуры тела выше 38°С
~выраженной сердечно-легочной недостаточности
=одышки при физической нагрузке
}

136::Дренажные исходные положения улучшают
{
~кровообращение
=отток патологического содержимого из бронхов и альвеол
~дыхание
~лимфоотток
}

137::Реабилитация пациентов с инфарктом миокарда начинается:
{
=на стационарном этапе
~на санаторно-курортном этапе
~на амбулаторно-поликлиническом этапе
}

138::Скрининг онкологических заболеваний – это
{
~выявление рака у пожилых людей
=раннее выявление рака у бессимптомного населения
~выявление рака у детей и подростков
~выявление запущенных форм рака
}

139::Первичная профилактика рака включает

{
~профилактические мероприятия у пожилых людей
=профилактические мероприятия у практически здоровых людей и лиц с факторами риска рака
~профилактические мероприятия у детей
~профилактические мероприятия у молодых людей
}

[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: 140::Вторичная профилактика рака включает профилактические мероприятия
{
~у онкологических больных
=у больных с предраковыми состояниями и изменениями
~у больных инфекционными заболеваниями
~у практически здоровых людей.
}

141::Санаторно-курортное лечение лиц пожилого возраста должно проводиться на курортах
{
=местного значения
~удаленных от дома
~зарубежных
~в условиях горного климата
}

142::При гипертонической болезни противопоказаны упражнения, предусматривающие:
{
=наклоны туловища
~бег
~приседания
~быструю ходьбу
}

143::Наибольшее влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы оказывают:
{
=плавание
~гантельная гимнастика
~прыжки в воду
~прыжки на батуте
}

144::Абсолютным противопоказанием для проведения электролечения является
{
=злокачественное новообразование
~гипертоническая болезнь
~пожилой возраст пациента
~воспалительные процессы вне стадии обострения
}

145::Лечебная гимнастика при стенокардии в стационаре назначается:
{

=после прекращения болей через 2 дня
~независимо от режима двигательной активности
~только в свободном режиме
~в постстационарном периоде
}

146::Оздоровление в санаториях после инсульта возможно при
{
=сохранившейся двигательной и речевой активности
~отсутствие способности пациента к самообслуживанию
~наличие психических изменений
~отсутствие двигательной и речевой активности
}
Инструкция: выберите два правильных ответа

147:: Методы временного гемостаза при артериальном кровотечении:
{
=пальцевое прижатие
=наложение кровоостанавливающего жгута
~перевязка сосудов
~возвышенное положение конечности
}

148::Способы временного гемостаза при венозном кровотечении:
{
=давящая повязка
=возвышенное положение конечности
~максимальное сгибание конечности в суставе
~наложение кровоостанавливающего жгута
}

149::Признаки правильности наложения кровоостанавливающего жгута
{
=бледность кожных покровов
=остановка кровотечения
~синюшность кожных покровов
~отсутствие чувствительности ниже жгута
}

150::Абсолютные признаки перелома кости
{
=крепитация костных отломков
=патологическая подвижность
~боль
~отек
}

151::Симптомы, характерные для острой кишечной непроходимости:
{
=схваткообразные боли
=отсутствие стула и газов
~тенезмы

~частый жидкий стул
}

152::Перечислите кровотечения, относящиеся к внутренним:
{
=в плевральную полость
=в брюшную полость
~носовое
~желудочное
}

153::Виды местной анестезии:
{
=проводниковая
=инфильтрационная
~эндотрахеальная
~внутривенная
}

154::Хирургическая обработка рук проводится перед:
{
=накрытием стерильного стола
=проведением ПХО раны
~катетеризацией мочевого пузыря
~выполнением инъекций
}

155::Эндогенный способ проникновения инфекции в рану:
{
=гематогенный
=лимфогенный
~воздушный
~капельный
}

Инструкция: установите соответствие

156::Установите соответствие между видом и названием инструментов:
{
=для защиты тканей->желобоватый зонд
=расширяющие раны->зубчатые крючки
=для захвата тканей->окончатые зажимы
=для разъединения тканей->ножницы прямые остроконечные
}

157::Установите соответствие между видом и названием инструментов:
{
=для защиты тканей->шпатель Ревердена
=расширяющие раны->ранорасширитель Фарабефа
=для зажима тканей->зажим Бильрота
=для разъединения тканей->скальпель брюшистый
}

158::Установите соответствие между видом и названием инструментов:
{
=расширяющие раны->печеночное зеркало
=для захвата тканей->пинцет лапчатый
=для разъединения тканей->дуговая пила
=соединяющие ткани->хирургические иглы
}

159::Установите соответствие между термином и его значением:
{
=гидраденит->воспаление потовых желез
=фурункул->воспаление волосяного фолликула
=карбункул->воспаление нескольких волосяных фолликулов в одном месте
=флегмона->разлитое гнойное воспаление подкожной клетчатки
}
Инструкция: установите правильную последовательностьдействий

160::Установите правильную последовательность этапов предстерилизационной очистки хирургического инструментария:
{
1=->мытье под проточной водой
2=->замачивание в моющем растворе при полном погружении
3=->мойка в моющем растворе при помощи ерша
4=->ополаскивание проточной водой
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: 5=->ополаскивание дистиллированной водой
6=->сушка воздухом
}

161::Установите правильную последовательность выполнения транспортировки пациента в операционный блок из отделения:
{
1=->идентифицировать пациента
2=->объяснить пациенту ход предстоящей манипуляции
3=->получить согласие
4=->поставить каталку вплотную к кровати пациента
5=->помочь пациенту перелечь на каталку
6=->укрыть пациента простынёй
7=->проследить за положением рук пациента
8=->транспортировать пациента в операционную
}

162::Установите правильную последовательность подготовки пациента к экстренной операции
{
1=->идентифицировать пациента
2=->получить согласие на операцию
3=->освободить желудок через зонд
4=->освободить мочевой пузырь
5=->провести частичную санитарную обработку
6=->побрить операционное поле
7=->провести премедикацию

}

163::Установите правильную последовательность действий медицинской сестры при «остром животе»
{
1=->срочно сообщить врачу
2=->успокоить пациента
3=->измерить пульс, АД,ЧДД
4=->запретить пить, есть
5=->положить холод на живот
6=->выполнять врачебные назначения
}

Инструкция: выберите один правильный ответ

::МДК.04.01.01::Вирусный гепатит «В» передается путем
{
=парентеральным
~воздушно-капельным
~контактно-бытовым
~воздушно-пылевым
}

::МДК.04.01.02::«Экстренное извещение» заполняется при
{
=подозрении на инфекционное заболевание
~подтверждении диагноза инфекционного заболевания
~установлении границ эпидемического очага
~установлении числа контактных
}

::МДК.04.01.03::«Экстренное извещение» об инфекционном заболевании следует направить в
{
=территориальный орган Роспотребнадзора
~управление здравоохранения
~районную бактериологическую лабораторию
~дезинфекционную станцию
}

::МДК.04.01.04::В структуру терапевтического стационара входит кабинет
{
=процедурный
~смотровой
~операционная
~перевязочный
}

::МДК.04.01.05::При кашле с отделением гнойной мокроты противопоказан
{
=кодеин
~бромгексин

~амброксол
~отхаркивающая микстура
}

::МДК.04.01.06::Рентгенологические методы исследования органов дыхания:
{
=бронхография, томография, флюорография
~холецистография, ирригоскопия, гастроскопия
~спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия
~УЗИ
}

::МДК.04.01.07::Основная причина развития острого бронхита
{
=вирусная инфекция
~бактериальная инфекция
~переохлаждение
~курение
}

::МДК.04.01.08::Острому бронхиту обычно предшествуют
{
=ОРЗ
~трахеиты
~ларингиты
~синуситы
}

::МДК.04.01.09::Основная причина развития хронического бронхита
{
=курение
~ОРВИ
~переохлаждение
~гиповитаминоз
}

::МДК.04.01.10::Приоритетная проблема пациента с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
{
=одышка
~недомогание
~головная боль
~повышение температуры
}

::МДК.04.01.11::Для разжижения густой вязкой мокроты используется
{
=АЦЦ
~кодеин
~пенициллин
~теофиллин
}

::МДК.04.01.12::Кратность приема в день отхаркивающей микстуры при хроническом бронхите
{
=6-8
~1-2
~3-4
~10-12
}

::МДК.04.01.13::Мокроту на посев собирают в
{
=стерильную чашку Петри
~стерильную банку
~сухую чистую банку
~стерильную пробирку
}

::МДК.04.01.14::Диффузия кислорода из воздуха в кровь происходит в
{
=альвеолах
~бронхах
~бронхиолах
~плевральной полости
}

::МДК.04.01.15::Проблема, требующая неотложного сестринского вмешательства
{
~удушье
~кашель
~одышка
~выделение мокроты
}

::МДК.04.01.16::Сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы
{
=выполнить ингаляцию сальбутамола
~ввести раствор эуфиллина
~дать увлажненный кислород
~поставить горчичники на спину
}

::МДК.04.01.17::При экспираторной одышке затруднен
{
=выдох
~вдох
~вдох и выдох
~дыхание не нарушено
}

::МДК.04.01.18::Для профилактики приступов бронхиальной астмы используется
{

=ингаляционные глюкокортикостероиды
~беротек
~сальбутамол
~теофиллин
}

::МДК.04.01.19::Пикфлоуметрия – это определение
{
=пиковой скорости выдоха
~дыхательного объема легких
~жизненной емкости легких
~остаточного объема легких
}

::МДК.04.01.20::Приоритетная проблема при пневмонии
{
=боль в грудной клетке при дыхании
~ограничение самоухода
~легочное кровотечение
~нормотермия
}

::МДК.04.01.
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: 21::Элементы независимого сестринского вмешательства при кровохарканье
{
=холод на грудную клетку
~дренажное положение
~горячие ножные ванны
~горчичники на грудную клетку
}

::МДК.04.01.22::При постановке пробы Манту срез иглы направлен
{
=вверх
~вниз
~вбок
~не имеет значения
}

::МДК.04.01.23::Ранние симптомы туберкулеза
{
=длительный субфебрилитет, покашливание
~лихорадка, кашель с гнойной мокротой
~приступы удушья, свистящее дыхание
~боли в грудной клетке, потливость
}

::МДК.04.01.24::Антибиотик, эффективный при лечении туберкулеза
{
=стрептомицин
~мономицин

~цефазолин
~тетрациклин
}

::МДК.04.01.25::Побочное действие рифампицина
{
=гепатотоксическое
~нейротоксическое
~нефротоксическое
~ототоксическое
}

::МДК.04.01.26::Туберкулин при проведении пробы Манту вводят:
{
=внутрикожно
~подкожно
~накожно
~внутримышечно
}

::МДК.04.01.27::Реакцию Манту проводят с целью
{
=выявление уровня иммунитета и инфицированности
~специфическая иммунотерапия
~выработка пассивного иммунитета
~выработки активного иммунитета
}

::МДК.04.01.28::При применении стрептомицина медсестра должна следить за
{
=остротой слуха
~диурезом
~цветом кожи
~остротой зрения
}

::МДК.04.01.29::Метод ранней диагностики туберкулеза легких
{
=флюорография
~бронхография
~спирография
~томография
}

::МДК.04.01.30::Приоритетные проблемы при пневмококковой пневмонии
{
=боль в грудной клетке, отдышка
~слабость, головная боль
~отеки, головная боль
~изжога, отрыжка
}

::МДК.04.01.31::Подготовка пациента к рентгенографии органов грудной клетки
{
=объяснить сущность исследования
~поставить очистительную клизму
~промыть желудок
~поставить банки
}

::МДК.04.01.32::Характерные данные осмотра при бронхоэктатической болезни (БЭБ)
{
=пальцы имеют вид «барабанных палочек»
~экспираторная одышка, бочкообразная грудная клетка
~цианоз, поверхностное дыхание
~ассиметрия грудной клетки
}

::МДК.04.01.33::При обострении бронхоэктатической болезни мокрота
{
=гнойная
~вязкая
~стекловидная
~пенистая
}

::МДК.04.01.34::Характер мокроты при бронхоэктатической болезни
{
=гнойная, 2-слойная
~гнойная, 3-слойная
~слизистая
~серозная
}

::МДК.04.01.35::Наиболее информативный метод диагностики бронхоэктатической болезни:
{
=бронхография
~рентгеноскопия
~спирометрия
~флюорография
}

::МДК.04.01.36::Дренажное положение придается пациенту для
{
=улучшения отхождения мокроты
~снижения лихорадки
~уменьшения одышки
~расширения бронхов
}

::МДК.04.01.37::Возможное осложнение у пациента с бронхоэктатической болезнью
{
=легочное кровотечение

~кашель с гнойной мокротой
~снижение аппетита
~лихорадка
}

::МДК.04.01.38::Положение Квинке – это
{
=лежа на спине с приподнятым ножным концом кровати
~головной конец кровати приподнят
~горизонтальное на правом боку
~горизонтальное на левом боку
}

::МДК.04.01.39::При уходе за больными хроническим абсцессом легкого следует
{
=обеспечить плевательницей, обеспечить дренажное положение
~обеспечить профилактику пролежней, дать кислород
~ухаживать за кожей и слизистыми
~осуществить положение ортопноэ
}

::МДК.04.01.40::Характер лихорадки у пациента с абсцессом легкого до прорыва в бронх
{
=гектическая
~постоянная
~волнообразная
~субфебрильная
}

::МДК.04.01.41::Перед подачей больному индивидуальной плевательницы необходимо
{
=прокипятить в 2%-ном содовом растворе 15 мин
~погрузить на 2 ч в 15-ный раствор хлорамина
~промыть горячей водой с мылом
~вымыть под проточной водой
}

::МДК.04.01.42::Признаком легочного кровотечения является
{
=выделение алой пенистой крови с мокротой при кашле
~кровянистая пенистая мокрота при клокочущем дыхании
~темные сгустки крови в большом количестве при отрыжке
~рвотные массы цвета «кофейной гущи»
}

::МДК.04.01.43::Элементы независимого сестринского вмешательства при кровохаркании
{
=холод на грудную клетку, запретить разговаривать
~горячее щелочное питье, горячие ножные ванны
~дренажное положение, холод на грудную клетку
~банки, горчичники или грелку на грудную клетку
}

::МДК.04.01.44::Наиболее ранний симптом рака легкого
{
=сухой кашель
~лихорадка
~кровохарканье
~слабость, одышка
}

::МДК.04.01.
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: 45::При пневмонии мокроту необходимо немедленно доставить в лабораторию для исследования на
{
=микрофлору и чувствительность к антибиотикам
~микобактерии туберкулеза (МБТ)
~атипичные клетки
~общий анализ
}

::МДК.04.01.46::Основная проблема у пациента с сухим плевритом
{
=боль в грудной клетке
~кровохарканье
~сухой кашель
~лихорадка
}

::МДК.04.01.47::Основные проблемы у пациента с экссудативным плевритом
{
=боль в грудной клетке, слабость
~кашель, гипертермия, слабость
~повышение температуры, кашель
~кашель с гнойной мокротой, слабость
}

::МДК.04.01.48::Подготовка пациента к плевральной пункции
{
=разъяснить сущность исследования
~поставить очистительную клизму
~опорожнить мочевой пузырь
~промыть желудок
}

::МДК.04.01.49::Основная причина развития острого бронхита
{
=бактериальная и вирусная инфекция
~переохлаждение
~алкоголизм
~курение
}

::МДК.04.01.50::Характер мокроты при остром бронхите

{
=слизистая
~«ржавая»
~стекловидная
~розовая пенистая
}

::МДК.04.01.51::Основной симптом хронического бронхита
{
=кашель с отделением мокроты
~легочное кровотечение
~головная боль
~слабость
}

::МДК.04.01.52::Основной фактор риска хронического бронхита
{
=курение
~гиповитаминоз
~переохлаждение
~бактериальная и вирусная инфекция
}

::МДК.04.01.53::Ведущий симптом у пациента с ХОБЛ
{
=одышка
~недомогание
~головная боль
~повышение температуры
}

::МДК.04.01.54::Осложнение хронического бронхита
{
=дыхательная недостаточность
~легочное кровотечение
~острая сердечная недостаточность
~острая сосудистая недостаточность
}

::МДК.04.01.55::При кашле с отделением гнойной мокроты противопоказан
{
=либексин
~бромгексин
~амброксол
~АЦЦ
}

::МДК.04.01.56::Для разжижения густой вязкой мокроты используется
{
=йодид калия
~сальбутамол
~теофиллин

~кодеин
}

::МДК.04.01.57::Физическая активность оказывает на дыхательную систему следующее действие
{
=увеличивает жизненную емкость легких
~нормализует АД
~улучшает периферическое кровообращение
~нормализует процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга
}

::МДК.04.01.58::При лечении гнойного бронхита используются следующие препараты:
{
=амоксициллин, бромгексин
~кофеин, кордиамин
~кодеин, либексин
~бекотид, интал
}

::МДК.04.01.59::Наиболее частый возбудитель пневмонии
{
=пневмококк
~кишечная палочка
~микобактерия
~вирус
}

::МДК.04.01.60::Основные симптомы пневмонии
{
=боль в грудной клетке, одышка, кашель, лихорадка
~отеки, повышение АД, нарушение сердечного ритма
~слабость, головная боль, кашель, стекловидная мокрота
~длительный субфебрилитет, утомляемость, повышенная потливость
}

::МДК.04.01.61::Воспаление целой доли легкого наблюдается при пневмонии
{
=пневмококковой
~микоплазменной
~стафилококковой
~вирусной
}

::МДК.04.01.62::«Ржавый» характер мокроты наблюдается при пневмонии
{
=пневмококковой
~микоплазменной
~стафилококковой
~вирусной
}

::МДК.04.01.63::Наиболее информативный метод диагностики пневмонии
{
=рентгенография органов грудной клетки
~общий анализ мокроты
~плевральная пункция
~общий анализ крови
}

::МДК.04.01.64::Этиотропное лечение пневмонии — это применение
{
=антибиотиков
~бронхолитиков
~отхаркивающих
~жаропонижающих
}

::МДК.04.01.65::Наиболее опасное осложнение пневмонии
{
=острая дыхательная недостаточность
~легочное кровотечение
~боль в грудной клетке
~лихорадка
}

::МДК.04.01.66::Критическое снижение температуры тела при пневмонии вызывает
{
=коллапс
~легочное кровотечение
~острую дыхательную недостаточность
~острую коронарную недостаточность
}

::МДК.04.01.67::К базисному лечению бронхиальной астмы относится
{
=противовоспалительная терапия
~элиминационная терапия
~ферментная терапия
~физиотерапия
}

::МДК.04.01.68::Ведущий симптом при бронхиальной астме
{
=приступ удушья
~кровохарканье
~инспираторная одышка
~кашель с гнойной мокротой
}

::МДК.04.01.69::Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы
{
=сидя, с упором руками на колени
~горизонтальное с приподнятыми ногами

~лежа на боку
~горизонтальное
}

::МДК.04.01.70::Пациент должен тщательно полоскать рот после приема
{
=беклометазона
~сальбутамола
~беротека
~бародуала
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: }

::МДК.04.01.71::Стекловидная мокрота выделяется при
{
=бронхиальной астме
~остром абсцессе легкого
~экссудативном плеврите
~пневмонии
}

::МДК.04.01.72::Характерными включениями в мокроте при бронхиальной астме являются
{
=кристаллы Шарко-Лейдена
~атипичные клетки
~микобактерии
~лейкоциты
}

::МДК.04.01.73::Профилактика приступов бронхиальной астмы
{
=прекращение контакта с триггером
~устранение гиподинамии
~усиление питания
~отказ от алкоголя
}

::МДК.04.01.74::Приступ удушья при бронхиальной астме купируется
{
=сальбутамолом
~либексином
~тусупрексом
~кодеином
}

::МДК.04.01.75::Заболевание, которое может осложниться абсцессом легкого
{
=пневмония
~сухой плеврит
~острый бронхит
~бронхиальная астма
}

::МДК.04.01.76::Абсцесс легкого — это
{
=образование в легком полости с гноем
~накопление жидкости в плевральной полости
~воспаление легкого
~воспаление плевры
}

::МДК.04.01.77::Появление гнойной мокроты «полным ртом» на фоне гектической лихорадки характерно для
{
=острого абсцесса легкого
~бронхиальной астмы
~пневмонии
~сухого плеврита
}

::МДК.04.01.78::Для абсцесса легкого характерна лихорадка
{
=гектическая
~постоянная
~извращенная
~волнообразная
}

::МДК.04.01.79::Приоритетная проблема пациента после прорыва абсцесса легкого в бронх
{
=слабость
~лихорадка
~кровохарканье
~кашель с гнойной мокротой
}

::МДК.04.01.80::Тяжелое осложнение острого абсцесса легкого
{
=недомогание
~головная боль
~легочное кровотечение
~кашель с гнойной мокротой
}

::МДК.04.01.81::При лечении абсцесса легкого используются препараты
{
=антибиотики
~антигистаминные
~кортикостероиды
~диуретики
}

::МДК.04.01.82::Основная причина приобретенных бронхоэктазов

{
=пневмония
~сухой плеврит
~бронхиальная астма
~хронический бронхит
}

::МДК.04.01.83::Воспаление в расширенных, деформированных бронхах возможно при
{
=бронхоэктатической болезни
~хроническом абсцессе легкого
~экссудативном плеврите
~пневмонии
}

::МДК.04.01.84::Приоритетная проблема при бронхоэктатической болезни
{
=кашель с гнойной мокротой
~снижение аппетита
~недомогание
~слабость
}

::МДК.04.01.85::Пальцы в виде «барабанных палочек» и ногти в виде «часовых стекол» встречаются при
{
=хронических гнойных заболеваниях легких
~острых заболеваниях органов пищеварения
~хронических заболеваниях кишечника
~острых заболеваниях легких
}

::МДК.04.01.86::Дренажное положение придается пациенту с целью
{
=облегчения отхождения мокроты
~снижения лихорадки
~уменьшения одышки
~расширения бронхов
}

::МДК.04.01.87::Тяжелое осложнение бронхоэктатической болезни
{
=легочное кровотечение
~приступ экспираторного удушья
~кашель с гнойной мокротой
~лихорадка
}

::МДК.04.01.88::При выделении гнойной мокроты пациента необходимо обеспечить
{
=индивидуальной плевательницей
~стерильной пробиркой

~стерильной банкой
~чашкой Петри
}

::МДК.04.01.89::После использования индивидуальную карманную плевательницу необходимо
{
=продезинфицировать
~замочить в гипертоническом растворе
~утилизировать в отходы класса А
~ополаснуть водой
}

::МДК.04.01.90::При выделении большого количества гнойной мокроты в питании пациента рекомендуется
{
=увеличить количество белка
~увеличить количество соли
~уменьшить количество соли
~уменьшить количество белка
}

::МДК.04.01.91::Рентгенологическое исследование бронхов с применением контрастного вещества называется
{
=бронхография
~бронхоскопия
~томография
~флюорография
}

::МДК.04.01.92::Похудание, кровохарканье, боль в грудной клетке наблюдаются при
{
=раке легкого
~остром бронхите
~бронхиальной астме
~очаговой пневмонии
}

::МДК.04.01.93::Фактор риска рака легкого
{
=курение
~ожирение
~инфекция
~переохлаждние
}

::МДК.04.01.94::Возможное осложнение при раке легкого
{
=легочное кровотечение
~прибавка массы тела
~лихорадка

~головная боль
}

::МДК.04.01.95::Метод ранней диагностики рака легкого
{
=флюорография
~анализ мокроты
~бронхография
~анализ крови
}

::МДК.04.01.96::При раке легкого в мокроте определяются
{
=атипичные клетки
~микобактерии
~пневмококки
~эозинофилы
}

::МДК.04.01.97::Осложнение рака легкого
{
=экссудативный плеврит
~хронический бронхит
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: ~бронхиальная астма
~эмфизема легких
}

::МДК.04.01.98::При легочном кровотечении характерна мокрота
{
=алая, пенистая
~темная, со сгустками
~цвета «кофейной гущи»
~вязкая, стекловидная
}

::МДК.04.01.99::Зависимое сестринское вмешательство при кровохарканье
{
=введение аминокапроновой кислоты внутривенно капельно
~постановка горчичников на грудную клетку
~постановка банок на грудную клетку
~введение гепарина подкожно
}

::МДК.04.01.100::Основной симптом при сухом плеврите
{
=боль в грудной клетке
~лихорадка
~одышка
~слабость
}

::МДК.04.01.101::Основной симптом экссудативного плеврита

{
=нарастающая одышка
~боль в грудной клетке
~кровохарканье
~слабость
}

::МДК.04.01.102::Пациент занимает вынужденное положение лежа на больной стороне при
{
=плеврите
~бронхите
~бронхиальной астме
~бронхоэктатической болезни
}

::МДК.04.01.103::Зависимое сестринское вмешательство при сухом плеврите — применение
{
=анальгетиков
~спазмолитиков
~цитостатиков
~нитратов
}

::МДК.04.01.104::При плевральной пункции одномоментно извлекается жидкости не более
{
=1-1,5 л
~0,5 л
~3 мл
~5 мл
}

::МДК.04.01.105::Повышенная воздушность легких — это
{
=эмфизема
~гемоторакс
~гидроторакс
~пневмосклероз
}

::МДК.04.01.106::Основной симптом при эмфиземе легких
{
=одышка
~кровохарканье
~влажный кашель
~боль в грудной клетке
}

::МДК.04.01.107::Мокроту для исследования необходимо накапливать в течение 3 суток при

{
=туберкулезе легкого
~долевой пневмонии
~остром бронхите
~раке легкого
}

::МДК.04.01.108::Причинами бронхиальной астмы являются
{
=все перечисленное верно
~шерсть животных
~вирусы, бактерии
~домашняя пыль
}

::МДК.04.01.109::Для диагностики заболеваний органов дыхания используют
{
=все перечисленное верно
~рентгенографию
~бронхоскопию
~анализ мокроты
}

::МДК.04.01.110::Для лечения бронхоэктатической болезни используют
{
=антибиотики, отхаркивающие средства, дренажное положение, витамины
~антибиотики, витамины, сердечные средства
~сульфаниламиды, десенсибилизирующие средства, витамины
~пищу, богатую витаминами, бронхолитики, антибиотики
}

::МДК.04.01.111::Ведущей причиной бронхоэктатической болезни служит
{
=хронический бронхит
~частые ОРЗ
~бронхиальная астма
~хронический тонзиллит
}

::МДК.04.01.112::Ведущими симптомами экссудативного плеврита являются
{
=нарастающая одышка, цианоз
~сильные боли в грудной клетке,
~кашель со «ржавой мокротой»
~приступы удушья
}

::МДК.04.01.113::Уход за больными во втором периоде лихорадки
{
=все перечисленное верно
~обильное прохладное питье
~пузырь со льдом на голову

~обработка полости рта, смена белья
}

::МДК.04.01.114::Для медикаментозного лечения крупозной пневмонии применяют
{
=антибиотики, сульфаниламиды, отхаркивающие, сердечные средства
~бронхолитики, антигистаминные, противокашлевые
~антибиотики, жаропонижающие, анальгетики
~анальгетики, антигистаминные, сердечные средства
}

::МДК.04.01.115::Уход за больными при критическом падении температуры
{
=все перечисленное верно
~смена нательного и постельного белья
~обложить больного грелками
~дать выпить крепкий теплый чай
}

::МДК.04.01.116::Профилактика туберкулеза легких включает
{
=все перечисленное
~вакцинацию БЦЖ и ревакцинации
~химиопрофилактику контактным лицам
~проведения текущей и заключительной дезинфекции в очаге
}

::МДК.04.01.117::Ведущие симптомы бронхиальной астмы
{
=удушье с затрудненным вдохом, кашель слизистой мокротой
~удушье с затрудненным вдохом, сухие свистящие хрипы
~удушье с затрудненным выдохом, сухие свистящие хрипы
~кашель с кровохарканьем, одышка
}

::МДК.04.01.118::Плевральную пункцию производят
{
=для удаления жидкости с диагностической и лечебной целью
~для разъединения плевральных сращений
~для отсасывания мокроты из бронхов
~для промывания бронхов
}

::МДК.04.01.119::Основной причиной пневмонии являются
{
=все перечисленное верно
~пневмококки, стафилококки, стрептококки
~переутомление
~переохлаждение
}

::МДК.04.01.120::При пневмонии больной жалуется

{
=на повышение температуры
~отек нижних конечностей
~головные боли
~одышку
}

::МДК.04.01.121::У больного с долевой пневмонией мокрота чаще всего
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: {
=«ржавая»
~слизистая
~со сгустками крови
~стекловидная
}

::МДК.04.01.122::При уходе за больными с пневмонией применяют
{
=все перечисленное верно
~проветривание или оксигенотерапию
~смену нательного и постельного белья
~обеспечивают плевательницей
}

::МДК.04.01.123::При лечении пациента с туберкулезом стрептомицином медсестра обращает внимание на следующую его жалобу
{
~усиление потливости
=снижение слуха
~появление болей в животе
~запор
}

::МДК.04.01.124::Пониженное содержание кислорода в крови называется
{
=гипоксией
~асфиксией
~гипоксемией
~гиперкапнией
}

::МДК.04.01.125::Инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся бронхоспазмом
{
=бронхиальная астма
~сердечная астма
~острый бронхит
~бронхоэктатическая болезнь
}

::МДК.04.01.126::Дренажное положение применяют с целью
{
=улучшения отхождения мокроты

~уменьшения кашля
~уменьшения одышки
~уменьшения боли
}

::МДК.04.01.127::Методом предупреждения гипостатической пневмонии является
{
=дыхательная гимнастика
~строгий постельный режим
~применение бронхолитиков
~применение отхаркивающих препаратов
}

::МДК.04.01.128::Ателектаз – это
{
=безвоздушное легкое
~воспаление легочной ткани
~повышенная воздушность легочной ткани
~развитие в легких соединительной ткани
}

::МДК.04.01.129::Основная причина хронического гастрита типа В
{
=хеликобактерная инфекция
~отравление
~аутоиммунные нарушения
~нерациональное питание
}

::МДК.04.01.130::Для хронического гастрита характерен синдром
{
=диспептический
~гипертонический
~интоксикационный
~гепатолиенальный
}

::МДК.04.01.131::Симптом хронического гастрита с сохраненной секрецией
{
=боль в эпигастральной области
~диарея
~горечь во рту
~лихорадка
}

::МДК.04.01.132::Основной симптом хронического гастрита с секреторной недостаточностью
{
=отрыжка тухлым
~повышение аппетита
~отрыжка кислым
~запор

}

::МДК.04.01.133::При хроническом гастрите определяют
{
=болезненность в эпигастральной области
~положительный симптом Щеткина-Блюмберга
~положительный симптом Пастернацкого
~положительный симптом Ортнера
}

::МДК.04.01.134::Частое осложнение хронического гастрита с повышенной секрецией
{
=язвенная болезнь
~цирроз печени
~рак желудка
~холецистит
}

::МДК.04.01.135::Решаюшее значение в диагностике хронического гастрита имеет
{
=фиброгастроскопия
~желудочное зондирование
~рентгенография желудка
~лапароскопия
}

::МДК.04.01.136::Осложнение хронического анацидного гастрита
{
=рак желудка
~холецистит
~цирроз печени
~язвенная болезнь
}

::МДК.04.01.137::Подготовка пациента к эндоскопическому исследованию желудка
{
=вечером легкий ужин, утро натощак
~вечером и утром очистительная клизма
~вечером очистительная клизма
~утром сифонная клизма
}

::МДК.04.01.138::Эндоскопическое исследование желудка
{
=эзофагогастродуоденоскопия
~ирригоскопия
~колоноскопия
~ректороманоскопия
}

::МДК.04.01.139::При подготовке пациента к эндоскопическому исследованию желудка очистительную клизму

{
=ставят вечером накануне исследования
~ставят утром в день исследования
~ставят вечером и утром
~не ставят
}

::МДК.04.01.140::Щадящая диета предполагает
{
=тщательное измельчение пищи
~повышенное содержание углеводов
~исключение молочных продуктов
~исключение хлебных изделий
}

::МДК.04.01.141::Наибольшее значение для профилактики обострений хронического гастрита имеет
{
=рациональное питание
~нормализация массы тела
~устранение гиподинамии
~закаливание
}

::МДК.04.01.142::Заболевание, для которого характерна сезонность обострения
{
=язвенная болезнь
~цирроз печени
~хронический колит
~хронический гепатит
}

::МДК.04.01.143::Основная причина возникновения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
{
=хеликобактерная инфекция
~переохлаждение, переутомление
~вирусная инфекция, переохлаждение
~физическая перегрузка, переохлаждение
}

::МДК.04.01.144::Ранняя боль в эпигастральной области возникает в течении
{
=30 мин. после еды
~2 ч. после еды
~3 ч. до еды
~4 ч. до еды
}

::МДК.04.01.145::Боли в эпигастральной области при язвенной болезни желудка обычно бывают
{

=ранними
~поздними
~ночными
~голодными
}

::МДК.04.01.
[21.10.2026 18:55] Артем . _ .: 146::При язвенной болезни желудка боль локализуется в области
{
=эпигастральной
~левой подвздошной
~в левой подреберной
~правой подвздошной
}

::МДК.04.01.147::Основная проблема пациента при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки - боль эпигастральной области
{
=режущая, голодная
~ранняя, ноющая
~колющая, схваткообразная
~опоясывающая, тупая
}

::МДК.04.01.148