

# Temporomandibular Disorder Chart

## I. 환자 기본 정보

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 이름 : {name}           | <input type="checkbox"/> 생년월일 : {birthdate} |
| <input type="checkbox"/> 성별 : {gender}         |   |
| <input type="checkbox"/> 이메일 : {email}         | <input type="checkbox"/> 연락처 : {phone}      |
| <input type="checkbox"/> 주소 : {address}        |   |
| <input type="checkbox"/> 직업 : {occupation}     |   |
| <input type="checkbox"/> 내원목적 : {visit_reason} |   |

## II. 주증상

- ☐ 병원을 방문한 주된 이유 : {chief\_complaint} {chief\_complaint\_other}
- ☐ 문제가 처음 발생한 시기 : {onset}

## III. 현재 증상

### ■ 턱 주변의 통증 / 턱 움직임 관련 두통

#### i) 통증 양상

- 턱을 움직이거나 씹기, 말하기 등의 기능 또는 악습관(이갈기, 턱 괴기 등)으로 인한 통증 악화 여부 : {jaw\_aggravation}
- VAS : {pain\_quality}

#### ii) 통증 분류 및 검사

근육/넓은 부위 통증
• 입을 벌릴 때나 턱을 움직일 때 통증 : {muscle_movement_pain_value}
• 근육을 2초간 눌렀을 때 통증 : {muscle_pressure_2s_value}
• 근육을 5초간 눌렀을 때, 통증 전이: {muscle_referred_pain_value}
• 눌린 부위 외 (눈, 귀 등) 통증 전이 : {muscle_referred_remote_pain_value}

턱관절 통증
• 입을 벌릴 때나 움직일 때 통증 : {tmj_movement_pain_value}
• 턱관절 부위를 눌렀을 때 기존 통증 재현 : {tmj_press_pain_value}

두통
• 관자놀이 부위에서 두통 발생 : {headache_temples_value}
• 관자놀이 근육을 눌렀을 때 기존 두통 재현 : {headache_reproduce_by_pressure_value}
• 턱을 움직일 때 두통 악화 : {headache_with_jaw_value}
• 해당 두통이 다른 의학적 진단으로 설명되지 않는지 : {headache_not_elsewhere_value}

### ■ 턱관절 소리 / 잠김

#### i) 턱에서 나는 소리 : {tmj\_sound\_value}

#### ii) 딸깍소리

딸깍 소리가 나는 상황
{tmj_click_summary}

### iii) 사각사각소리(크레피투스)

- |   |
|---|
| • 사각사각소리가 확실한지 여부 : {crepitus_confirmed_value}                    |
| • 턱이 걸려서 입이 잘 안 벌어지는 증상 존재 여부 : {jaw_locked_now_value}            |
| • 조작 필요 여부 : {jaw_unlock_possible_value}                          |
| • 과거 턱 잠김 또는 개방성 잠김 경험 : {jaw_locked_past_value}                  |
| • 입을 최대한 벌렸을 때(MAO), 손가락 3개가 들어가는지 여부 : {mao_fits_3fingers_value} |

### □ 빈도 및 시기

- 통증 또는 다른 증상 발생 빈도 : {frequency\_choice}
- (통증이 있을 시) VAS : {pain\_level}
- 주로 발생하는 시간대 : {selected\_times}
- 두통 여부 : {has\_headache\_now}
- 두통 부위 : {headache\_areas}
- 두통 VAS : {headache\_severity}
- 두통 빈도 : {headache\_frequency}
- 두통 유발, 악화 요인 : {headache\_triggers}
- 두통 완화 요인 : {headache\_reliefs}

## IV. 습관

- 주요 습관 : {habit\_summary}
- 기타 습관

{additional\_habits}

## V. 턱 운동 범위 및 관찰

### ■ 자발적 개구

- 자발적 개구 범위 : {active\_opening}
- 통증 여부 : {active\_pain}

### ■ 수동적 개구

- 수동적 개구 범위 : {passive\_opening}
- 통증 여부 : {passive\_pain}

### □ 턱 움직임 패턴

- 입을 벌리고 닫을 때 턱이 한쪽으로 치우치는 증상 : {deviation}
- 편위(Deviation, 치우치지만 마지막에는 중앙으로 돌아옴) : {deviation2}
- 편향(Deflection, 치우친 채 돌아오지 않음) : {deflection}
- 앞으로 내밀기(mm) : {protrusion}
- Protrusion 시 통증 : {protrusion\_pain}
- 측방운동 오른쪽(mm) : {latero\_right}
- 오른쪽으로 측방운동 시 통증 : {latero\_right\_pain}

- 측방운동 왼쪽(mm) : {latero\_left}
- 왼쪽으로 측방운동 시 통증 : {latero\_left\_pain}
- 교합 정상 여부 : {occlusion}
- 정중앙에서 어긋나는 방향 : {occlusion\_shift}

#### ☐ 턱관절 소리

- 오른쪽 – 입 벌릴 때 : {tmj\_noise\_right\_open}
- 왼쪽 – 입 벌릴 때 : {tmj\_noise\_left\_open}
- 오른쪽 – 입 다물 때 : {tmj\_noise\_right\_close}
- 왼쪽 – 입 다물 때 : {tmj\_noise\_left\_close}

## VI. 근육 촉진 평가

측두근 촉진 소견	{palpation_temporalis}
내측 익돌근 촉진 소견	{palpation_medial_pterygoid}
외측 익돌근 촉진 소견	{palpation_lateral_pterygoid}
통증 위치 매핑	{pain_mapping}

## VII. 귀/경추/목/어깨 관련 증상

### i) 귀 관련 증상

- 귀 관련 증상 : {selected\_ear\_symptoms}

### ii) 경추/목/어깨 관련 증상

- 증상 : {neck\_shoulder\_symptoms}
- 기타 증상 : {additional\_symptoms}
- 목 외상 이력 : {neck\_trauma\_radio}

## VIII. 이력

### ☐ 정서적 스트레스 이력

- 스트레스, 불안, 우울감 : {stress\_radio}
- 내용  
: {stress\_detail}

### ☐ 과거 치과적 이력

- 교정치료(치아 교정) 경험 : {ortho\_exp}  
{ortho\_detail}
- 보철치료(의치, 브리지, 임플란트 등) 경험 : {prosth\_exp}  
{prosth\_detail}
- 기타 치과 치료 이력  
{other\_dental}

- 턱관절 질환 치료 경험 : {tmd\_treatment\_history}

치료	{tmd_treatment_detail}
해당 치료에 대한 반응	{tmd_treatment_response}
복용 중인 턱관절 관련 약물	{tmd_current_medications}

☐ 과거 의과적 이력

- 과거에 앓았던 질환, 입원 등 주요 의학적 이력

{past\_history}

- 현재 복용 중인 약

{current\_medications}

IX. 자극 검사

- 오른쪽으로 어금니를 강하게 물 때 : {bite\_right}
- 왼쪽으로 어금니를 강하게 물 때 : {bite\_left}
- 압력 가하기 : {loading\_test}
- 저항 검사 : {resistance\_test}
- 치아 마모 : {attrition}

X. 기능 평가

- 턱관절 증상으로 인해 일상생활에 불편함을 느끼는지 여부 : {impact\_daily}
- 턱관절 증상으로 인한 직장 업무나 학업 성과에서의 영향 : {impact\_work}
- 턱관절 증상이 전반적인 삶의 질에 미치는 영향 : {impact\_quality\_of\_life}
- 최근 2주간 수면의 질 : {sleep\_quality}
- 수면의 질이 턱관절 증상에 미치는 영향 : {sleep\_tmd\_relation}

XI. 진단 결과

{diagnosis\_result}