## A KUKORICA KÁRTEVŐI ÉS BETEGSÉGEI

## Kártevői

A kukorica kártevőit gyakorlati szempontból érdemes több csoportra osztani. A kártevők táplálkozási preferenciájának alapján két nagy csoportra oszthatjuk őket. Az egyik csoportba a polifág (sok tápnövényű) szántóföldi kártevők tartoznak, melyek szinte válogatás nélkül fogyasztják a legkülönfélébb termesztett és vad növényfajokat. E fajok nagy része a talajszint alatt, vagy annak közelében viszi véghez kártételét. A legfontosabb ilyen fajok:

- vetési bagolylepke (Agrotis segetum)
- 🙎 gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera)
- scerebogárformák (elsősorban a májusi-cserebogár (Melolontha melolontha)) pajorjai
- 🏅 pattanóbogár-félék növényevő fajáinak lárvái (drótférgek)
- mezei pocok (Microtus arvalis)

A másik csoportba azon fajdk virtoznak, melyek többé-kevésbé szűken a kukoricára specializálódtak. Ezek között megkülönböztetünk úgynevezett juvenilis, azaz a kukorica fiatal korában károsító, és vegetációs kártevőket, melyek a növény későbbi életszakaszában okoznak problémát. A juvenilis kártevők rendszerint a teljes vegetációs periódusban jelen vannak, de kártételük a kukorica későbbi életszakaszaiban már nem jelentős.

Fontosabb juvenilis kártevők:

- fritlégy (Oscinella frit)
- & kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis)
- muharbolha (Phyllotreta vittula)

Fontosabb vegetációs kártevők:

- amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera)
- kukoricamoly (Ostrinia nubilalis)
- kukorica-gyökértetű (Tetraneura ulmi)
- 🕺 zöld kukorica-levéltetű (Rhopalosiphum maydis)
- zselnicemeggy-levéltetű (Rhopalosiphum padi)
- 🙎 egyes nagyvadak (gímszarvas, őz, vaddisznó)

A felsoroltakon kívül alkalmi jelleggel, vagy kisebb jelentőségben még számos allatfaj táplálkozik, melyek akár kisebb-nagyobb károkat is okozhatnak. A szemeskukorica tárolása közben számos raktári kártevő is felléphet, melyek ellen speciális védekezési eljárások alkalmazása vezethet eredményre. A kukorica legfontosabb raktári kártevői:

- kukoricazsuzsok (Sitophilus zeamais)
- gabonazsuzsok (Sitophilus granarius)
- raktári gabonamoly (Nemapogon granellus)
- Rezei gabonamoly (Sitotraga cerealella)
- nagy kenyérbogár (Tenebrioides mauritanicus)



## Betegségei

- Vírusos betegségek
  - → kukorica csíkos mozaik, kórokozó: maize dwarf mosaic potyvirus
  - → kukorica klorotikus foltosság, kórokozó: sugarcane mosaic potyvirus
- Baktériumos betegségek
  - → baktériumos hervadás, kórokozó: Erwinia stewartii
- Gombás betegségek
  - → kukoricaperonoszpóra, kórokozó: Sclerophthora macrospora
  - → kukoricarozsda, kórokozó: Puccinia sorghi
  - → golyvásüszög, kórokozó: Ustilago maydis
  - → rostosüszög, kórokozó: Sorosporium holci-sorghi
  - → kukorica szürke gyökér- és szárkorhadász, korokozók: Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia bataticola
  - → diplodiás cső- és szárkorhadás, kórokozók: Diplodia maydis, D. macrospora
  - → kabatiellás szemfoltosság, kórokozó: Kabatiella zeae
  - → nigrospórás szárazkorhadás, kórokozó: Nigrospora oryzae
  - → helmintospóriumos levélfoltosság és száradás, kórokozók: Helminthosporium turcicum, H. carbonum, H. maydis
  - → kukorica fuzáriózisa, kórokozók: Fusarium graminearum, Gibberella zeae, F. moniliforme, G. fujikuroi, F. culmorum



