



SIMULADO INTEGRADORA - 2º PERÍODO

Baseado no padrão de cobrança da prova Integrada P2 2023.2 - questões inéditas, fechadas, com dificuldade elevada e pegadinhas conceituais.

Aluno:	_____
Turma:	_____ Data: ____/____/____
Instruções:	Assinale apenas uma alternativa correta em cada questão. Não há gabarito neste caderno.

1ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Enunciado:

Uma estudante com atraso menstrual de 7 semanas realiza teste rápido de urina, que se mostra positivo. Na primeira consulta, pergunta qual substância permitiu a detecção precoce da gestação e qual sua principal função inicial na manutenção da gravidez.

Assinale a alternativa correta.

Alternativas:

- (A) Gonadotrofina coriônica humana, produzida inicialmente pelo sinciotrofoblasto, com ação de manter o corpo lúteo e a secreção de progesterona no início da gestação.
- (B) Hormônio luteinizante, produzido pela placenta, com ação de induzir a descamação endometrial controlada nas primeiras semanas.
- (C) Prolactina, produzida pela neuro-hipófise, responsável por manter o corpo lúteo ativo até a formação completa da placenta.
- (D) Estriol, produzido pelo corpo lúteo, cuja elevação urinária é o marcador mais sensível para testes rápidos de farmácia.

2ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Enunciado:

Paciente com hipocalcemia persistente apresenta elevação compensatória do paratormônio (PTH). O professor solicita que o aluno descreva o conjunto de efeitos fisiológicos mais coerente com esse achado.

Qual alternativa apresenta a resposta mais adequada?

Alternativas:

- (A) Redução da reabsorção renal de cálcio, aumento da reabsorção renal de fosfato e inibição da síntese de calcitriol.
- (B) Aumento da reabsorção renal de cálcio, redução da reabsorção renal de fosfato, estímulo indireto à reabsorção óssea e aumento da formação de calcitriol.
- (C) Inibição direta dos osteoclastos maduros, aumento da deposição óssea e bloqueio da absorção intestinal de cálcio.
- (D) Aumento simultâneo da excreção urinária de cálcio e fosfato, com queda da absorção intestinal de cálcio.

3ª QUESTÃO**Módulo(s): HAM****Enunciado:**

Homem de 43 anos procura a UBS com dor no quadril direito e dificuldade para manter a coxa estendida em decúbito dorsal. Durante o exame, ao flexionar passivamente um quadril em direção ao tórax, observa-se elevação involuntária da coxa contralateral da maca.

A manobra descrita e o achado mais provável são, respectivamente:

Alternativas:

- (A) Teste de Jobe; lesão do músculo supraespal.
- (B) Teste de Gerber; comprometimento do subescapular.
- (C) Teste de Thomas; contratura em flexão do quadril.
- (D) Teste de Tinel; compressão do nervo mediano no punho.

4ª QUESTÃO**Módulo(s): MEP + IESC****Enunciado:**

Em uma reunião de vigilância, a equipe comparou o número de óbitos por leptospirose em determinado período com o total de pessoas diagnosticadas com leptospirose no mesmo território e período. O objetivo era estimar a gravidade do agravo na população acometida.

O indicador descrito é:

Alternativas:

- (A) Taxa de incidência.
- (B) Taxa de prevalência.
- (C) Mortalidade proporcional geral.
- (D) Taxa de letalidade.

5ª QUESTÃO**Módulo(s): SOI****Enunciado:**

Após relatar intenso prazer ao consumir alimentos muito palatáveis, um paciente pergunta ao estudante de medicina quais áreas encefálicas compõem o circuito mais diretamente relacionado à recompensa e à motivação.

A alternativa correta é:

Alternativas:

- (A) Hipocampo, área de Broca e córtex occipital primário.
- (B) Área tegmentar ventral, núcleo accumbens e córtex pré-frontal, com importante participação dopaminérgica.
- (C) Cerebelo, ponte e núcleo rubro, com predomínio de aferências motoras conscientes.
- (D) Bulbo, tálamo lateral e córtex visual, com predomínio de transmissão colinérgica periférica.

6ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI + MEP

Enunciado:

Um estudo transversal com idosos de uma área de alta vulnerabilidade social avaliou fatores associados a sintomas depressivos. A tabela abaixo apresenta resultados de uma análise logística.

Variável	OR	IC 95%	p-valor
Boa qualidade do sono	0,42	0,22 - 0,80	0,008
Risco de desnutrição	3,80	1,50 - 9,70	0,004
Dor crônica autorreferida	1,30	0,80 - 2,20	0,120

Considerando a interpretação dos dados e a morfofisiologia límbica, assinale a alternativa correta.

Alternativas:

- (A) Boa qualidade do sono se associou a maior chance de depressão, pois OR menor que 1 indica fator de risco.
- (B) Dor crônica apresentou associação estatisticamente significativa, porque o OR foi maior que 1, independentemente do intervalo de confiança.
- (C) Risco de desnutrição esteve associado a maior chance de sintomas depressivos; fome, saciedade e respostas emocionais envolvem circuitos hipotalâmicos e límbicos integrados.
- (D) Como o estudo é transversal, o OR permite concluir causalidade temporal entre desnutrição e depressão.

7ª QUESTÃO

Módulo(s): MEP + IESC

Enunciado:

Em um município, os relatórios da Atenção Básica indicam elevada frequência de adultos sem diagnóstico conhecido, mas com medidas repetidamente alteradas de pressão arterial e glicemia capilar em visitas domiciliares. A gestão deseja uma resposta inicial de curto prazo para reduzir subdiagnóstico e iniciar cuidado oportuno.

A conduta mais adequada é:

Alternativas:

- (A) Organizar busca ativa e triagem de hipertensão e diabetes, com encaminhamento dos casos suspeitos para confirmação diagnóstica e acompanhamento longitudinal.

- (B) Priorizar apenas campanhas digitais amplas, sem avaliação presencial, pois condições crônicas não exigem estratificação clínica inicial.
- (C) Suspender consultas programadas para concentrar todos os recursos em pronto atendimento de agudizações.
- (D) Encaminhar todos os moradores diretamente para serviço terciário, independentemente de risco, sintomas ou confirmação diagnóstica.

8ª QUESTÃO

Módulo(s): HAM

Enunciado:

Homem de 68 anos relata jato urinário fraco, noctúria, gotejamento terminal e perda ponderal. O médico decide realizar toque retal como parte da avaliação clínica.

Sobre a técnica e a interpretação inicial do exame, assinale a alternativa correta.

Alternativas:

- (A) O exame deve ser evitado em homens acima de 50 anos, pois não acrescenta informação clínica ao raciocínio urológico.
- (B) A próstata é avaliada na parede posterior do reto, e contornos endurecidos excluem neoplasia.
- (C) O toque deve ser feito sem lubrificação para aumentar a sensibilidade tátil do examinador.
- (D) O examinador deve usar luva lubrificada, introduzir o dedo com delicadeza e avaliar tônus esfinteriano, mucosa retal e próstata pela parede anterior do reto.

9ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Enunciado:

Paciente de 38 anos sofreu fratura desalinhada de rádio. Semanas depois, a radiografia mostra calo ósseo exuberante e início de remodelamento para recuperação da arquitetura lamelar.

No remodelamento tardio, o papel celular mais compatível com a reorganização do tecido ósseo é:

Alternativas:

- (A) Condrócitos removem diretamente matriz mineralizada e sintetizam colágeno tipo II definitivo.
- (B) Osteoblastos fagocitam todo o osso imaturo antes da formação de hematoma.
- (C) Osteoclastos reabsorvem osso imaturo ou excessivo, enquanto osteoblastos depositam nova matriz óssea posteriormente mineralizada.
- (D) Osteócitos se desdiferenciam em células-tronco hematopoiéticas para formar cartilagem articular.

10ª QUESTÃO

Módulo(s): IESC

Enunciado:

Após confirmação de casos suspeitos de tuberculose em uma comunidade, a equipe da UBS precisa alimentar o sistema de informação que subsidia a vigilância epidemiológica de agravos de notificação compulsória, permitindo análise da ocorrência do evento no território.

O sistema indicado é:

Alternativas:

- (A) SI-PNI, utilizado prioritariamente para registro de imunobiológicos e coberturas vacinais.

- (B) SINAN, utilizado para agravos e doenças de notificação compulsória.
- (C) SISVAN, utilizado como principal sistema de notificação de doenças transmissíveis.
- (D) CNES, utilizado para registrar casos individuais de tuberculose e emitir investigação epidemiológica.

11ª QUESTÃO

Módulo(s): MEP + IESC

Enunciado:

Durante um surto respiratório, a Secretaria Municipal organizou os dados por faixa etária. Considere a tabela:

Faixa etária	Casos confirmados	Óbitos
0 - 19 anos	120	2
20 - 39 anos	280	8
40 - 59 anos	300	18
60 anos ou mais	100	25

A letalidade na população com 60 anos ou mais é:

Alternativas:

- (A) 2,5%.
- (B) 8,3%.
- (C) 25%.
- (D) 50%.

12ª QUESTÃO

Módulo(s): IESC

Enunciado:

Uma equipe de Saúde da Família identifica que a baixa adesão de gestantes ao pré-natal se relaciona a transporte precário, insegurança alimentar e ausência de rede de apoio. A equipe propõe ações com assistência social, escola local e lideranças comunitárias.

Essa conduta expressa, no processo de trabalho da Atenção Básica, principalmente:

Alternativas:

- (A) Desenvolvimento de ações intersetoriais em articulação com equipamentos sociais do território.
- (B) Centralização do cuidado exclusivamente no nível hospitalar, por maior densidade tecnológica.
- (C) Restrição do acolhimento apenas a pessoas previamente cadastradas, mesmo em situações de vulnerabilidade.
- (D) Desterritorialização da equipe, evitando reconhecimento das condições locais de saúde.

13ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI + IESC

Enunciado:

Paciente com diabetes tipo 2 recebe orientação na UBS sobre alimentação, atividade física e uso correto da medicação. O médico explica que o equilíbrio glicêmico depende da ação coordenada de insulina e glucagon.

Assinale a alternativa correta sobre esses hormônios.

Alternativas:

- (A) Insulina é secretada por células alfa e estimula gliconeogênese hepática após refeições.
- (B) Insulina, secretada por células beta, favorece captação de glicose e armazenamento de glicogênio; glucagon, secretado por células alfa, estimula liberação hepática de glicose em jejum.
- (C) Glucagon é liberado quando a glicose está elevada e reduz a glicemia por aumento da captação muscular dependente de GLUT4.
- (D) Insulina e glucagon exercem sempre ações idênticas, sendo diferenciados apenas pelo local de produção.

14ª QUESTÃO**Módulo(s): IESC****Enunciado:**

Durante reconhecimento territorial, alunos acompanham uma ACS que mostra os limites da área de uma equipe, as microáreas sob responsabilidade dos ACS e pontos com maior vulnerabilidade, como ausência de saneamento, lixo a céu aberto e concentração de gestantes adolescentes.

Analise as afirmativas:

- I. A área corresponde ao território de responsabilidade de uma equipe de Saúde da Família.
- II. A microárea é o território de acompanhamento prioritário do ACS.
- III. Distrito sanitário é sinônimo de cada rua visitada pelo ACS durante o reconhecimento.
- IV. Microáreas de risco concentram situações que exigem atenção diferenciada por potencial de adoecimento.

Alternativas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.

15ª QUESTÃO**Módulo(s): SOI + HAM + MEP****Enunciado:**

Dona Alzira, 59 anos, com diabetes tipo 2, anotou glicemias capilares de jejum durante uma semana após orientação da UBS.

Dia	1	2	3	4	5	6	7
Glicemia capilar de jejum (mg/dL)	132	145	128	151	139	142	136

Considerando o monitoramento e a fisiologia da insulina, assinale a alternativa correta.

Alternativas:

- (A) Os valores indicam controle adequado, pois toda glicemia capilar em jejum acima de 126 mg/dL é esperada em pessoas sem diabetes.
- (B) O glicosímetro domiciliar é o padrão definitivo para diagnóstico e dispensa qualquer avaliação laboratorial ou de hemoglobina glicada.

- (C) Os registros sugerem controle glicêmico inadequado e podem refletir resistência à insulina e/ou secreção insuficiente; a hemoglobina glicada auxilia a avaliar controle dos últimos meses.
- (D) Em jejum, a insulina deve aumentar a produção hepática de glicose para reduzir a glicemia capilar.

16ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Enunciado:

Uma puérpera relata dificuldade na amamentação e pergunta sobre os hormônios envolvidos na produção e ejeção do leite. Analise as afirmativas:

- I. A prolactina é produzida por lactotrofos da adeno-hipófise e está relacionada à síntese de leite.
- II. A dopamina hipotalâmica estimula diretamente a secreção de prolactina pelo sistema porta hipofisário.
- III. A ocitocina, liberada pela neuro-hipófise, participa da ejeção do leite por contração de células mioepiteliais.
- IV. Elevações sustentadas de prolactina podem inibir GnRH, reduzindo LH e FSH e contribuindo para anovulação lactacional.

Alternativas:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

17ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Enunciado:

Mulher de 36 anos apresenta anticorpos anti-tireoperoxidase elevados. O professor pede que o aluno relacione a localização funcional dessa enzima com uma etapa essencial da síntese dos hormônios tireoidianos.

Assinale a alternativa correta.

Alternativas:

- (A) A tireoperoxidase fica na membrana basolateral das células C e converte T4 em T3 por desiodação periférica.
- (B) A tireoperoxidase fica no citosol dos tireócitos e armazena calcitonina no coloide.
- (C) A tireoperoxidase fica na medula tireoidiana e estimula secreção de paratormônio.
- (D) A tireoperoxidase está associada à membrana apical das células foliculares e participa da oxidação do iodeto e organificação da tirosina na tireoglobulina.

18ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI + HAM

Enunciado:

Gestante de 31 semanas procura atendimento relatando saída de líquido, contrações dolorosas regulares e progressivas. Ao toque vaginal, há dilatação cervical de 5 cm. O quadro sugere trabalho de parto prematuro.

A alternativa que melhor relaciona o mecanismo fisiológico do trabalho de parto é:

Alternativas:

- (A) A progesterona aumenta a excitabilidade do miométrio e induz diretamente contrações intensas no final da gestação.
- (B) Ocitocina e prostaglandinas favorecem contratilidade uterina e amadurecimento cervical, enquanto a progesterona exerce efeito predominantemente relaxante sobre o miométrio.
- (C) A prolactina é o principal hormônio responsável pela contração uterina, por ação direta sobre receptores cervicais.
- (D) A inibição completa das prostaglandinas é necessária para iniciar dilatação cervical e contrações regulares.

19ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Enunciado:

Durante ultrassonografia obstétrica, uma gestante de 18 semanas pergunta sobre a diferenciação sexual fetal. O aluno deve responder com base na embriologia do sistema reprodutor.

Assinale a alternativa correta.

Alternativas:

- (A) Até a 20ª semana, ductos mesonéfricos e paramesonéfricos originam simultaneamente útero, tuba uterina e epidídimo em ambos os sexos.
- (B) Os ductos de Müller originam exclusivamente estruturas urinárias, enquanto o seio urogenital forma as tubas uterinas.
- (C) Os ductos paramesonéfricos originam tubas uterinas, útero e porção superior da vagina; a genitália externa torna-se progressivamente diferenciada após o período indiferenciado inicial.
- (D) A substância inibidora mülleriana estimula a formação do útero e das tubas uterinas no feto masculino.

20ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Enunciado:

Pessoa com baixa visão aprende Braille. Para interpretar os pontos em relevo, necessita de tato discriminativo fino nas polpas digitais, com aferência somatossensorial consciente.

A via sensitiva e a região cortical de interpretação principal são, respectivamente:

Alternativas:

- (A) Via anterolateral e lobo occipital.
- (B) Coluna dorsal-lemnisco medial e córtex somatossensorial primário no lobo parietal.
- (C) Trato corticoespinal lateral e giro temporal superior.
- (D) Via vestibuloespinal e córtex pré-frontal dorsolateral.