

"福元"安世多阿米諾思錠 0.3 公克

ACETAMINOPHEN TABLETS 0.3 GM "F.Y."

衛署藥製字 第 000076 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

每錠中含有：

有效成分及含量：Acetaminophen 300.0毫克(mg)。

1.2 其他成分(賦形劑)

Povidone、Cellulose Microcrystalline、Lactose、Starch Pregelatinized、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Talc。

2 用途(適應症)

退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

※曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

3.2.3 有肝臟疾病的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

3.4.5 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen有急性肝衰竭的風險。

4 用法用量

年 齡	劑 量
成人及12歲以上	發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4 ~ 6小時可重複服用，每次1錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。 每24小時內不可超過5次。
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2 (1/2錠)。
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4 (1/4錠)。
3歲以下	請洽醫師診治。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

5.2.3 使用過量[每日超過4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

5.2.4 有過敏情形：例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

6 包裝

2 ~ 1000錠塑膠瓶裝。

7 儲存方式

請於25°C以下保存，且於有效期限內使用。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

製造廠

福元化學製藥股份有限公司

新北市瑞芳區大寮路95-1號

藥商

