

明那膠囊

MENNA CAPSULES

衛署藥製字 第 000096 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

每一錠中含有：

有效成分及含量：Diphenhydramine Hydrochloride 50mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Colloidal Silicon Dioxide、Lactose、Magnesium Stearate、Starch。

1.3 膠囊殼

Brilliant Blue FCF、Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Titanium Dioxide。

2 用途(適應症)

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 哺乳婦。

3.1.3 3歲以下。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 嚴重代謝性肝腎疾病的人。

3.2.2 呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，或因前列腺肥大引起之排尿困難的人。

3.2.3 12歲以下。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦及可能懷孕婦女。

3.3.2 65歲以上。

3.3.3 曾經有心臟疾病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎臟疾病的人。

3.3.4 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

3.3.5 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議劑量。

3.4.4 本藥不得與含酒精飲料併服。

3.4.5 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。

4 用法用量

年 齡	劑 量
成人(12歲以上)	1次1錠，一日3次，每次間隔4小時以上服用。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮。
其 他	口乾、視覺上之困擾。

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

6~1,000粒。塑膠瓶裝、玻璃瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

7 儲存方式

本藥應儲存於25°C以下緊密容器。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

製造廠

強生化學製藥廠股份有限公司

新北市三重區三和路四段77號2、3樓、79號1至6樓

藥商

強生化學製藥廠股份有限公司

新北市三重區三和路四段77號2、3樓、79號1至6樓