

2.懷孕婦女使用本藥之安全性尚未確立，應就其使用之危險與效益加以考慮。

FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：*C。

3.哺乳婦女不宜使用本藥，因本藥可分泌至乳汁中，會對嬰兒造成危險。

4.有下列醫療問題時，本藥之使用應小心考慮：

- (1)心血管疾病、包括心絞痛、心律不整或冠狀動脈功能不全。
- (2)糖尿病。
- (3)有閉角青光眼素質者。
- (4)高血壓。
- (5)甲狀腺機能亢進症。
- (6)前列腺肥大。

5.使用本藥時，切忌服用超過處方指示用量。

6.一天中的最後一個劑量應在就寢前幾小時服用，以使失眠的可能性減至最低。

7.由於長期或過量使用本藥，會使病人對 Ephedrine 產生耐藥性，停服本藥幾天後再投服，即可恢復其藥效。

【相互作用】

1.全身麻醉劑(尤其是 Cyclopropane 或 Halogenated Hydrocarbons)或 Digitalisglycosides 與本藥合用時，會產生心律不整，因這些藥物可能使心肌對 Ephedrine 效應變得敏感。

2.Ergonovine、Methyletergonovine 或 Oxytocin 與本藥合用時，會引發嚴重高血壓。

3.Guanethidine 與本藥合用時，會減弱其降血壓效應。

4.MAO 抑制劑與本藥合用時，會增強 Ephedrine 的加壓效應，可能導致高血壓危急；因此，MAO 抑制劑投用期中或投藥後 14 天內不應頭用本藥。

5.Reserpine 或 Tricyclic antidepressants 與本藥合用時，會減低 Ephedrine 的效應。

6.其他類的擬交感神經作用劑與本藥合用時，會增加彼此的藥效和潛在副作用。

【副作用】

1.使用本藥如有胸痛或心跳不規則或高劑量下發生的幻覺或情緒或心理變化時，應予醫療照應。

2.使用本藥如有下列徵象持續發生時，亦應給予醫療照應：

神經緊張、煩躁不安、入睡困難、排尿困難或疼痛、眩暈或頭昏眼花、溫熱感、頭痛、食慾不振、噁心、嘔吐、震顫、呼吸困難、盜汗、異常蒼白、心跳異常快速及虛弱等。

【保存條件】

應包裝於緊密容器，貯於陰涼(15~30℃)乾燥避光處所。

【包裝】

2~1000 粒塑膠瓶裝。

福元化學製藥股份有限公司
台北縣瑞芳鎮大寮路 95-1 號

LTT060Y