

激躁大腸症候群治療劑

特良高朗[®]膜衣錠 7.5 公絲 (溴玫若雷)Trancolon[®] F.C. Tablets 7.5 mg (Mepenzolate Bromide)

特良高朗膜衣錠是作用在下部消化道的抗膽鹼激性藥劑，能緩解因為激躁大腸症候群所引起的大腸機能異常的藥劑。

< 成 分 > Trancolon 膜衣錠 每 1 錠 (Tablet) 中含有 Mepenzolate Bromide 7.5 mg
賦 形 劑：Lactose, L-hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl cellulose-L, magnesium stearate, hypromellos, iron sesquioxide, titanium dioxide, polyethylene glycol 6000, alcohol.

< 適 應 症 > 激躁大腸症候群 (Irritable colon syndrome)

< 用法 · 用量 > 本藥須由醫師處方使用
通常，成人 1 次 2 錠，1 日服用 3 次。但可依年齡、症狀適宜增減之。

< 藥效藥理 >

1. 解痙作用

(1) 對生物體消化道的自主運動抑制作用及攣縮緩解作用¹⁾²⁾⁴⁾

以麻醉的狗及貓作實驗結果，Mepenzolate Bromide 對於胃、小腸及結腸的自主運動，以及 Physostigmine，Acetylcholine 及刺激迷走神經所造成的消化道攣縮，都有明顯的抑制作用。

Mepenzolate Bromide 所產生的自主運動抑制作用，對於結腸的作用比小腸更為顯著。

(2) 對腸道輸送能力的作用³⁾

Mepenzolate Bromide 在大白鼠以 Charcoal meal 法，顯示對於消化道運動具有抑制作用，其效果為 Atropine 的 1/2。

(3) 對胃、大腸反射的作用⁴⁾

使用狗作寒冷刺激所造成胃、大腸反射的實驗結果，顯示 Mepenzolate Bromide 具有明顯的抑制作用。

(4) 抗膽鹼激性作用³⁾

在狗以血壓當作指標的實驗結果，Mepenzolate Bromide 顯著地抑制 Acetylcholine 所引起的血壓下降，其效果約和 Atropine 相當。

2. 其他的作用

(1) 唾液分泌抑制作用

在麻醉的狗和貓，對於以 Acetylcholine 所引起的唾液分泌，以 Mepenzolate Bromide 0.5 mg/kg 靜脈給藥，顯示並無抑制作用¹⁾。然而，對於麻醉的兔子，以 Pilocarpine 所引起的唾液分泌，有報告顯示皮下注射 Mepenzolate Bromide 的抑制強度為 Atropine 的 2 倍³⁾。

(2) 對膀胱收縮的作用


對於麻醉的狗，刺激骨盆神經所引起的膀胱收縮，即使以 Mepenzolate Bromide 4 mg/kg 靜脈給藥，也只有部分的抑制，此作用強度約為 Methantheline Bromide 的 1/10。

< 性 狀 > 1. 製劑之性狀：特良高朗膜衣錠之性狀如下表

田 Code	顏色	直徑 (mm)	厚度 (mm)	重量 (g)	劑型
田 434	淡紅白色	約 6.1	約 2.9	約 0.093	膜衣錠

2. 有效成分之理化學性質：

結構式



一般名：Mepenzolate Bromide
化學名：3-(2, 2-diphenylglycoloyloxy)- 1, 1-dimethyl -piperidinium bromide
分子式：C₂₁H₂₆BrNO₃
分子量：420.35
融點：約 230℃ (分解)

Mepenzolate Bromide 為白色～淡黃白色之結晶或結晶性的粉末；無臭，苦味，極易溶於甲酸 (Formic Acid)，易溶於甲醇 (Methanol)，可溶於熱水，微溶於水或乙醇 (Ethanol)，極微溶於醋酸酐 (Acetic Anhydride)，幾不溶於乙醚 (Ether)。

< 使用上之注意事項 >

1. 禁忌 (下列患者請勿給藥)

- (1) 有青光眼之患者 (會增加眼壓，恐有使症狀惡化之虞)。
- (2) 前列腺肥大造成排尿障礙之患者 (恐會引起排尿肌之弛緩及膀胱括約肌之收縮，有排尿障礙惡化之虞)。
- (3) 嚴重的心臟病患者 (促進心臟收縮，有使症狀惡化之虞)。
- (4) 痙攣性腸阻塞之患者 (因使消化系統運動減慢，有使症狀惡化之虞)。
- (5) 有過因本劑之成分而引起過敏病史之患者

2. 下列患者請慎重給藥

- (1) 有前列腺肥大之患者 (可能會引起排尿障礙)。
- (2) 有甲狀腺機能亢進之患者 (因甲狀腺機能亢進之患者會出現心悸及頻脈的現象，而本劑會促進心臟收縮，故有使症狀惡化之虞)。

- (3) 有充血性心臟衰竭或心律不整之患者 (促進心臟收縮，有使症狀惡化之虞)。
- (4) 有潰瘍性大腸炎之患者 (可能會引起中毒性巨大結腸症)。
- (5) 在高溫環境下之患者 (因會抑制汗腺等之分泌機能，可能會引起體溫調節障礙而造成高溫)。
- (6) 請參照對老年人的給藥。

3. 重要之基本注意事項

可能會引起視力調節障礙，所以對於正在給與本劑之患者，請其注意開車等伴有危險性的機械操作。

4. 相互作用

※ 併用時之注意事項

藥劑名等	臨床症狀、處置方法	機轉、危險因子
三環類抗鬱劑 Imipramine Amitriptyline 等 Phenothiazine 類製劑 Chlorpromazine 等 Anti-histamine 劑 Chlorpheniramine 等	可能會出現因抗膽鹼作用而產生之副作用 (視力調節障礙、口渴、排尿障礙等)。	因本劑與這些藥劑都有抗膽鹼作用，併用可能會增強抗膽鹼作用。
MAO 抑制劑	可能會出現因抗膽鹼作用而產生之副作用 (視力調節障礙、口渴、排尿障礙等)。	可能會阻礙本劑代謝，增強抗膽鹼作用。

5. 副作用

並未明確實施關於本劑之使用成績調查等的副作用發現頻率調查。

	頻率不明
眼	視力調節障礙
消化系統	口渴、便秘、噁心、嘔吐、食慾不振
泌尿系統	排尿障礙
精神神經系統	眩暈、頭痛、頭重
過敏症 註)	發疹

註) 若出現如上症狀時，請停止給藥。

6. 對老年人的給藥

一般老年人容易因為抗膽鹼作用產生視力調節障礙、口渴、排尿障礙等症狀，請慎重給藥。

7. 對孕婦、產婦、授乳婦等的給藥

對於孕婦或是可能懷孕的婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險性時，才可給藥。(有關懷孕中給藥的安全性尚未確立)

8. 對小兒的給藥

對小兒的給藥的安全性尚未確立。(使用經驗不足)

9. 應用時之注意事項

在發給藥品時：指導患者由鋁箔包裝中取出後服用 (根據報告揭載，若誤食鋁箔包裝，尖硬部分會刺入食道黏膜中，更進一步會穿孔而引起膈膜炎等的嚴重併發症)。

< 保管上之注意事項 >

1. 貯藏法：25℃以下保存。
2. 請參照外盒上標示之保存期限。

< 包裝 >

6~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

< 主要文獻 >

- 1) Buckley, J. P. et al. : J. Amer. Pharm. Ass. 46 (10) 592,1957
- 2) Chen, J. Y. P. : Arch. Int. Pharmacodyn. 21 (1~2)78, 1959
- 3) Long, J. P. : J. Amer. Pharm. Ass. 43 (10) 616,1954
- 4) 日野貞雄：日本消化器病學會雜誌 64 (10) 943,1967

需上述文獻者，歡迎來函索取

台灣安斯泰來製藥股份有限公司
台北市民生東路三段 10 號 5 樓

委託者
台灣安斯泰來製藥股份有限公司
台北市民生東路三段 10 號 5 樓

製造廠
杏輝藥品工業股份有限公司
宜蘭縣冬山鄉中山村中山路 84 號