

【禁 忌】（對下列患者請勿投與）

對本劑的成分曾發生過敏症的患者。

【使用時的注意事項】

一、慎重投與（對下列患者請慎重投與）

- (1)有藥物過敏症病史的患者。
- (2)有血液凝固異常的患者（容易出現出血傾向。）
- (3)有重度肝功能障礙或腎功能障礙的患者（容易出現出血傾向。）

二、交互作用

併用時注意事項（併用時必須特別小心）

藥劑名稱等	臨床症狀・措施方法	機轉・危險因子
抗凝血劑	抗凝血劑的作用有時會增強，因此必須仔細觀察，小心服用。	本劑對於纖維蛋白(fibrin)、纖維蛋白原(fibrinogen)具有明顯的溶解能力。

三、副作用

在日本核准前的調查中，1,938 例中有 46 例（2.4%），在市售後的副作用頻率調查(1971年2月時)中，3,629 例中有 114 例（3.1%）發現了包含臨床檢查值異常在內的副作用。

以下為上述調查或自行報告等當中發現的副作用。

(1)重大的副作用

- ①由於有時會出現皮膚黏膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）及中毒性表皮壞死症（Lyell 症候群）（不到 0.1%），因此請仔細觀察，當發現異常時，應停止服用，並採取適當處置。
- ②由於有時會出現發燒、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 光異常、伴隨嗜酸白血球增加之間質性肺炎、PIE 症候群（不到 0.1%）等症狀，因此當出現上述症狀時，應停止服用，並採取適當處置（服用副腎皮質荷爾蒙劑等）。
- ③由於有時會引起休克、過敏性反應（anaphylaxis）的症狀（不快感、口內異常感、暈眩、便秘、耳鳴、出汗、血壓降低、喘鳴、呼吸困難、全身紅潮、顏面浮腫等）（不到 0.1%），因此請仔細觀察，當發現異常時，應停止服用，並採取適當處置。
- ④由於有時會出現伴隨 AST (GOT)、ALT (GPT) 上昇等之肝功能障礙、黃疸（不到 0.1%），因此請仔細觀察，當發現異常時，應停止服用，並採取適當處置。

(2)其他副作用

	0.1 ~ 5%	< 0.1%
① 過 敏 症 (註)	發疹、搔癢、發紅	
② 消 化 器	食慾不振、胃部不適感、噁心、嘔吐	腹瀉
③ 血 液		鼻出血、血痰等的出血傾向

（註）有上述症狀時，應停止服用。

四、使用上的注意事項

藥劑交付時：對於 PTP 包裝的藥劑，請指導病患由 PTP 塑膠片中取出後再服用。
[曾有報告指出，有病患因不慎服用 PTP 塑膠片，造成硬銳角部刺入食道黏膜，甚至引起穿孔，併發縱膈炎等嚴重的併發症。]

五、其他注意事項

- (1)各種細菌感染症併發時，應併用抗微生物製劑或化學療法劑。
- (2)本劑為腸溶錠，故請勿咬碎，用溫開水送服即可。

【警 語】

該藥品可能有導致史蒂文生氏強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome)、毒性表皮壞死溶解症(toxic epidermal necrolysis)、過敏性休克(anaphylactic shock)及肝炎(hepatitis)、黃疸(jaundice)等不良反應。

儲藏方法：25℃以下保存。

使用期限：在外盒標示的使用期限內使用。

（即使在使用期限內，但開封後請速使用。）

〔包 裝〕

達先錠：6~1,000錠塑膠瓶，鋁箔盒裝。

達先錠10公絲：6~1,000錠塑膠瓶

委 託 者：台灣武田藥品工業股份有限公司
台北市南京東路三段217號7樓
TEL: (02) 2712-1112

製 造 廠：杏輝藥品工業股份有限公司
宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
®註冊商標（武田藥品工業株式會社授權）