

賜腦清錠

Cinnazine Tablets

本品是一種安全、可靠而具特異性的腦血管障礙與改善冠狀動脈硬化症之最佳藥物。

成分：每錠含
Cinnarizine.....25mg

藥理作用：Cinnarizine 是一種效力極佳之血管擴張劑，能直接促進腦循環，使腦部組織獲得充分之氧氣，活化腦組織機能，以改善腦血管硬化症及其所引起之障礙。又本品能深度地擴張冠狀動脈，防止血管痙攣，以減輕心臟之負荷，進而強化心臟功能。本品尚能阻止內因性痙攣物質(如Adrenaline，Noradrenaline，Dopamine，Angiotensin，Histamine，Vasopressin，Serotonin，Bradykinin, Nicotine)所致之血管平滑肌之痙攣，以及加強腦血液中二氧化碳分壓之對血管的擴張作用。

本品特點：

- 1.在臨床治療上，本品無毒性且無禁忌症，故患者可長期安心服用。
- 2.服用後，不影響血壓，故能維持體內循環之正常；亦不影響碳水化合物代謝，故適用於糖尿病併發血管硬化症之治療。
- 3.本品藥效迅速而持久，服用本品能增加血液流量及氧氣供應，故能預防腦中局部缺氧所致之中風、半身不遂；同時對冠狀動脈硬化所致之心絞痛，也有預防功效。
- 4.Cinnarizine在化學構造上是Piperazine的衍生物與現今仍在沿用的藥物(Theophylline，Nicotinic Acid的衍生物或其他配合物)不同。

適應症：噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

用法用量：1日服3次，每次1錠。病情較重者，可增至每日服6錠。通常服用數週後，即見最佳之效果，本品可連用數月而無任何不良副作用發生。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：1.一般注意事項：

如疑為頭蓋內出血的患者應先給予止血，待10天至2週內才開始投與治療。

2.禁忌：

a.頭蓋內出血若未止血者。

b.孕婦與可能懷孕的婦人。

3.慎重投與：

高齡者的投與，可能有振顫、巴金森氏症等錐體外路症狀副作用，宜慎重投與。

4.副作用：

a. 消化器：偶有噁心、食慾不振、下痢等症狀。

b.精神神經系：偶有頭痛、頭暈，嗜睡、倦怠感等症狀。

c.過敏症：偶有皮膚或黏膜組織產生發疹、紅斑等現象，若症狀產生時宜中止投與。

d.錐體外路症狀：偶有振顫、或巴金森氏症等錐體外路症狀產生時宜中止投與。

賦形劑：Lactose、Potato Starch、

Polyvinylpyrrolidone K-30、Purified Water、

Magnesium Stearate

貯存條件：25℃以下儲存。

包裝：6-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

衛署藥製字第001673號



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台南市新營區土庫里土庫6之20號