

Earmin Earmin Earmin Earmin

“優生” **宜爾敏** 錠
Earmin Tablets "Y.S."

衛署藥製字第03245號
LT-055-EA

【主要成份】：每錠含量：

Cyproheptadine Hydrochloride4mg

【適應症】：

過敏性疾患如皮膚炎、鼻炎、蕁麻疹、搔癢症、枯草熱、藥物過敏症。

【注意事項】：

1. 一般的注意：(1) 具催眠作用投與本劑之患者如開車或機械操作者需十分注意。
(2) 食慾刺激增進劑可增加體重改善食慾不振。
2. 禁忌：(1) 綠內障患者 (2) 狹窄性胃潰瘍患者 (3) 幽門十二指腸閉塞者
(4) 前立腺肥大等下部尿路閉塞性疾患者 (5) 急性支氣管發作
(6) 新生兒 (7) 老齡體弱患者 (8) 以往對此有過敏症之患者。
3. 慎重投與：(1) 曾有支氣管炎病歷患者 (2) 眼內壓高亢患者 (3) 甲狀腺機能亢進症患者 (4) 心血障害患者 (5) 高血壓症患者。
4. 副作用：(1) 過敏症：發疹等過敏症狀發現即停藥。
(2) 精神神經系：嗜眠、倦怠感、頭痛、興奮錯亂等。
(3) 消化器：口渴、噁心、下痢、腹痛症狀出現。
(4) 血液：服用中觀察如發現紫斑、血小板減少等血液障害症狀即停藥。
(5) 其他：頻尿、口腔粘膜乾燥浮腫等現象。
5. 妊婦授乳婦投與：
(1) 妊娠中投與安全性尚未確立，妊婦或可能妊娠的婦人治療上有益性或危險性依上回使用作判斷是否投與。
(2) 授乳中投與安全尚未確立，授乳中婦人最好不要投與。
6. 相互作用：同類似藥藥品併用需特別注意，與中樞神經抑制劑MAO阻害劑，抗膽碱素製劑相互作用增強其使用時需減量。
7. 遮光室溫保存。

【用法·用量】：

通常成人每次1錠，1日服用3~4次。依年齡症狀適宜增減。本藥須由醫師處方使用。

【賦形劑】：

Lactose S.G, Microcrystalline Cellulose (Avicel 101), Polyvinyl Pyrrolidone K30 (PVPK-30), Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Magnesium Aluminometasilicate

【包裝】：6-1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

【代號】：EA-0055



優生製藥廠股份有限公司

台中市南屯區工業區21路14號

MM 201511