

紙張尺寸：10X18公分

榮民

氫 氯 噻 治 錠 50 毫克

Hydrochlorothiazide Tablets 50 mg “VPP”

【成分名(中文名)】Hydrochlorothiazide (氫氯苯塞)

【劑型、含量】

錠劑：每錠含Hydrochlorothiazide.....50mg

本品含賦形劑Lactose、Starch、Talc、Magnesium Stearate、Powder Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Povidone與Calcium Phosphate Dibasic。

【臨床藥理】

- 1.抗高鈣利尿劑：減少尿中鈣排泄（正確機轉不明）。
- 2.抗高血壓劑：作用機轉不明，可能兼具腎臟及非腎臟效應。
- 3.利尿劑：影響腎小管之電解質重吸收機轉。本藥抑制了遠側腎小管對鈉重吸收，而增加鈉及水分排泄，且在遠側迴旋管及集尿管增加鉀之分泌，而增加鉀由尿中排泄。
- 4.本藥有微弱之碳酸酐酶抑制作用，故碳酸氫鹽之排泄會有輕度的增加，而尿液呈鹼性。
- 5.本藥口服後，迅速吸收並分佈全身，也會通過胎盤障壁並出現於乳汁，除微量由膽汁排泄外，其餘幾乎全部以原型藥由腎臟排泄。

【適應症】

利尿、高血壓。

【用法、用量】

本藥須由醫師處方使用。

一般成人劑量：

抗利尿劑（中樞或腎性尿崩症）或利尿劑—口服，25-100mg，一天1-2次，每隔一日用藥一次，或每日用藥，每週3-5日。

降壓劑—口服，每日25-100mg，一次或分成兩次服用，並依療效調整劑量。

【注意】年老病人可能對一般成人劑量較為敏感。

一般兒童劑量：口服，每公斤體重1-2mg或每平方米體表面積30-60mg

，一天1次或分2次服用。

【注意】6個月以下之嬰孩可能接受高達每日每公斤體重3mg之劑量。

【注意事項】

- 1.本藥為特發性高血壓的主要治療藥，在現行高血壓的逐步照應法上，是依以下方式進行之：
 - (1)用Thiazide利尿劑為起始治療，如有低血鉀症時，應給予可保留鉀之利尿劑或補充鉀，有些病人在第一步用藥上使用β-腎上腺素阻斷劑或許較適當。
 - (2)如用最大劑量之Thiazide利尿劑無法控制時，β-腎上腺素阻斷劑如：Methyldopa、Prazosin、Clonidine或Reserpine可加入療法上，如一種無效，可用它種試用之。利尿劑量應調劑到足以阻止體液滯留及可耐受之程度。
 - (3)如需其他降血壓藥，可用血管舒張劑如Hydralazine。
 - (4)如以上療法無法顯效，則第二步療法上可加入Guanethidine或Clonidine以之取代之。

(5)一旦高血壓控制已經達成，劑量便可減低。

(6)如病人對最大抗高血壓治療不起反應，則為嚴重或難治高血壓患者，應予特別療法。

(7)膳食管理(鈉之限制與體重減輕)是任何高血壓整體療法的重要部分，如能依醫師指示之膳食，則接受高血壓治療病人便可減低劑量及減少副作用。

2.病人對其他磺胺型之藥品過敏者，對本藥亦可能產生過敏。

3.不論健康的孕婦是否有輕微的水腫，均不建議使用利尿劑，這可避免母體和胎兒接受不必要之危險。利尿劑不能避免孕婦毒血症的產生，也無充分的證據證明利尿劑可以治療毒血症。Thiazide會通過胎盤而出現於臍帶的血液中，因此孕婦或可能懷孕的婦女欲使用本品時，需衡量藥品的好處及可能帶給胎兒的危險，這些危險包括：胎兒或新生兒黃疸、血小板減少及其它於成人可能發生的不良反應。

4.本藥會分泌在母乳中，如果一定須使用本藥時，病人應停止授乳。

5.長期使用本藥，可能會發生急性胰臟炎。

6.本藥會升高血中尿酸量，與抗痛風藥共用時，抗痛風藥之劑量應加調節，用以控制血尿酸過多症及痛風。

7.使用本藥會干擾下列診斷結果：

- (1)血清膽紅素含量(因其從白蛋白結合部位位置換出)。
- (2)血清鈣含量(作劇甲狀腺功能試驗前應停用本藥)。
- (3)血清尿酸量(可能增加)。
- (4)血清中鎂、鉀、鈉含量(會降低，但尿毒症病人血清鎂含量可能增加)。
- (5)血清蛋白結合碘(Protein-Bound Iodine)含量(或許會降低)。
- (6)血或尿中葡萄糖量(通常只對葡萄糖無耐受性因素之病人)。

8.有下列醫療問題發生時，本藥之使用應小心考慮：

無尿症或嚴重腎功能不全(本藥無效，可能產生氮血症並引起蓄積效應)，糖尿病，曾有痛風者，肝功能不全，(由於脫水之危險可能導致肝昏迷及死亡)，高鈣血症，高尿酸血症，曾有紅斑性狼瘡(可能加重或活化)，胰臟炎，交感神經切除術(降血壓作用會增加)。老年人對於降血壓效應較為敏感，以及黃疸症嬰孩因有高膽紅素血症之危險應留意。

9.本藥應自最低有效劑量開始投與再徐徐增量，以防止電解質平衡失調及脫水。注意病人是否有體液和電解質不平衡的徵兆(如低鈉血症、血氯過少的鹼中毒、低鉀血症和低鎂血症)。病人大量嘔吐或接受靜脈輸注時應須特別檢測血清及尿液的電解質。體液和電解質不平衡的徵兆包括：口乾、口渴、虛弱、倦怠、思睡、不安、癲癇發作、心智混亂、肌肉疼痛或痙攣、肌肉疲勞、低血壓、少尿、心跳過快和胃腸不適(如噁心、嘔吐)。在長期治療或病人罹患嚴重肝硬化時，尤其採取快速的利尿方式時，本成分如同其它的強效利尿劑一樣會造成低血鉀症。低血鉀症會激發或增加毛地黃(Digitalis)的心臟毒性(如增加心室的不穩性)。利尿劑引起的低血鈉症通常是輕微和無症狀的，但少數病人的低血鈉症可能變嚴重且出現症狀，這類病人應立刻採取適當的治療。Thiazide類利尿劑可能減少尿鈣的排出，在沒有鈣代謝異常的情況下，Thiazide類利尿劑可能會造成間歇的和輕微的血鈣上升；在進行副甲狀腺功能測試之前，應先停止使用Thiazide類利尿劑。

10.服用本藥時應作下列檢測，用以監視用藥：

血中葡萄糖、BUN及血清尿酸量(最好治療前就開始)，血清電解質(長期治療病人特別是併用強心配醣體或系統作用Steroids或有嚴重壞死存在時尤其需要)。

11.為防止低血鉀症，服用本藥時，應使病人攝食含鉀較高之食物或與Spironolactone、Triamterene等具有保留鉀離子作用之利尿劑同用，以補救缺

失。

12.單一每日劑量最好在早晨服用，以使夜間解尿增加次數減至最低。如採用間歇投藥法可減低電解質不平衡或高尿酸血症之可能性。

13.本藥在長期使用病人其利尿效應只持續3-5天，此後便維持在平穩態。

14.本藥之抗高血壓效應可能治療後3-4天呈現，但達最適療效需時3-4週，停藥後降血壓效應仍可持續1週之久。

15.腎功能受損和/或氮血症：當Creatinine的廓清率低於30mL/min時，Thiazide利尿劑將失效。Hydrochlorothiazide會促發氮血症或其情形惡化，對於腎功能受損的病人，會產生藥物的累積作用。治療腎臟疾病時，如果氮血症增加和發生少尿症時，應停用利尿劑。

16.肝臟疾病：對肝功能受損或有進行性肝臟疾病的病人，應小心使用Thiazide類利尿劑，因為體液和電解質平衡的些微改變可能會加速肝昏迷的產生。

17.代謝：接受Thiazide治療時，某些病人會發生高尿酸血症或痛風惡化的情形。使用Thiazide會破壞對葡萄糖的耐受性，抗糖尿病藥品的劑量(包括胰島素)可能需作調整。使用Thiazide利尿劑治療可能增加膽固醇和三酸甘油脂的血中濃度。

【相互作用】

- 1.抗凝血劑與本藥共用後，會減低抗凝血作用，劑量應加以調節。
- 2.其他抗高血壓劑特別是Diazoxide或外科麻醉前誘導劑、麻醉劑、骨骼肌鬆弛劑等與本藥併用時藥效增強，劑量需作調整。
- 3.Amphotericin B、Corticotropin(ACTH)及Corticosteroid與本藥共用時，會增強電解質之不平衡，特別是低血鉀症。
- 4.本藥會升高血糖量，對成年才開始之糖尿病患者，使用本藥治療中及治療後，其劑量應作調整，但胰島素之需要量則可能增加、降低或不變。
- 5.本藥會增加鎂之排泄，引起低血鎂症。
- 6.鉀鹽與本藥共用時，會減低腎臟清除率，引起鉀中毒，宜避免共用。
- 7.Methenamine與本藥共用時，因本藥使尿液變成鹼性，以致降低其藥效。
- 8.強心配醣體與本藥共用，會增加與低血鉀症有關之洋地黃毒性。
- 9.Colestipol抑制本藥在胃腸道之吸收，應在Colestipol服用前一小時或服用後4小時，才可投用本藥。
- 10.當同時給藥時，下列藥品會與Thiazide利尿劑發生交互作用：

- (1)酒精、Barbiturates或麻醉性止痛劑—可能會增加站立性低血壓的發生。
- (2)抗糖尿病藥物(口服藥物和胰島素)—可能須調整抗糖尿病藥物的劑量。
- (3)其它抗高血壓藥物一具加成效應。在開始使用ACE抑制劑治療前的二至三天應停止使用利尿劑，以減少剛開始用藥時造成低血壓的可能性。
- (4)Cholestyramine和Colestipol Resins—陰離子交換樹脂會破壞Hydrochlorothiazide的吸收。
- (5)皮質類固醇、促腎上腺皮質素(ACTH)—加強電解質的排空。
- (6)升壓胺類(如腎上腺素)—可能降低升壓胺類的作用，但毋須排除使用該類藥物。
- (7)骨骼肌鬆弛劑、非去極化型(如Tubocurarine)—可能增加對肌肉鬆弛劑的反應。
- (8)鉀—利尿劑會降低鉀由腎臟排出，因而有鉀中毒的高度危險，不建議兩者併用。在使用鉀鹽製劑時，應注意參閱鉀鹽製劑內的說明書。
- (9)非類固醇抗發炎止痛劑(NSAID)—對某些病人，使用NSAID會降低利尿劑之利尿，促進鈉尿及抗高血壓的效果。
- (10)藥物/生化檢驗交互作用—因為會影響鈣的代謝，Thiazides可能會影響測試副甲狀腺功能的測試結果。

【副作用】

- 1.胃腸道系統—食慾不振、胃刺激、噁心、嘔吐、痙攣、腹瀉、便秘、黃疸(肝內膽汁鬱積性黃疸)、胰臟炎、咽喉炎。
- 2.中樞神經系統—頭暈、暈眩、感覺異常、頭痛、黃視症。
- 3.血液系統—白血球減少、顆粒性白血球減少、血小板減少、再生不良性貧血、溶血性貧血。
- 4.心臟血管系統—低血壓，包括站立性低血壓。
- 5.過敏—紫斑症、光線敏感、皮疹、蕁麻疹、壞死性血管炎、發燒、呼吸壓迫感(包括肺炎和肺水腫)、過敏反應、毒性表皮壞死。
- 6.代謝—血糖過高、糖尿、高尿酸血症、電解質失衡(包括低鈉血症及低鉀血症)。
- 7.腎臟—腎功能異常、間質性腎炎、腎衰竭。
- 8.其他—肌肉痙攣、虛弱、不安、暫時性視力模糊。
- 9.投與本藥如有下列副作用時應加留意：
口渴、心跳不規律、神志不安、肌肉痙攣、噁心、嘔吐、倦怠感或搏動微弱(電解質不平衡所致)，關節、腰窩或胃痛(痛風所致)、發疹、蕁麻疹(可能過敏反應)，喉痛及發燒(可能為顆粒性白血球缺乏症)，異常流血或瘀傷(可能為血小板過少症)，眼或皮膚變黃(可能為肝功能異常)。如有腹瀉、暈眩、皮膚對光線變得敏感。食慾不振、胃部不適等副作用持續時應特別注意。
- 10.過量時最常見的徵兆或症狀是由於利尿過度，造成電解質排出過多(低血鉀症、低血氯症、低血鈉症)和脫水所引起的。如果亦同時服用毛地黃，則低血鉀症可能加重心律不整。過量時，應探症狀支持療法。如果剛服用，則應催吐或洗胃。脫水、電解質失衡、肝昏迷和低血壓應採取適當的方法治療。如果需要，對於呼吸功能受損的病人，可給予氧氣或人工呼吸器。

【警語】

急性近視與續發性隅角閉鎖型青光眼：Hydrochlorothiazide是一種磺胺類藥物，會引起特異體質反應，導致急性短暫近視與急性隅角閉鎖型青光眼，症狀包括急遽的視力下降或眼部疼痛，通常發生在開始用藥後數小時至一週內。急性隅角閉鎖型青光眼若未加以治療，可能導致視力永久喪失，主要治療方式為儘快停止使用Hydrochlorothiazide。若仍未能有效控制眼壓，可能即需考慮立即尋求醫療或手術程序。引發急性隅角閉鎖型青光眼的風險因子，包括曾使用磺胺類或青黴素等藥物發生過敏之病史。

衛署藥製字第003388號

【儲存條件】

- 1.本品應包裝於緊密容器，儲於陰涼（15-30℃）且孩童不易取得處所。
- 2.2-1000錠瓶裝、鋁箔盒裝。



榮民製藥股份有限公司
Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.
447 Chunh Shan E.Rd., Sec.3, Chung-Li Dist., Taoyuan City, Taiwan, R.O.C
桃園市中壢區中山東路三段447號 Tel:(03)4651190
40412355 ©