



“瑞士”

降壓利尿劑

壓宜寧 錠

EAZIDE Tablets

本品是一種口服有效之利尿劑和降壓劑，作用力為 Hydrochlorothiazide 的 10~20 倍強，不僅具有利尿作用，同時對於心臟、肝臟、腎臟等疾患所引起之各種水腫，婦女經前緊張，以及使用其他藥物所引起之各種水腫尤具卓效。

本品口服後，迅速由胃腸吸收，2 小時後呈現利尿作用，6 小時達最高血中濃度，藥效可持續 24 小時以上。本品亦為高血壓預防與治療之理想良藥，藥性溫和，療效確實安全可靠，無論輕症重症，老病，新病之高血壓，均具卓效。

本品為一服兩得之藥劑，誠為醫藥界之一大貢獻。

【成份】

每錠含有 Trichlormethiazide.....2mg

【賦形劑】

Lactose、Starch、Food Color Red No. 6、Magnesium Stearate

【適應症】

利尿、高血壓。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

利尿劑用—初服量每日 1~2 片，早餐後服用，視病情可增至每日 4 片，維持量 1 日 1 片。降壓劑用—開始一日 1~2 片，一日服二次，然後一日服一次。小兒依年齡酌減用量。

【注意事項】

1. 長期大量服用本劑之患者，宜定期做血中尿中電解質測定，遇有高血糖多血尿之徵兆，暫停服用。
2. 年長體虛之患者，如慢性腎疾患，肝硬變，服用副腎荷爾蒙藥物引起之浮腫，長期服用本劑，應補給含多量鉀之食物，如桔子汁，或含鉀鹽之食物。
3. 使用本劑之妊婦宜謹慎，本劑可能對胎兒和新生兒有傷害。
4. 本劑與其他強力降壓劑併用時，產生相乘藥效，因此所併用之強力降壓劑之用量，通常減為半量。

【包裝】

2~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號