



糖尿病口服治療劑

DBT-006
衛署藥製字第04715號

“永信”

糖必鎮[®]
Diabetin[®]

錠

Tablets "Yung Shin"

3.98cm

自從Carbutamide推出應用於糖尿病口服治療劑以來，醫藥界便逐漸重視糖尿病的口服療法，但是Carbutamide有很多副作用，諸如對於腸內有益於平衡維他命的細菌產生攪亂作用，減少白血球及促成腎結石等症狀，這些都是美中不足的地方。經學者們精心研究和改進的結果發現了Glibenclamide。

Glibenclamide是Sulfonylurea的一種衍生物，口服治療糖尿病具有效果，其降低血糖之作用機序係作用於胰腺，刺激蘭格罕氏小島(Islets of Langerhans)中之 β -cell，而使其釋放胰島素(Insulin)，並促進其機能之活性化，因而可得到與胰島素相同的效果，並能確實降低血糖而無血糖過低之虞。

【成分】每錠中含：

Glibenclamide.....5mg

【賦形劑】

Microcrystalline Cellulose、Lactose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate。

【特徵】

1. 糖必鎮錠係Sulfonylurea類製劑，具有降血糖之作用。
2. 糖必鎮錠係作用於胰腺，刺激蘭格罕氏小島中之 β -cell，而使其釋放出胰島素，並促進其機能之活性化，因而降低血糖。故糖尿病患者體內胰腺產生胰島素之潛在力愈大則其效果愈佳，因此成年型糖尿病（尤其是肥胖型糖尿病）患者最適宜採用。
3. 糖必鎮錠口服二小時後，其血糖降低率達40%，且其作用可持續十二小時之久，藥效確實而持久。
4. 糖必鎮錠之毒性極微，學者們的臨床報告指出：以人之650倍最低有效劑量作狗的藥理實驗，發現其血液常規、血糖、尿液、電解質、尿素等均無異常現象。

【適應症】

成年型糖尿病。

【用法·用量】

通常一日量為1/2~3錠，分1~2次，於早、晚餐後立即服用。

通常開始治療時一日1/2錠，每隔3~5日檢查血糖及尿糖一次，如糖尿病情逐漸達到理想則可繼續以此劑量維持之，否則3~5日逐漸增加1/2錠，最多一日增加至3錠，超過此最大劑量多無更大之藥效。一般每日劑量在2錠以內時可於早餐後即時服用之，若每日超過2錠，則其超過之劑量應於晚餐後即時服用之。

【注意事項】

1. 糖必鎮錠可取代胰島素以治療糖尿病，若一向使用小劑量的胰島素者可完全以本藥取代之，若一向使用大劑量胰島素，則必須逐漸減少其用量而代以本藥，不可驟然完全以本藥取代之。
2. 少年型、不穩定型糖尿病患者，體內代謝機能障礙嚴重，有酸中毒趨向者，特別是已有糖尿病性昏迷症者忌服本藥。
3. 糖尿病併有嚴重之肝、腎機能障礙者，尤其因腎絲球體病變所引起者忌服本藥。
4. 服用本藥時若能兼顧及限制飲食，雙管齊下，則其效果更佳。
5. 服用本藥時若併用磺胺劑、抗結核劑、Phenylbutazone、Oxyphenbutazone，水楊酸製劑、Phenylamidol、Probenecid、抗凝血劑、M.A.O.阻礙劑以及酒精製劑等均可增強或延長本藥之效用，故應特別注意因血糖過低所可能引起之危險。
6. 孕婦或可能懷孕之婦女禁用本藥。
7. 本藥須由醫師處方使用。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

2~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140675