

衛署藥製字第 004963 號

中國化學

鹽酸四環素膠囊 Tetracycline HCl Capsules C.C.P.

綱號：B17

本劑由金鏈絲菌素(*Streptomyces aureofaciens*)產生出來之四環素所製成，經口服後，吸收迅速，短時間內在血液中即達到最高濃度，並維持 6 小時以上，由於本身無急性毒性作用，和具有廣療效之抗微生物活性，一般可有效地用來治療易感性微生物之感染症。

成分：Each Capsule contains：
Tetracycline Hydrochloride 250mg(力價)

作用：

本劑單獨使用或與他藥併用，可治療：膿腫，花柳性淋巴肉瘤腫，急性腸管阿米巴症，膿性腦膜炎，炭疽病，混合菌感染，桿菌性下痢，骨髓炎，菌血病，外耳或中耳炎，急性支氣管炎，百日咳，支氣管肺部感染，咽炎，急性布氏桿菌病(與其他抗菌藥品共同使用)，肺炎(有或無菌血症)，鸚鵡病，軟下疳，急性和慢性腎盂腎炎，白喉(與抗毒素和常規療法並行之)，落磯山斑疹熱，猩紅熱，亞急性細菌性心內膜炎，敗血病(葡萄球菌性和肺炎球菌性)，泌尿生殖器感染，淋病，竇炎，腹股溝肉芽腫(朵諾凡氏病)，柔軟組織感染，斑疹傷寒，扁桃腺炎，尿道炎(非淋菌性)。對四環素敏感較重要的微生物有：鏈球菌屬，志賀氏菌屬，葡萄球菌屬，立克次體屬，肺炎球菌屬，克雷白氏菌屬，淋病球菌屬，奈瑟氏菌屬。對四環素特別敏感的微生物有：流行性感冒嗜血桿菌，白喉桿菌，醃臘鏈球菌，大腸桿菌，肺炎雙球菌。

依醫師指示四環素可用於外科和牙科手術前後感染的預防，以及對盤尼西林過敏的梅毒病人，對無丙球蛋白或丙球蛋白缺少的病人和再感染的病人，必須同時施以丙球蛋白與抗生素(如四環素)治療，本劑即為此類病人的對症藥。四環素對於由普通變形桿菌或綠膿桿菌引起的全身性感染，非經常有效。

適應症：革蘭氏陽性、陰性菌，立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

用法和用量：本藥須由醫師處方使用。

成人口服劑量：成人每日平均劑量為 1gm 分成 4 次，每次 250mg。在餐後 1~2 小時或空腹時服用，在血液中可達較高濃度，但此種高濃度藥力並不易維持不變，所以成人每日劑量仍應保持 1gm，不可減少。病情較重的急性病人或服藥後 24 小時不見臨床反應的病人，應將服藥次數增至 6~8 次。在病症或熱度減退後，仍應繼續服藥 1~3 日，對某些疾病，則最好依照以往經驗用藥，如對急性葡萄球菌感染，須用藥 10~14 日。對於鏈球菌感染則用藥 10 日，以防止風濕性熱或血管球菌性腎炎的發生。對於亞急性細菌性心內膜炎則至少用藥 6 星期。臨床經驗尚未確定阿米巴症復發之頻率。治療較嚴重或嚴重的布氏桿菌病，照下述方法用藥可收宏

效：第一個星期，每日服用 4 次四環素，每次 500mg 並肌肉注射鏈黴素，每日 2 次，每次 1gm。在第二星期，每日服用 4 次四環素，每次 500mg，並每日肌肉注射鏈黴素 1 次，每次 1gm。第三個星期，則僅服用四環素每日 4 次，每次 500mg。臨床試驗指出每日 1gm 的劑量，對於大多數病症有效：如呼吸道感染、桿菌性下痢和其他感染等。孩童口服劑量：孩童全日劑量為每公斤體重 22~44mg，分成四等分，分 4 次服用。

副作用：副作用相當少見，僅佔 2.5%，當其發生時，可依醫師指示減少每次的口服劑量以緩和之。可能發生之副作用包括有：舌炎、胃炎、直腸炎、噁心、下痢、陰道炎和皮膚炎等。

注意事項：

1. 使用抗生素偶爾會引起無感染性微生物的過份繁殖，因此需時時對病人注意觀察，若在治療期間發現新感染時應採取適當措施。
2. 腸管對於四環素的吸收能力，會因同時服食高鈣含量的物質而減少，例如抗酸藥品，食物和乳品如牛乳等，為充分發揮治療效果，在服用後至少半小時內應禁食此類物質。
3. 遇有肛門不規則性發癢時，可於大便後或每日數次用清水洗滌肛門周圍，即能治療或預防。
4. 如遇腸胃不適時，可減少每次服用劑量而增加服用次數以緩和之，如此可以減少藥物對消化道的刺激程度。
5. 長期或大量服用本劑時，可能殺死過多之腸內寄生菌，因而不但將導致維他命的缺乏，且可能引起念珠菌的感染，因此長期服用本劑時，常同時服用 Nystatin 或 Amphotericin B 等抗真菌藥劑來抑制腸內念珠菌的成長。
6. 四環素在造骨組織可能生成安定的鈣化物，但此物對人類尚無不良反應的報告，在牙齒生長的時期(妊娠最後期，新生兒，幼兒期的初期時代)，服用四環素可能導致牙齒的變色(黃灰褐色)，這種現象，通常是服用長時期的藥物所致，但偶爾亦在短時期的服用後發生。
7. 如患者確有腎機能障礙時，一般口服或注射劑量亦可能發生藥物之過量蓄積引起肝臟中毒，如遇此種情況時，應投與日常用量以下之藥量，如行長期治療時，可做血清內四環素含量之檢定。

包裝：8~1000 膠囊盒裝，瓶裝。

賦形劑：

Lactose, Talc, Magnesium stearate
膠囊: Gelatin, Titanium dioxide, Sunset yellow FCF, Sodium lauryl sulfate, New cocine, Glycerin



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

