



"成大"止暈吐錠

Zhiyuntu Tablets "Chen Ta"

衛署藥製字 第 005045 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-07-25

本藥所含的各種成分，有著不同的作用相輔相成，可以用於旅遊時預防暈車、暈船引起的噁心嘔吐，另各成分簡介如下：

1. Meclizine HCl:作用在腦部中樞，發揮止嘔吐效果。
2. Chlorpheniramine Maleate:抗組織胺藥品。
3. Pyridoxine HCl:維生素B6
4. Caffeine Anhydrous:可以增加腦部的血液循環，具有興奮作用，減少因為其他成分引起的疲倦感。

1 成分

1.1 有效成分及含量

有效成分及含量：Each Tablets contains:

Meclizine HCl12.5mg

Chlorpheniramine Maleate1mg

Pyridoxine HCl2.5mg

Caffeine Anhydrous.....10mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Lactose、Magnesium Stearate、Potato Starch、Polyvinylpyrrolidone K-30、Sodium Starch Glycolate、Talc、Tartrazine。

2 用途(適應症)

預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 12 歲以下。

3.2.2 嚴重代謝性肝腎疾病的人。

3.2.3 曾經診斷有下列疾病的人:心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎臟病。

3.2.4 有呼吸疾病的人:如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.11 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 65 歲以上的人。

3.3.3 接受醫師治療並服用藥品的人。

3.3.4 服用鎮靜劑或安眠藥的人。

3.3.5 服用其他鎮暈藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥或抗過敏藥的人。

3.3.6 服用本藥若有不了解之處。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 不得與酒精性飲料併用。

3.4.5 可能引起嗜睡，勿駕車及操作危險性機械。

3.4.6 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

4 用法用量

年齡	用法用量
成人及12歲以上	預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前30~60分鐘服用之，一次二錠，一天服用一次。
12歲以下	請洽醫師診治。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
神經系統	思睡、倦怠感、興奮。
皮膚	發疹、發紅、癢疹。
其他	頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢、視覺上之困擾。

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

111.07.25

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

4~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

7 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

製造廠

成大藥品股份有限公司

台南市麻豆區南勢里關帝廟 8 0 號

藥商

成大藥品股份有限公司

台南市麻豆區南勢里關帝廟 8 0 號