

肌肉弛緩劑

舒肉筋新®錠

Solaxin® TABLETS

組成

本劑1錠中含有200mg chlorzoxazone 之淡橙黃色錠劑。
賦形劑包括: corn starch、gelatin、methyl cellulose、calcium carboxymethylcellulose、talc、dioctyl sodium sulfosuccinate, food yellow No. 5 aluminum lake。

適應症

肌肉緊張症、急性腰痛、脊椎間板症候群及脊髓炎痙攣、神經肌肉之機能異常等所伴生有肌痙攣、強直之諸疾患。

用法・用量

通常成人1 次200~400mg chlorzoxazone (1~2 錠)，1日3~4次口服。
又依年齡及症狀，劑量適宜增減。
本藥須由醫師處方使用。

使用之注意事項

- (1)下列之病人不要使用
對本品有過敏病歷之病人。
- (2)下列之病人要慎重使用
肝、腎障礙之病人。
- (3)副作用
1)過敏症
出現發疹、搔癢感等之過敏症狀時，停止使用。
2)精神神經系統
有思睡、眩暈、蹣跚、倦怠感之症狀出現時，則需做減少用量或停藥等適當的處理。
3)肝臟
偶而會引起肝功能障礙，故要充分觀察，認為有異常時，要停止使用。
4)消化系統
有出現噁心及嘔吐、胸悶，胃不消化，胃部不快感、下痢、便秘、心窩部疼痛及胃痛等症狀。
(4)乳兒及小兒、孕婦及授乳婦之使用
對於懷孕中之使用及乳兒，小兒使用之安全性尚未確立，故在孕婦或有可能懷孕之婦女，乳兒及小兒之使用，若判斷其治療上之有益性大於其危險性時才可使用。
還有，最好不要使用在授乳中之婦女。
(5)相互作用
與下列之藥品併用或喝酒會產生互相加強作用，因此最好單獨使用。不得已須併用時得要注意減量。
Phenothiazine 類藥品、barbituric acid 衍生物等之中樞神經抑制劑、MAO 阻害劑。
(6)其他
1)會引起思睡、及引起注意力、集中力及反射運動能力等之低下，因此對於服用本劑之病人，要特別提醒他們像開車等機器之操作所可能產生之危險性。

1986.4/77.1

Chlorzoxazone 能改善對於腰痛症、頸肩腕症候群、肩關節周圍炎、變形性脊椎症等所導致有痛性收縮之症狀（肌肉之痙攣，強直及緊張症狀），幫助所失去之運動性的恢復之服肌肉鬆弛劑。

- 2)因為其代謝產物，有時尿會變為橙色。
(7)室溫保存

藥效藥理

- 1.選擇性地抑制多突觸反射
對於骨骼肌之收縮，脊椎反射有很大之關連。從脊髓至骨骼肌之興奮，有單突觸反射與多突觸反射，肌肉之收縮特別是由多突觸反射之亢進而引起。本藥作用於脊髓之神經細胞，選擇性地抑制多突觸反射而對肌肉之異常收縮現象產生鬆弛作用。
- 2.不作用於單突觸和腦幹
由於本藥通常之臨床用量不抑制單突觸反射，故不影響正常的肌肉機能。
而且對腦幹幾乎不產生作用，對精神及神經系統、呼吸系統、循環系統等機能之影響比較少。

臨床適用

- 1.臨床效果
本劑對於伴有肌肉收縮之背部疼痛、頸肩腕症候群及肩關節周圍炎等症狀已被確認其有效性。
- 2.副作用及臨床檢查值之變動
總病例3,572 例中有199例(5.57 %)發生副作用之報告，主要之副作用是胃腸障礙33例(0.92 %)、嘔氣16例(0.45 %)、胃痛14例(0.39 %)等，消化系統症狀104例(2.91 %)，還有眩暈34例(0.95 %)，睏倦感19例(0.53 %)及神經症狀91例(2.55 %)。
另外沒有因投與本劑所產生臨床檢查值變動的報告。

非臨床試驗

1.急性毒性 LD ₅₀ (mg / kg)				
動物	性別	經口	皮下	腹腔內
小鼠	♂	>5,600	>8,000	680
	♀	>5,600	>8,000	510
大白鼠	♂	6,000	>8,000	190
	♀	5,100	1,850	240

- 2.亞急性毒性
給予雌雄大白鼠chlorzoxazone 500 mg/kg/日，經口投與1個月，與對照群比較結果如下：
(1)攝食量、體重增加量無差別。
(2)腦、肺、心、腎之臟器重量不變，但投與群之肝臟重量稍大，有導致肝障礙誘發之可能性。
(3)血液學的、組織學的資料並無差別。

(請接背面)

This Artwork is property of : Eisai Taiwan Inc.

Type: Circular	Regular Color K C M Y Special Color (PANTONE) 金紅
Product name: 舒肉筋新	
Item code: F011231012	WARNING: Proof color may not reflect true Pantone color. Artworks may not be altered.
Printing order: 12	
Pharma code:	
Size: 140x240 mm	
Date(mm/dd/yy): 05/07/15	
Long Yih Printing Company TEL : (02) 77091988 0935874015	

性 質

1.製劑之性質

本劑有苦味，微有收斂性之淡橙黃色之裸錠。

販賣名	識別號	正面	背面	側面
舒肉筋 新 錠	EISAI SO200			


2.關於有效成分之物理化學資料

一般名：Chlorzoxazone

化學名：5-Chloro-2-benzoxazolinone

分子式：C₇H₅ClNO₂

分子量：169.57



物理化學之性質：

Chlorzoxazone 是白色~淡黃色之結晶或結晶性粉末，無臭無味，稍微刺激舌頭。易溶於dimethylformamide，可溶於甲醇及酒精及acetone，略溶於乙醚，幾不溶於水。

融點：188~192°

取置上之注意

〔貯存〕 保存於密閉容器。

包 裝

舒肉筋新錠……………6~1000 錠盒裝及瓶裝。

衛署藥製字第005813 號

製造廠：保瑞藥業股份有限公司
台南市官田區工業西路54號

委託者：衛采製藥股份有限公司
台北市長安東路一段18號9樓



F011231012

Item Code