

胰膽道鎮痙劑

可使保朗[®]膠囊

(Flopropione 製劑)

Cospanon[®] CAPSULES

衛署藥製字第005954號

【組成】

1 粒中含有40 mg flopropione 之暗紅色與淡黃褐色之硬膠囊。(JAN, INN)

賦形劑包括: talc, corn starch及microcrystalline cellulose。

【產品描述】

商品名	劑型 識別碼	外觀		
		表面	背面	側面
可使保朗 [®] 膠囊	硬膠囊	CS40 € 3 0H € 3 0		
	CS40 €	直徑 (mm) 15.9	重量 (mg) 231	規格 NO.3
描 述				
膠囊 膠套：暗紅色。 膠龍：淡黃褐色。 內容物：白色~微黃褐色之粉末。				

【適應症】

緩解膽道疾病（膽石症、膽囊炎、膽管炎、膽割除後遺症等）所引起的痙攣性症狀。緩解胰臟炎所引起的痙攣性症狀。

【用法、用量】

通常成人一次口服1 - 2粒（40~80 mg 的 flopropione），1日3次，飯後服用。

本藥須由醫師處方使用。

【使用時注意事項】

謹慎用藥（COSPANON[®]需謹慎投與於下列患者）

對本品之任何成分有過敏病史的患者。

【給高齡者的投與】

由於老年人通常具有生理性機能不足，建議於謹慎的監測下酌量降低服用的劑量。

【給孕婦、產婦、授乳婦的投與】

本品對懷孕婦女之安全性尚未確立（無臨床使用經驗）。

【給兒童的投與】

本品對兒童之安全性尚未確立（無充分的臨床經驗）。

【不良反應】

總數4,273個病例中有194例（4.54 %）的不良反應報告（在不良反應發生率調查結束時）。


	5% >	≥0.1%
胃腸道	噁心 / 嘔吐、心灼熱及腹部飽滿感	
過敏症 ^(註)	發疹	

^(註)若有類似症狀發生時，應停止用藥。

【藥物動力學】

投與12位健康男性自願者單一劑量之flopropione^(註) 240 mg，按時間經過測定血漿濃度中未變化之 flopropione 的量。在投藥約1小時後，血漿中濃度顯示最高值約9 μg / mL，以後漸減，24小時後幾乎從血漿中消失。

^(註)單一劑量（240mg）尚未被核准使用。



口服COSPANON[®]膠囊後的血中濃度變化

【藥理學】

1.抑制COMT 所產生的鎮痙作用

在狗、天竺鼠及大白鼠的試驗中顯示，flopropione 能緩解消化管平滑肌、胰膽道及尿路系統平滑肌收縮之痙攣作用。其作用機轉是基於抑制COMT (catechol-o-methyl – transferase)所引起之腎上腺性作用與抗serotonin作用^(1,2)。

2.Oddi氏括約肌之機能異常改善作用

以靜脈注射投與flopropione 4 , 8 , 16及32mg/ kg 的劑量給狗，每一種劑量皆可放鬆Oddi氏括約肌，促進膽汁及胰液排出至十二指腸，降低胰膽道內壓⁽³⁾。

This Artwork is property of : Eisai Taiwan Inc.

Type: Circular	Regular Color K C M Y
Product name: 可使保朗膠囊	
Item code: F020631011	Special Color (PANTONE) 紅色
Printing order: 1	
Pharma code:	WARNING: Proof color may not reflect true Pantone color. Artworks may not be altered.
Size: 140x240 m/m	
Date(mm/dd/yy): 05/19/15	
Long Yih Printing Company TEL : (02) 77091988 0935874015	

【臨床試驗】**臨床效果**

- 1.以具有慢性腹痛、噁心、食慾不振之膽胰症患者為對象之雙盲試驗中，本品已證實其有效性⁽⁴⁾。以膽道運動失調、膽石症、膽囊炎、膽囊切除後遺症、胰炎和尿道結石的患者為對象，觀察鎮痙效果之雙盲試驗和開放試驗中，於1,036 病例中證實其有效性。
- 2.關於本品促進尿管結石排出的效果，設置對照組來比較檢討。本品在初始投與後的20, 30, 60, 90 及120 天（第10天例外）累積的排出速率優於對照組，且其作用具有顯著的統計學意義⁽⁵⁾。

【物理化學性質】


一般名：Flopropione (JAN, INN)

化學名：1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl) propan-1-one

分子式：C₉H₁₀O₄

分子量：182.17

構造式：

**描述：**

Flopropione 為白色~微黃褐色之結晶性粉末。本品無臭、有苦味。本品極易溶於N,N-dimethylformamide，易溶於甲醇、酒精（99.5）及乙醚，並且幾乎不溶於水。

融點：177~181℃

【保存期限】

應在包裝盒所標示之保存期限內使用。

【貯存】

30℃以下儲存。開封後應避濕保存。

【包裝】

可使保朗®膠囊.....6~1,000 粒鋁箔盒裝及塑膠瓶裝。

【參考文獻】

- 1) Inoue S. et al.: Modern clin., 1, 764, 1967.
- 2) Ichikawa S. et al.: Jpn. J. Smooth Muscle Res., 4, 151, 1968.
- 3) Katsui, G. et al.: Pharmacometrics, 3, 113, 1968.
- 4) Miyoshi A.: Jpn. Arch. Int. Med., 14, 79, 1967.
- 5) Murata S. et al.: Nishinippon J. Urology, 37, 157, 1975.

製造廠：保瑞藥業股份有限公司
台南市官田區工業西路54號



委託者：衛采製藥股份有限公司
台北市長安東路一段18號9樓

F020631011

Item Code