


紙張尺寸：10X19公分

榮民 **氯宗酒腓錠** 250毫克
Chlorzoxazone Tablets "VPP" 250mg

Chlorzoxazone為一中樞作用性骨骼肌鬆弛劑，其結構式為：



主 成 分：每錠含：Chlorzoxazone.....250mg
本品含賦形劑 Powdered Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Erythrosine Aluminum Lake、Talc、Hypromellose 與 Povidone K-30。

適 應 症：肌肉痙攣。

藥理作用：1.本藥之準確作用機轉尚未完全明瞭，主要作用在脊髓階層與大腦皮質下層區域，並且抑制多胞突觸絡之反射。其骨骼肌鬆弛特性可能與其中樞神經抑制（鎮靜）效應有關。

2.本藥口服後1小時內產生藥效並可持續3-4小時。

3.本藥血漿半生期為66-170分鐘。

4.本藥口服後，可迅速的從胃腸道吸收，並經肝臟代謝。最後主要以結合型代謝物由腎臟排泄。

注意事項：1.妊娠期與哺乳婦女使用本藥之安全性尚未確立，應就其使用上之危險與效益加以考慮。

2.下列藥物與本藥合用時，藥效會相互增強：

酒精、全身麻醉劑、其他中樞神經系統抑制劑、MAO抑制劑及 Tricyclic antidepressants。

3.有下列醫療問題時，本藥之使用應小心考慮：

(1)曾有過敏反應。(2)肝功能受損。

4.服用本藥如有下列副作用時應加留意：

(1)血便或黑便（胃腸出血）。(2)皮膚紅疹或搔癢（過敏反應）。

(3)喉痛及發燒（粒性血球過少症）。(4)異常疲倦或虛弱（貧血）。

(5)眼睛或皮膚發黃（肝炎）。

如有眩暈、嗜睡、便秘或腹瀉、頭痛、胃灼熱、頭昏眼花、噁心或嘔吐、胃痙攣、異常興奮或神經過敏等副作用持續發生時，也應特別注意。

5.服用本藥期間應戒酒及避免服用其他中樞神經系統抑制劑。

6.服用本藥期間，若有嗜睡或眩暈發生時，須特別注意。

7.服用本藥會使尿液呈橘色或紅紫色。

用法・用量：本品可研碎後與食物或液體一起服用。

一般成人劑量：口服，1-3錠，一天3-4次。

一般兒童劑量：口服，每公斤體重20mg或每平方公尺體表面積600mg，分3-4次服用。或125-500mg，一天3-4次。

本藥須由醫師處方使用。

包裝・貯藏：1.本品應包裝於緊密容器，貯於陰涼（15-30℃）乾燥處所。

2.6-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第007140號



榮民製藥股份有限公司

Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.

桃園市中壢區中山東路三段447號 Tel:(03)4651190

40410700④