

【仿單】 W 95 mm × H 205 mm

“福元”得達息糖衣錠 10 毫克
Dettacks S.C. Tablets 10mg “F.Y.”

本藥須由醫師處方使用 衛署藥製字第 007944 號

【成 分】每錠中含有：

Scopolamine Butylbromide 10.0 mg

賦形劑：Lactose、Hydroxypropyl Cellulose、Synthetic Silica、Corn Starch、Microcrystalline Cellulose 101、Magnesium Stearate、Shellac、Sucrose、Calcium Phosphate Dibasic、Talc、Gelatin、Acacia、Tartrazine、Carnauba Wax、Alcohol 95%、Water Purified。

【適 應 症】

胃、十二指腸潰瘍、胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管尿路痙攣。

【用法用量】

普通成人一次 1～2 錠，一日服用 3～5 次。

【注意事項】

由於會引起視力調節障礙、思睡等，投與中的患者對開車等伴隨有危險性的機械操作應注意。

【禁 忌】

對本劑曾有過敏症之患者，青光眼患者，前列腺肥大排尿困難患者，重症心疾病之患者。

【副 作 用】

1. 眼 睛：偶有視力調節障害等現象。
2. 消 化 道：偶有口渴、腹部膨滿感、鼓腸、便秘等現象。
3. 泌尿系統：偶有排尿障害出現。
4. 精神神經系統：偶有頭痛、頭重感等現象。
5. 過 敏 症：偶有發疹等現象出現，停藥即可。
6. 孕婦投與：懷孕中投與之安全性尚未確立，懷孕及可能懷孕之婦女投與本劑時宜先衡量其利弊得失。
7. 藥物相互作用：與下列各藥併用會增強本劑之作用(三環抗抑鬱藥 Phwnorhiazine 類藥，MAO 抑制劑，抗組織胺劑)。

【慎重投與】

前列腺肥大患者，鬱血性心不全之患者，不整脈之患者，潰瘍性大腸炎之患者，甲狀腺機能亢進症之患者。

【儲藏條件】請貯存於 25℃ 以下之陰涼處，且於期限內使用。

【包 裝】6～1000 錠塑膠瓶裝。

LT-SCT010

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號