

支氣管擴張・鎮咳劑

“豐田” 抑喘錠

Tramezin Tablets “Honten”

【成分】 Each tablet contains :

DL-Methylephedrine HCl.....30mg
賦形劑：Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, New coccine, Tartrazine, Magnesium stearate, Aerosil, Lactose monohydrate。

【性狀】

本劑之主要成分係無色結晶或白色之結晶性粉末，無臭、苦味，易溶於水，可溶於酒精，不溶於乙醚，水溶液(1:20)無旋光性，融點約為 207~211℃。

【作用】

本劑之主要作用與 Ephedrine 相同，即刺激交感神經而具有使氣管平滑肌之弛緩擴張作用，對於因 Acetylcholine, Histamine 而引發 marmot 摘出氣管肌之收縮以及因 Acetylcholine 而誘導狗之支氣管痙攣，具有與 Ephedrine 相同程度之緩解作用。除支氣管擴張作用之外，對於因機械性或化學性刺激所致之咳嗽，具有 Codeine 一半強度之中樞性鎮咳作用，又具有 Anaphylaxis 之抑制，抗 Histamine，抗 Acetylcholine 以及好酸球減少等抗過敏性作用，另外，因刺激交感神經所致之血壓上昇，心收縮力增強以及心拍數增加作用則比 Ephedrine 弱。

【適應症】

支氣管氣喘，由支氣管收縮引起之咳嗽。

【用法用量】

通常成人 1 日劑量為 5 錠，每次服用 1~2 錠，兒童依年齡遞減。

本藥須由醫師處方使用

【注意事項】

1. 一般之注意：
 - (a) 確實依照用法用量使用，如無效果，應即停止使用，小兒投與時，應按照正確使用法指導之，並應隨時注意觀察。
 - (b) 連續過量使用時，會引起不整脈，有時有心跳停止發生，應特別注意。
2. 慎重投與：
 - (a) 甲狀腺機能亢進症
 - (b) 高血壓
 - (c) 心疾患
 - (d) 糖尿病
3. 副作用：
 - (a) 循環系統：偶有心悸亢進，顏面蒼白等症狀發生
 - (b) 精神・神經系：偶有頭痛、熱感、罕有不眠、眩暈、神經過敏、疲勞等症狀發生
 - (c) 胃腸：偶有嘔心、食慾不振、腹部脹滿感等症狀發生
 - (d) 過敏症：發疹等過敏症狀發生時應即停用
 - (e) 其它：偶有口渴現象發生
4. 相互作用：
 - (a) 與下列藥劑併用時可能作用增強，應減量慎重投與：Monoamine 氧化酵素阻害劑、甲狀腺製劑 (Thyroxine、Liothyronine 等)。
 - (b) 與 Epinephrine 及 Isoproterenol 及 Catecholamine 等併用時會引起不整脈，有時有心跳停止發生，應避免使用。
5. 遮光保存。

【貯存】

請置於 25℃ 以下貯存。

【包裝】

10~1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。



委託者：豐田藥品股份有限公司

台灣新北市三重區五華街 7 巷 87 號



製造廠：應元化學製藥股份有限公司

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL:(06)2654883 (代表號)