



“榮民”安比西林膠囊500毫克 Ampicillin Capsules 500 mg “VPC”

衛署藥製字 第 009609 號

須由醫師處方使用

版本日期 2023-01-11

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每膠囊含

Ampicillin Trihydrate 500 mg (Potency)

1.2 賦形劑

本品含賦形劑Magnesium Stearate、Talc、Hard Gelatin Capsule (Hard Capsule含成分Gelatin、

Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Tartrazine)。

1.3 劑型

膠囊劑

1.4 藥品外觀

本藥為白色粉末充填於紅灰色0號膠囊中，膠囊體為灰色，印有白色字“402”，膠囊蓋為紅色，印有白色圖樣



2 適應症

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

空腹時(飯前1小時或飯後2小時)服用。

一般成人劑量：口服，每6小時250 mg ~ 500 mg，一天最高限量為6 g。

【注意】淋病治療時，以本藥3.5 g與1 g Probenecid作單劑量服用。

3.3 特殊族群用法用量

一般兒童劑量：口服。

嬰兒及體重20公斤以下之兒童：每公斤體重12.5 mg ~ 25 mg，每6小時1次，或每公斤體重16.7 mg

~ 33.3 mg，每8小時1次。

體重20公斤及20公斤以上兒童：同一般成人劑量。

【注意】有些嬰兒及兒童每日劑量需高達每公斤體重200 mg，分次服用，依感染之類型及嚴重性而定。

4 禁忌

目前尚無資訊。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 對任何其他青黴素，青黴素衍生物或Cephalosporin有過敏反應的病人，對本藥亦會起過敏反應。

5.1.2 嚴重類過敏性反應(Anaphylactoid Reaction)時應立即用Epinephrine急救，並給予氧氣，靜脈注射Steroids且保持呼吸暢通。

5.1.3 本藥治療期中應注意黴菌性及病原性細菌重覆感染(Superinfection)之可能性，遇此情況應即停藥，並採取適當的取代療法。

5.1.4 長期使用本藥時，應定期評估器官系統功能，包括腎臟、肝臟及造血系統。

5.1.5 曾患一般性過敏反應(氣喘、濕疹、乾草熱及蕁麻疹)者，本藥之使用應加留意。

5.1.6 對A組 β -溶血性鏈球菌感染之治療至少應持續十天，用以協助防止急性風濕熱之發生。

5.4 實驗室檢測

5.4.1 本藥會使SGOT升高而干擾診斷試驗。

5.4.2 本藥會干擾尿中葡萄糖之硫酸銅試驗法，呈現偽陽性反應，但葡萄糖酵素試驗法則不受影響。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

本藥對孕婦之安全性尚未確立，應就其使用上之危險與效益加以考慮。

6.2 哺乳

本藥可排泄於乳汁，哺乳母親使用時，應就其危險與效益加以考慮，因為可能引起嬰兒之過敏。

6.7 腎功能不全

6.7.1 嚴重腎功能受損者，本藥之使用應加留意。

6.7.2 除腎功能嚴重受損者外，一般腎功能不良者，通常不需減少劑量。

7 交互作用

7.1 本藥與Allopurinol共用會有增加皮膚紅疹之可能，特別是對血尿酸過多之病人。

7.2 Probenecid與本藥共用時，會減低本藥之腎小管分泌，使其血中濃度及/或毒性升高及延長。

7.3 制菌劑如四環素會干擾在腦膜炎或其他需要迅速殺菌效應之情況下的殺菌效力，最好避免同時使用。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

如有下列副作用時應加留意：蕁麻疹、發癢、紅疹或哮喘(過敏反應)。

如有腹瀉、噁心及嘔吐持續發生時亦應留意。

9 過量

目前尚無資訊。


10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

10.2.1 Ampicillin為一半合成之抗生素，是青黴素之衍生物，具有廣效性抗菌活性，對青黴素有感受性之革蘭氏陽性及陰性細菌均有殺滅功效。其化學結構式為：



10.2.2 本藥在胃酸存在下仍然安定，從胃腸道之吸收良好，且易擴散到身體大部分組織與體液中，但腦部及脊髓液之穿透則只在腦脊髓膜發炎時發生。

10.2.3 大多數病人對本藥均有良好之耐受性。

10.2.4 體外試驗上，下列細菌對Ampicillin均具敏感性：

革蘭性陽性菌：溶血及非溶血性Streptococci，D. pneumoniae非青黴素酶生成性之Staphylococci，Clostridia spp.，B. anthracis，Listeria monocytogenes

，以及大多數的腸球菌(Enterococci)。

革蘭性陰性菌：H. influenzae，N. gonorrhoeae，N. meningitidis，Proteus mirabilis及

Salmonella，Shigella與E. coli等。

10.2.5 本藥無法抵抗青黴素酶之破壞，因此對會產生青黴素酶之細菌無效。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

11.1 本藥主要以未變化之原型藥排泄於尿液中，與Probenecid共用時排泄會遲延。

11.2 本藥之活性型(Active Form)出現於膽汁的濃度要比其在血清中為高。

11.3 本藥平均大約有20%是與蛋白質結合，比其他青黴素(60%~90%)來得低。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4~1000粒瓶裝、鋁箔盒裝。

112.01.11

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

儲存於25°C以下。

13.4 儲存注意事項

13.4.1 包裝於緊密容器。

13.4.2 儲存於乾燥處所。

製造廠

榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路3段447號

藥商

榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路3段447號