

10. Dipyridamole 的特性使其作用類似血管擴張劑。對患有嚴重之冠狀動脈疾病患者應小心使用，包括不穩定性心絞痛病人、最近發生心肌梗塞者、左心室流出閉塞(left ventricular outflow obstruction)或血行力學的情況不穩定者(如代償機能衰敗造成之心衰竭)。已規則口服 dipyridamole 的病患，不應再接受靜脈注射之 dipyridamole。

11. 本藥使用於重症肌無力患者時，如改變 dipyridamole 之劑量，可能需要調整治療。

12. 曾報告在少數病例發現膽結石內含有不同程度之未結合(unconjugated)的 dipyridamole(最高者佔結石之乾燥重量的 70%)。這些都是年老的病人，而且有上行性細膽管炎(ascending cholangitis)，且都已接受口服 dipyridamole 治療多年。無證據顯示 dipyridamole 是引發這些病人結石的因素。其可能的機制是細菌使膽汁內已結合之 dipyridamole(conjugated dipyridamole)進行去尿酸化作用(deglucuronidation)，而使得膽結石內出現 dipyridamole。

【交互作用】

1. Heparin 與本藥共用時，會增加出血之危險；與 Xanthin derivation(如 theophylline、caffeine 衍生物)合用時，其血管擴張作用可能會被減弱。

2. Dipyridamole 會增加血漿中腺核苷(adenosine)的濃度及加強 adenosine 對心臟的作用。二者併用時，應考慮調整 adenosine 的劑量。

3. 當 dipyridamole 和抗凝血劑及 acetylsalicylic acid 併用時，應小心觀察是否出現這些藥物所敘述之藥物不耐性(intolerance)及危險性(risks)。於 acetylsalicylic acid 之劑量再併用 dipyridamole，不會增加出血的危險。Dipyridamole 與 warfarin 併用時，出血之頻率或嚴重性不會比單獨使用 warfarin 時嚴重。

4. Dipyridamole 可能會增強降血壓藥物的降壓作用。Dipyridamole 可能會對抗膽鹼酶抑制劑(cholinesterase inhibitors)的抗膽鹼酶作用(anticholinesterase effect)，故使得重症肌無力症惡化。

【副作用】

劑量增加時，如有下列副作用，如：眩暈、頭昏眼花、昏厥、面紅、頭痛、噁心、嘔吐、皮膚疹、胃絞痛或虛弱等持續時，應予醫療照應。

在治療劑量下，本藥之副作用通常是暫時且輕微。曾觀察到的副作用包括嘔吐、腹瀉及下列症狀如眩暈、噁心、頭痛、肌痛。長期以 dipyridamole 治療時，這些副作用通常會消失。

由於其血管擴張作用，dipyridamole 可能會造成低血壓、熱潮紅(hot flushes)及心搏加速。在極少數病例曾觀察到冠狀動脈心臟病的症狀惡化。

極少數之病例發生手術中或手術後出血增加的情形。

血小板減少症的個案曾被報告與使用 dipyridamole 有關。

曾觀察到 dipyridamole 混雜於膽結石中。

【貯存】

請放置於 25℃ 以下貯存

【包裝】

24~1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。



委託者：豐田藥品股份有限公司

台灣台北縣三重市五華街 7 巷 87 號



製造廠：應元化學製藥股份有限公司

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL:(06)2654883 (代表號)