



華興製藥

痛風發作之緩解藥

“華興” 可爾信 錠 *Conicine Tablets “H.S.”*

衛署藥製字第 09987 號

《成份》

每錠含：Colchicine.....0.5mg

《賦形劑》

Lactose、Starch、Magnesium Stearate、Talc、Tartrazine、Brilliant Blue FCF、Polyvinyl Pyrrolidone K-90。

《適應症》

痛風。

《用法用量》

通常成人一次 1 錠，每二小時 1 次，一日 6 至 8 次服用。依病症適宜增減之。
本藥須由醫師處方使用。

《注意事項》

- 一、若有虛弱、厭食、噁心、嘔吐或下痢現象時，需減少劑量。
- 二、對懷孕婦女可能造成胎兒的傷害；懷孕用藥級數：D 級。
- 三、授乳期是否會分泌母乳中，尚未確立。
- 四、兒童安全性及有效性尚未確立。
- 五、老年人及衰弱病患；尤其是患有肝、腎、腸胃或心臟疾病患者需小心使用。
- 六、可能改變迴腸黏膜功能而引起可逆性 Vitamine B₁₂ 吸收不良。
- 七、增加中樞神經抑制劑敏感性和加強擬交感神經作用劑的反應。

《副作用》

- 一、腸胃方面可能出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉，尤其是使用高劑量。
- 二、長期使用可能造成骨髓抑制伴隨再生不良性貧血，顆粒性白血球缺乏症或血小板過低症；周邊神經炎、掉髮也曾被報導過。
- 三、在一般投與劑量下，也曾發生肌病變，尤其是腎衰竭者。

《禁忌》

- 一、對 Colchicine 過敏患者。
- 二、嚴重胃腸、腎、肝或心臟疾病患者。

《儲存》

儲存於 25°C 以下。

《包裝》

12~1000 錠瓶裝及鋁箔盒裝。

本品代號：Conicine 003

華興化學製藥廠股份有限公司
彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號
服務專線：(04)8832121~6