



腎上腺皮質荷爾蒙製劑

DCT-004
衛署藥製字第10168號
Code No.:38161

“永信”

特佳
Decan

錠

Tablets "Yung Shin"

3.98cm

1936年Reichstein由腎上腺皮質抽出結晶性之Steroid Corticosterone而為腎上腺皮質荷爾蒙的研究開創了新的紀元，以後各國學者紛紛致力於這方面的探討，因此迭經改良的製品有如雨後春筍地逐年應市，如Cortisone(1949)・Hydrocortisone(1952)・Prednisone・Prednisolone(1995)・Methylprednisolone(1956)・Triamcinolone(1957)等是。1958年推出之Dexamethasone為這一類製劑中之佼佼者，係Prednisolone之同族體，在9 α 位置導入氟原子及16 α 位置導入甲基之新衍生物。

【成分】每錠中含：

Dexamethasone.....0.75mg

【賦形劑】

Lactose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate。

【特徵】

本藥之作用安全：

1. 本藥無鉀鹽之過度損耗，亦不引起鈉鹽及水分之滯留，因此不會有浮腫之現象。精密的新陳代謝試驗顯示，即使將一日劑量增加到5倍之多，其血鉀的濃度仍維持原狀，故服用期間內不需限制食餌（鈉之攝取量），亦無需特別補充鉀質。
2. 本藥之抗炎症、抗風濕及抗過敏性的效力雖然增加了30倍之多，但它對血糖的作用並未增加，故無一般類固醇製劑之誘發糖尿病作用，糖尿病患者服用本藥時也無需增加胰島素之劑量。

【適應症】

急性風濕熱、風濕性關節炎、急性痛風性關節炎、支氣管氣喘、血清病、散播性紅斑性狼瘡、結節性動脈周圍炎、過敏性皮膚炎、天皰瘡、關節囊炎、肌炎、纖維肌炎、炎症性眼疾。

【用法・用量】

通常成人每次0.75mg，一日2~4次，於每食後及就寢前或朝夕服用之，症狀好轉之後每隔4~5天，其一日劑量減輕0.25~0.5mg，直減至最低維持量或症狀完全消失為止。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

（一）一般注意：

1. 本品突然停藥時，可能導致續發之腎上腺皮質素分泌不足，此時應給予患者補充腎上腺皮質素。
2. 本品服用期間可能會遮蔽某些感染症狀，降低患者的抵抗力；及影響nitroblue-tetrazolium試驗之結果。
3. 本藥可能與延長昏睡時間及較高發生率之肺炎、胃腸出血現象有關。
4. 患有阿米巴病及潛伏期患者宜小心使用本藥。
5. 本藥若長期治療時，可能會損害視神經導致白內障、青光眼及黴菌或病毒之感染。

（二）對下列患者宜慎重投與之：

1. 肺結核患者。
2. 心臟衰竭患者。
3. 糖尿病患者。

（三）禁忌症：

1. 全身性真菌感染。
2. 對本藥過敏之患者。

（四）副作用：

1. 體液及電解質：鈉、水滯留、鉀流失。對感受性患者可能會導致鬱血性心臟衰竭。
2. 胃腸：偶有胃、十二指腸潰瘍及出血現象，特別是對於伴有發炎症腸疾患之病人。
3. 皮膚：可能會影響受損皮膚之癒合，並出現瘀斑、紅斑及排汗增加等現象。此外可能會影響皮膚測試之結果。
4. 神經方面：偶有痙攣病例發生，及暈眩、頭痛等情形。
5. 內分泌：可能有月經週期不規則、抑制兒童發育情形及降低患者對藥的耐受性，因此糖尿病患者服用期間須增加Insulin或口服降血糖藥之劑量。

（五）孕婦投與本藥之安全性尚未確立，故孕婦及可能懷孕的婦女，宜衡量其利弊再行投與之。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

4~1000錠瓶裝、盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140683