

利尿降壓劑
泌排特®錠
Behyd® Tablets
ベハイド錠

「泌排特」是心、腎、肝、內分泌、營養性、神經性等障礙引起之浮腫，對於水份及 Na^+ 有強制排泄療效，而同時產生血壓降下作用，又與易引起直立性低血壓，便秘，口渴，視力障礙等副作用之神經節遮斷劑或與會引起精神抑鬱，嗜眠，鼻塞之 Reserpine 等藥劑併用時，可減少其副作用，並可減少上述藥劑之用量。

「泌排特」之合成法是日本杏林獨創並獲世界專利之產品。

【成份】

每錠含有：

Benzylhydrochlorothiazide 4mg

【賦形劑】

Lactose、Dried Potato Starch、Magnesium Stearate

【藥理作用】

◎利尿作用

「泌排特」對於重碳酸鹽， K^+ 之喪失極少，故反覆使用也不攪亂體內電解質之平衡，而且兼備水銀利尿劑與碳酸脫水酵素抑制劑之作用，鹽類排泄效果較hydrochlorothiazide 強約 6 倍。增加 Cl^- 之排泄，但尿之 PH 則無變化。

◎血壓降下作用

「泌排特」係抑制細尿管之 Na^+ 吸收，使 ATP-ase 不活性化，而強化血管壁，減低血壓。

【適應症】

利尿，高血壓。

【用法用量】

成人一天 2 次，一次 1~2 錠，視年齡症狀輕重而酌量之。

維持量以一週 2~3 次間歇投與。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 一般注意：

- (1) 因本劑之利尿效果顯著，從少量開始服用，再徐徐增量。
- (2) 連續服用時，需定期檢查電解質是否失調。

2. 禁忌：

- (1) 無尿及急性腎不全之患者。
- (2) 體液中鈉、鉀明顯缺少之患者。
- (3) 以往對 Thiazide 系藥物及類似化合物 (如 chlortalidone 等 sulfonamide 衍生物) 有過敏症之患者。

3. 慎重使用：

- (1) 肝硬變之患者 (引發肝性昏睡)。
- (2) 高齡心疾病患者，嚴重冠狀動脈硬化症及腦動脈硬化症之患者。
- (3) 嚴重腎障礙之患者及肝疾患、肝機能障礙之患者。
- (4) 本人或家屬有痛風、糖尿病之患者。
- (5) 下痢、嘔吐、高鈣血症、副甲狀腺機能亢進症之患者。
- (6) 服用 Digitalis，糖質副腎皮質 Hormone 劑及 ACTH 之患者。
- (7) 交感神經切除後之患者。

4. 副作用：

- (1) 血液：極少例有血小板減少，白血球減少，再生不良性貧血，紫斑等現象出現時，中止使用。
- (2) 肝臟：極少例有肝炎出現。
- (3) 代謝異常：有低鈉血症，低鉀血症，血中鈣上昇等現象出現，有高尿酸血症，高血糖症出現時，應減量或停藥。

- (4) 過敏症：有出現斑疹，顏面潮紅或對光線過敏時，應中止使用。
- (5) 消化器：偶而出現食慾不振，噁心、嘔吐、胃部不適、下痢、便秘，極少例有胰臟炎、唾液腺炎。
- (6) 精神神經系：偶而有眩暈，極少例有知覺異常現象。
- (7) 眼：極少例有霧視、黃視症。
- (8) 呼吸器：間質性肺炎、肺水腫。
- (9) 其他：偶而有倦怠感，極少例有全身性紅斑性狼瘡，肌肉痙攣。
5. 孕婦、哺乳婦之使用：
Thiazide 系藥物，易使新生兒血小板減少，故對懷孕末期及哺乳中之婦女，應避免使用。
6. 乳兒之使用：易產生電解質不平衡，應慎重使用。
7. 相互作用：
與下列藥品併用時，需慎重使用：
(1) 含 Ethanol 飲料 (會增強起立性低血壓)。
(2) Norepinephrine 等 Catecholamine (會使血管壁反應性低下)。
(3) 與其他降壓劑併用時，應注意調整其用量。
(4) Digitalis (會增強對心臟作用)。
(5) 糖質副腎皮質 Hormone 劑，ACTH (會放出過多的鉀)。
(6) 糖尿病用藥 (會減弱糖尿病用藥之作用)。
8. 臨床檢查值之影響：
會使非甲狀腺障礙患者血清之 PBI 值低下。
9. 其他：需夜間休息之患者，為避免夜間排尿，請於午前使用。
10. 警語：急性近視與續發性隅角閉鎖型青光眼：Hydrochlorothiazide 是一種磺胺類藥物，會引起特異體質反應，導致急性短暫近視與急性隅角閉鎖型青光眼，症狀包括急速的視力下降或眼部疼痛，通常發生在開始用藥後數小時至一週內。急性隅角閉鎖型青光眼若未加以治療，可能導致視力永久喪失，主要治療方式為儘快停止使用 Hydrochlorothiazide。若仍未能有效控制眼壓，可能即需考慮立即尋求醫療或手術程序。引發急性隅角閉鎖型青光眼的風險因子，包括曾使用磺胺類或青黴素等藥物發生過敏的病史。

【包裝】

100's, 500's盒裝
100's, 500's 1000's瓶裝

【貯存】

避濕氣，遮光保存，並於 25℃ 以下存放。
衛署藥製字第010917號

Code No.



MU0707



日本杏林製藥株式会社 授權
杏林新生製藥股份有限公司 製造



桃園市龍潭區三和里店湖一路237號
電話：(03) 470-3248・470-3249