

時得附送現品並將照相影本代替粘貼報核



衛署藥製字第11655號

Code No.: 38003

制酸・潰瘍治療劑

“永信” **胃胃佳** 錠

Vivika Tablets “Yung Shin”

胃腸本身的毛病以外，暴飲暴食、過勞失眠等不規律的生活，以及連續的精神緊張等原因，亦會引起胃痛、胃酸過多、消化性潰瘍等之胃腸疾患。本劑中含有Scopolamine-N-Butylbromide, Dicyclomine Hydrochloride可緩和胃腸神經的緊張，並有抗痙攣作用，Chlordiazepoxide HCl為精神安定劑，又有Magnesium Oxide, Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel, Synthetic Aluminum Silicate 等具有長久的制酸作用，又有可促進潰瘍面肉芽重生作用的 Sodium Copper Chlorophyllin 對於上述症狀能迅速的發揮功效，為一理想的制酸、潰瘍治療劑。

【成分】每錠中含：

Scopolamine-N-Butylbromide	1mg
Dicyclomine Hydrochloride	1mg
Chlordiazepoxide Hydrochloride	2.5mg
Sodium Copper Chlorophyllin	1.5mg
Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel	175mg
Magnesium Oxide	20mg
Synthetic Aluminum Silicate	30mg

【特徵】

1. Scopolamine-N-Butylbromide及Dicyclomine Hydrochloride：用於胃腸等腹部臟器之迷走神經，有緩解痙攣、除去疼痛等作用，並能調節胃液分泌及胃腸運動。
2. Chlordiazepoxide HCl：能緩解精神緊張，除去不安，抑制異常興奮，使胃腸處於安適的狀態。
3. Sodium Copper Chlorophyllin：對於發生潰瘍的部位有肉芽重生促進作用，能促進潰瘍面迅速地復元。
4. Magnesium Oxide, Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel及Synthetic Aluminum Silicate：本劑之制酸作用係採用具有有效性的Magnesium Oxide及具有持續性的Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel與Synthetic Aluminum Silicate，故能發揮優秀的制酸作用，並具有胃腸粘膜的覆蓋保護作用。

【適應症】胃・十二指腸潰瘍、胃痛、胃酸過多、胃痙攣、胃炎。

【用法・用量】成人一次2～4錠，一日3～4次。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 一、禁忌症：青光眼患者、前列腺肥大而有排尿障礙者、重症肌無力患者、重度之心臟病患者、痙攣性腸閉塞患者。
- 二、慎重投與：肝、腎功能不全患者、前列腺肥大患者、磷酸鹽缺乏患者及阿耳滋海默氏症患者。
- 三、一般注意：1. 老年人患有嚴重性之心臟病患者，如需服用本劑，應請醫師特別指示。
2. 服用本劑時應避免開車。
3. 服用本劑時請勿飲酒。
- 四、副作用：本劑使用期間，偶有發生口乾、噁心、嘔吐、便秘、尿液滯留、視力模糊、頭痛、疲倦、閉汗、皮膚潮紅、高鈣血症及骨質疏鬆症現象。
- 五、本劑使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，宜權衡利弊，再行投與。
- 六、相互作用：1. 與四環素類抗生素(Tetracyclines)併用時，本劑會阻礙Tetracyclines的吸收，請勿併服。
2. 本劑之吸附作用及制酸作用，可提高消化道及體液之PH值，因此，可能會影響併用藥物的吸收及排泄作用，宜小心使用。

【包裝】30錠 60錠 120錠 500錠 1000錠 瓶裝 1000錠罐裝
100錠 1000錠盒裝

永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台灣省台中縣大甲鎮中山路1段1191號

電話：(04) 6875100

82.2.22