



華興製藥

利胆劑

"華興" 華肝膜衣錠

Euliver F.C. Tablets "H.S."

衛署藥製字第12803號

社會生產經濟之蛻變，生活緊張，公害污染日趨嚴重，因此肝臟要負更重的角色，功能必須健全，才能有效地勝任同化作用，分泌胆汁，幫助消化，增進食慾，調整並糾正新陳代謝作用，分解有害物質，以維持健康的身體。本公司有鑒於此，採用Anethole trithione加上趨脂劑 Choline bitartrate，應用現代的製藥學之基礎原理，加上特殊的方法及技術，製成穩定的膜衣錠。

【成份】

每錠含：

Anethole Trithione 5mg

Choline Bitartrate.....300mg

【賦形劑】

Colloid Silicon Dioxide、Silicon Dioxide、Cellulose Microcrystalline、Sugar、Lactose、Povidone K-30、Polyvinyl Pyrrolidone K-90、Hydroxypropyl Cellulose、Calcium Carboxymethylcellulose、Magnesium Stearate、Talc、Hydroxypropyl Methylcellulose 15 CPS、Hydroxypropyl Methylcellulose 606、Shellac、Polyethylene Glycol 6000、Titanium Dioxide、Tartrazine Aluminum Lake、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake

【作用特點】

- (1) 本藥中含Anethole Trithione是一種促進胆汁分泌的藥物。
- (2) Anethole Trithione可以降低血液中膽固醇的含量達正常量，加上Choline Bitartrate可以減少並除去過份的脂肪蓄積於血管內壁，可防止及緩解動脈粥狀硬化。
- (3) Anethole Trithione直接作用於肝，賦活肝細胞，使胆汁分泌時期長而緩和，因此不造成胆管之絞痛現象。

【適應症】

肝炎、肝硬化之利胆作用，胆囊炎、胆結石，胆及肝造影術之加強。

【用法用量】

通常成人每次1-2錠，日服3次，於飯前服用。孩童及高年者依症狀及體重酌量增減。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- (一) 可能有蕁麻疹、發疹等症狀出現時請停藥。
 - (二) 偶有下痢、腹痛、腹脹、噁心等現象。
 - (三) 偶有心悸亢進、顏面麻木感。
 - (四) 孕婦服用之安全性未確定。
 - (五) 有下列症狀者，請勿服用：
 - (1) 膽道完全閉塞者。
 - (2) 急性肝、膽道疾患患者。
 - (3) 重疾肝障礙患者。

【儲存】

25°C以下儲存。

【包裝】

6~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

藥商、製造廠

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷128號

服務專線：(04)8832121~6