

尺寸：9.8x17cm

顏色：PANTONE Red 032 CV

PANTONE Process Black CV

抗結核劑

衛署藥製字第013083號
Code No. 10204

“溫士頓”

異菸鹼醯肼 錠

"Winston"

ISONIAZID Tablets

結核病是由於結核桿菌感染所致之一種疾病，它是一種全身性的疾病，不僅是肺部，在全身各種組織器官都有可能受到結核桿菌的侵襲。雖然現今醫學發達，結核病已有了特效藥，但卻不是短期內就可以痊癒的。故長期且耐心的治療乃是必須的，同時加強病人抵抗力，注意病人身心的休息、營養、空氣……等，以求早日痊癒。

【成份】

Each Tablet contains:

Isoniazid.....100mg

賦形劑：Starch、Calcium Phosphate Dibasic、Magnesium Stearate、Carmellose Sodium。

【作用及特性】

- 1.本劑為抗結核之第一線藥劑(First-line drug)。
- 2.本劑是結核病預防治療(Preventive therapy)的唯一藥劑。
- 3.本劑是效力較強的抗結核藥劑。常與Rifampin或Streptomycin合併使用。
- 4.本劑作用於生長中之結核桿菌Growing bacilli。
- 5.本劑與Pyridoxine的代謝形成競爭性的抑制作用(Competitive inhibition)，故長期服用時須補充Pyridoxine。
- 6.本劑可與結核菌維持生命必須之部份金屬元素相結合，使結核菌因而死亡。
- 7.本劑可干擾結核桿菌、核苷酸Nucleotide及脂質合成。
- 8.可抑制其細胞壁中脂肪成份之合成。

【藥力學】

- 1.吸收：本劑口服吸收甚佳。
- 2.分佈：本劑口服後分佈甚廣，可到達體內各組織，於C.S.F的濃度為血液濃度的1/4。同時本劑更有一特性就是滲入乾酪化組織(Caseous tissue)的濃度亦較高。
- 3.排泄：主要由尿中排泄。
- 4.代謝：主要在肝臟形成醯酸化Acetylation。

【適應症】

肺結核、喉頭結核、腸結核、膀胱結核、皮膚結核、結核性髓膜炎、結核性胸膈、腎臟結核。

【用法用量】

成人每天口服3~6片(300~600mg)每日3次。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.下列患者需小心使用：慢速乙酰化者（增加副作用的風險）、癲癇、精神病史、酒精依賴史、營養不良、糖尿病、HIV帶原者（增加周邊神經炎風險）、急性紫質症（porphyria）。
- 2.服用本藥前需先檢測肝功能，既有肝疾患者及酒精依賴者，於服用本藥頭二個月期間，尤須頻繁檢測肝功能。肝功能正常者服用本藥時僅需於發生發燒、倦怠、嘔吐、黃疸或不明原因的病情惡化時再檢測肝功能。
- 3.為完成結核病療程並避免嚴重肝損害發生，患者及照顧患者的醫護人員均需被詳細告知肝損害的病徵，並於病徵出現時立即停藥及就醫。
- 4.服用本藥需先檢測腎功能，若腎絲球過濾率小於10 ml/min/1.73 m²時，本藥每日最大劑量為200 mg。
- 5.服用本藥最常發生的副作用為周圍神經病變，特別是糖尿病、酒精依賴者、慢性腎衰竭、營養不良及HIV帶原者。於治療初期開始每日給予維他命B6 10mg或20mg可預防此副作用的發生。

【懷孕及授乳】

僅在醫師評估使用之利益大於風險時才可使用。尚無用於懷孕婦女之適當資料，然而在老鼠及兔子的研究顯示具有胎兒毒性，動物資料並未顯示畸胎性。Isoniazid已知會通過胎盤，在胎兒的血中濃度可能高於母體血中濃度，故服用isoniazid之婦女不宜哺乳。

【禁忌症】

藥物引起肝臟疾病患者。

【副作用】

噁心、嘔吐、便秘、口乾、高劑量引起的周邊神經炎(可服用維生素B6預防)，視神經炎、驚厥、精神病發作、眩暈、過敏性反應(包含發燒、Stevens-Johnson症候群、紫斑症)；血液疾病包含粒性白血球缺乏症、溶血性貧血、再生不良性貧血；肝炎(尤其大於35歲患者)、胰臟炎、間質性肺炎、全身性紅斑狼瘡樣症候群、糙皮症、反射亢進、排尿困難、高血糖、男性乳症、聽覺喪失及耳鳴(腎功能衰竭末期患者)；食用富含酪氨酸及組織胺食物患者有發生以下副作用的報告：心悸過速、心悸、低血壓、潮紅、頭痛、頭暈及出汗。

【交互作用】

- 1.制酸劑會降低本藥之吸收。
- 2.本藥與Cycloserine併服會增加中樞毒性的風險。
- 3.本藥會增加Carbamazepine的血中濃度，同時增加本藥的肝毒性。
- 4.本藥會抑制Ethosuximide的代謝，增加該藥的血中濃度及中毒風險。
- 5.本藥可能抑制Phenytoin的代謝，增加該藥的中毒風險。
- 6.本藥可能降低Ketoconazole的血中濃度。
- 7.本藥會抑制Diazepam的代謝。
- 8.皮質類固醇可能降低本藥之血中濃度。
- 9.本藥可能會降低Levodopa的效用。
- 10.本藥可能會增加Theophylline的血中濃度。
- 11.本藥會使口服傷寒疫苗不活化。

【包裝儲存】

6~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。
25℃以下密封阻光容器儲存。
1510-01

Made in Taiwan



溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號